

沈氏尊生書

沈氏尊生書卷二

傷寒論綱目

太陽經

惡熱

沈金齋輯

綱仲景曰心下痞按之濡大便硬而不惡寒反惡熱其脉閑上浮者大黃黃連瀉心湯主之

目戴元禮曰發汗後只惡寒者爲虛虛乃表虛發汗後只惡熱者爲實實乃裏實只惡寒者早發其汗或汗出太過謂陽微則惡寒宜芍藥甘草附子湯只惡熱是表已解而裏不消所謂陰微則發熱宜大柴胡湯或小承氣湯

柯琴曰濡當作硬夫按之濡爲氣痞是無形也則不當下且結胸症其脉浮大者不可下則心下痞而脉上浮者反可下乎小

結胸按之痛者尚不用大黃何此比陷胸更峻此必有當急下之症比結胷更甚故製此峻攻之劑也

鰲

按閉上脉浮是陽明少陽火勢熾矣不惡寒反惡熱是陽氣盛而外越極矣大便硬是陽邪固結而不解矣此卽柯氏所謂必有急下之處也如此則濡字非簡編之悞歟

惡寒

沈金鰲輯

綱仲景曰太陽之爲病脈浮頭項強痛而惡寒太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒

目朱肱曰太抵太陽病必發熱而惡寒惡寒家慎不可過當覆衣被及近火氣寒熱相薄脉道沉伏愈令病人寒不可當但去衣被微火兼與以和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚藥不能治

劉完素曰惡寒者不待風而寒雖身大熱而不欲去衣也是由陰氣上入陽中或陽微或風虛相搏之所致惡寒一切屬表雖裏症悉具而微惡寒亦是表未解也治法當先解外

王肯堂曰惡寒者風寒客于營衛非寒熱之寒又非惡風也不待見風而後怯寒也甚則向火添被亦不能遏其寒經云發熱

惡寒。發于陽可發汗。無熱惡寒而踰臥。脉沉細。發于陰可溫裏。  
惡寒雖悉屬表。亦有虛實之分。若汗出而惡寒爲表虛。無汗而  
惡寒爲表實。表虛解肌。表實發汗。傷寒太陽病在表。故惡寒。  
少陽在半表裏。亦微惡寒。陽明在裏。本不惡寒。而或惡者。與太  
陽合病也。

綱

仲景曰。病有發熱惡寒者。發于陽也。無熱惡寒者。發于陰也。

目劉完素曰。惡寒者必繼之以發熱。此發于陽也。惡寒而踰臥。  
脉沉細而緊者。發于陰也。在陽可汗。在陰可溫。其止稱背惡寒  
者。背爲陽。腹爲陰。陽氣不足。陰寒氣盛。則背爲之惡寒。若風寒  
在表而惡寒。則一身盡寒矣。

張元素曰。惡寒有發陽發陰二症。發于陽者脉必浮數。宜解表。  
屬桂枝湯。桂枝二越婢一湯。麻黃湯。青龍湯症也。

**綱**

仲景曰。發汗病不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子湯主之。

**目** 楊士瀛曰。汗後反惡寒表。雖不解。急當救裏。若反與桂枝攻表。此悞也。故去桂姜棗加附子。以溫經散寒。助芍藥甘草以和中。一腳攣急。與芍藥甘草湯本治陰虛。此治陰陽俱虛。故加附子。皆仲景治裏不治表之義。

**綱**

仲景曰。脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗。更吐更下也。

**目** 朱撝曰。若其人熱雖多。而脈甚微。無和緩之意。是陰弱而發寒。雖少。而惡之更甚。是陽虛而惡寒。陰陽俱虛。當調其陰陽。勿妄治以虛其虛也。

**綱**

仲景曰。傷寒大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻。

痞當先解表。乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。目 朱肱曰。太陽陽明少陰。皆有惡寒。要之惟太陽病。不問已發。

熱未發熱必惡寒也。

柯琴曰心下痞是悞下後裏症。惡寒是汗後未解症。裏實表虛內外俱病皆因汗下倒施也。表裏交持仍當遵先表後裏先汗後下正法。蓋惡寒之表甚于身疼。心下之痞輕於消穀與救急之法不同。

續仲景曰心下痞大便硬心煩不得眠而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之。太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也。

目柯琴曰心下痞下當有便。鞭心煩不眠故用此湯。但心下痞而惡寒表未解也。當先解表宜桂枝加附子而反用大黃悞矣。但以醫下之而心下痞猶發熱惡寒故屬太陽症。

續仲景曰陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂

枝湯

**目**朱肱曰此陽明之表症也同于太陽而屬之陽明者不頭項強痛且要知桂枝麻黃二湯專爲表邪而設不爲太陽而設見麻黃症卽用麻黃湯見桂枝症卽用桂枝湯不必問其爲太陽陽明也若惡寒一罷則二方必禁

**鰲按**仲景云陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯一條乃言陽明之表脉其症亦同太陽故用麻黃湯發表當與本條同看

**綱**仲景曰傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞶脈沉細者此爲陽微結必有表復有裏也脉沉亦在裏也汗出爲陽微結假令純陰結不得復有外症悉入在裏矣此爲半在表半在裏也脉雖沉細不得爲少陰病所以然者陰不得有汗

今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不丁了者得屎而解

**目**王肯堂曰三陰惟少陰有惡寒之症然少陰惡寒又有二症發于少陰者無熱而惡寒宜溫之四逆湯理中湯少陰無熱惡


寒似與太陽經未卽熱一條相似所謂寒未卽熱者爲太陽症具而未熱耳少陰之無熱惡寒蓋無太陽頭痛等症知爲少陰也若少陰惡寒而踰臥時時自煩欲去衣被者活人書用大柴胡下之趙氏以爲宜溫散經邪導引真陽汗而解可也若下之非惟不能解表反虛其裏使惡寒之邪乘虛內陷縱使其脉沉滑而實亦未可遽用大柴胡必須先解表使惡寒症罷而後可用也少陰病惡寒身踰而利手足逆冷者不治少陰四肢惡寒而身踰脉不至不煩而躁者死有太陰自利不渴厥陰

下利厥逆俱或惡寒太陰宜理中湯厥陰宜四逆湯前旣言二

一陰不惡寒。今又言或惡寒者。要知太陰厥陰本不惡寒。此陽傳陰者也。三陰皆能惡寒者。陰入陰者也。特在少陰爲多耳。

陶華曰。惡寒者。寒邪入營衛。則洒淅惡寒。雖一切屬表。尚在肺陰陽所分。若發熱惡寒。兼之頭疼脊強。脉浮緊。寒邪在太陽表症也。宜汗之。照時令用藥。若無熱惡寒體踰脉沉遲無力者。寒邪入少陰裏症也。宜溫之。四逆湯。

鰲按。此條但就脈言。曰沉曰細。俱是少陰。固不得與柴胡湯。惟推出頭汗。則猶有少陽現症。而非盡在裏矣。雖脉已屬少陰。而仍與柴胡也。且三陰脉不至頭。其脉止在身。三陽脉盛于頭。陽結則汗在頭。今陽微結。雖曰少陽。而微惡寒。畢竟尚有太陽表症之意。所以此條仍列入太陽惡寒門類。



惡風

沈金鰲輯

仲景曰。太陽病。發熱汗出。惡風。脈緩者。名爲中風。太陽病。頭痛。發熱汗出。惡風者。桂枝湯主之。太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。嗇嗇惡寒。淅浙惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾啞者。桂枝湯主之。

目劉完素曰。惡寒有屬陽。有屬陰。惡風則悉屬陽。三陰症並無惡風者。以此也。惡風雖悉在表。而發散又不同。無汗惡風爲傷寒。當發汗。汗出惡風爲中風。當解肌裏症。雖具惡風。未罷。當先解外。

趙獻可曰。惡風者。衛中四時之虛風。所以惡風也。其人當汗出而脉緩也。數與桂枝湯。桂枝加葛根湯。使遍體微潤。連日當自解矣。

王履曰衛氣者所以溫肌肉充皮膚肥腠理司開闔者也故風邪中于衛也則必惡風惡寒惡風俱爲表症但惡風比惡寒爲輕耳惡寒者雖不當風而時自怯寒惡風者居密室幃幕中則無所畏或當風或揮扇則淅淅然而惡也

柯琴曰風爲陽邪風中太陽兩陽相搏而陰氣衰少陽浮故熱自發陰弱故汗自出中風惡風類相感也風性散漫脉應其象故浮而緩若太陽初受病便見如此脉症即可定其爲中風而非傷寒矣二條是桂枝湯本症合此症卽用此湯不必問爲傷寒中風雜病也四症中頭痛是太陽本症頭痛發熱惡風與麻黃症同本方重在汗出汗不出者便非桂枝症三條乃太陽中風之桂枝症○明非謂凡中風者便當主桂枝也二條脉症是概風寒雜病而言三條加中風二字其脉其症悉呈風象矣

**續**仲景曰太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

**目**朱肱曰此症當溫其經故桂枝加附子也

劉完素曰汗多亡陽則衛不固是以惡風也桂枝加附子溫其經而固其衛也

陶華曰惡風者風邪傷衛腠理不密由是惡風悉屬於陽非比惡寒乃有陰陽之別者

**鰲**按此四症並見却以汗不止小便難爲重以二者由於心腎故耑治之而惡風四肢急俱瘡也蓋太陽雖當汗汗不止則亡陽風乘虛入故又惡風汗多必津竭故小便難四肢者諸陽之本陽亡則不能榮筋故筋急而屈伸不利也

綱仲景曰風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出

短氣。小便不利。惡風。不欲去衣。或身微腫者。甘草附子湯主之。

**目** 劉完素曰。濕勝自汗。而皮腠不密。是以惡風也。甘草附子湯。所以散其濕而實其衛。

柯琴曰。身腫痛劇。不得屈伸。濕感于外也。惡風不欲去衣。風淫于外也。汗出短氣。小便不利。化源不清也。君桂枝以理上焦。而散風邪。佐术附甘以除濕而調氣。

**鰲** 按此風濕爲病。而濕尤中于周身營衛之間。不能推布。其患爲尤重者。故小便不利。身腫二句。最宜着眼。

振戰慄

沈金鰲輯

仲景曰。傷寒若吐若下後心下逆滿氣上冲心起則頭眩脈沉緊發汗則動經身爲振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之。太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞶動振振欲擗地者真武湯主之。

成無己曰。振者森然若寒聳然振動者是也。傷寒而振皆由虛寒蓋以欲汗之時其人必虛必蒸蒸而振却發熱汗出而解。振近戰而輕者爲振矣。戰爲正與邪爭爭則爲鼓慄而戰振但虛而不至爭故惟聳動而振也。下後復發汗振寒者爲其表裏俱虛也。亡血家發汗則寒慄而振者謂其氣血俱虛也。諸如此者止于振聳耳。其身爲振振搖振振欲擗地二者皆發汗過多亡陽經虛不能自主持故身爲振搖也。又非若振慄之比矣。

此二湯皆溫經益陽滋血助氣之劑。經虛陽弱得之未有不獲全濟之功者。

**續**仲景曰。問曰。病有戰而汗出。因得解者何也。答曰。脈浮而數。按之反芤。此爲本虛。故當戰而汗出也。其人本虛。是以發汗。以脈浮。故當汗出而解。若脉浮而數。按之不芤。此人本不虛。若欲自解。但汗出耳。不發戰也。

**目**韓祗和曰。汗下後戰者。與救逆湯微減。與羊肉湯再投而戰解。若陰氣內盛。正氣大虛。心慄鼓領。身不戰者。遂成寒逆。宜灸之。或用大建中湯。仲景治尸厥戰而慄者。刺期門巨闕。

吳綬曰。凡戰者。大抵氣血俱虛。不能榮養筋骨。故爲之振搖而不能主持也。須大補氣血。予曾用參養榮湯得效。又一人身搖不得眠者。以十味溫膽湯倍加人參而愈。內經曰。寒之傷人。