

張氏醫通卷十一

長洲石頑張璐路玉父纂述

以柔安世

男

訥遜言

參訂

婦人門下

產後

經曰。乳子而病熱。脈懸小。手足溫則生。寒則死。

乳子中風熱。喘鳴肩息者。脈實大而緩則生。急則死。

上條言產後以乳哺子之時而患熱病。其脈只宜

懸小不宜實大者以產後新虛故也。設脈雖懸小而見手足逆冷。又爲脾氣衰絕。陰氣暴逆之候。亦主死也。下條言產後中風熱而至喘鳴肩息。以風熱逆於陽位。其脈必不能懸小。但須實大之中而往來和緩。則脾胃之氣在其中矣。設見急疾。胃氣已絕。安得不死。後世以爲乳子二字誤認。小兒如張介賓之明。亦不加察。且因此而謂小兒不當視虎口三關。卽宜診兩手六部。非智者之一失歟。

金匱云。問曰。新產婦人有三病。一者病瘕。二者病鬱。

胃三者大便難何謂也師曰新產血虛多汗出善中風故令病瘕亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便難產婦鬱冒其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出所以產婦善汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之

之病解能食七八日更發熱者此爲胃實大承氣湯主

產後氣血俱虛。下下皆禁。獨此一證。用大承氣者。乃證治之變。不當以尋常例測也。以其病解之後。尚有餘熱在胃。所以能食。食入既多。至七八日。更加發熱者。此必復傷飲食之故。故知胃有實結。恐其煎迫津液。故以急下救陰爲務。然必年體強壯。脈證俱實。且時日既久。與新產大便難不同。是可議下。設遇胃虛之人。雖能食而所食不多。卽有發熱便秘。亦屬血虛。急宜調養氣血。斷非承氣所宜。不可恣行攻擊也。

產後腹中疝痛當歸生薑羊肉湯主之并治腹中寒
疝虛勞不足若寒多者加生薑成一觔痛多而嘔者
加橘皮一兩白朮一兩

產後腹中疝痛乃寒積厥陰衝脈故用辛溫以散
血中之寒助以血肉之性大補精血較諸補劑功
効懸殊若腹痛兼嘔而所嘔皆是稀痰是知脾虛
濁氣上逆故加橘皮以宣散其氣白朮以固護其
脾倘見血逆而嘔所嘔渾是清水腹脹滿急則加
桃仁肉桂具見言外矣至於寒疝虛勞少腹結痛

總是下焦寒結亦不越是方也

產後腹痛煩滿不得卧。枳實芍藥散主之。并主癰膿。以麥粥下之。

仲景凡治腹痛多用芍藥。以其能收陰氣之散也。以其能除血痺之痛也。以其能緩中而止急痛也。本草謂主邪氣腹痛。故多用之。蓋五氣之邪莫如厥陰肝木之性急暴。一有不平則曲直作痛也。此方治疔痛用芍藥爲主。佐以枳實炒黑入血破積聚。收陰緩中。逐陳致新。麥粥補血下氣。而壯血脈。

也。

師曰產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此爲腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利頓服之新血下如豚肝

血之燥乾凝著者非芍藥枳實可能治須用大黃桃仁蠱蟲下其血閉更加蜜以緩大黃之急也

產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露未盡不大便煩躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則譫語至六日即愈宜大承氣湯主之熱在於裏

結在膀胱也。

太陽爲表膀胱爲裏七八日表證入裏故曰無太陽證惡露已爲病氣所鬱不能盡去。因入裏與惡露相搏結在膀胱而作少腹堅痛下焦熱極故不大便煩躁發熱更切其脈微實再倍其發熱在日晡時而煩躁不食熱邪又攻於胃胃熱則不食食入則穀氣之熱更助兩熱相併故譫語至夜卽愈者產後血虛熱邪易入血室入血室則夜如見鬼狀言此以明其熱不在血室而在膀胱與胃故

用大承氣湯也

產後風續之數十日不解。頭微痛惡寒。時時有熱。心下悶乾嘔。汗出雖久。陽旦證續在者。可與陽旦湯。

舉此與上文承氣湯爲表裏之例。

產後中風發熱。面正赤。喘而頭痛。竹葉湯主之。溫覆使汗出。頸項強。用大附子一枚。破之如豆。入前藥。湯去沫。嘔者加半夏半升。洗。

此證太陽上行至頭。表陽明脈過膈。上循於面。二經合病。多加葛根。以葛根爲陽明解肌藥也。防風。

佐桂枝去二經之風。竹葉桔梗主氣上喘。參草和中氣。薑棗行營衛。穀氣行則上下交濟而汗出解矣。附子恐是方後所加治頸項強者。以邪在太陽。禁固其筋脈。不得屈伸。故用附子溫經散寒。揚去沫者。不使辛熱上浮之氣助其虛陽上逆也。若邪在胸而嘔。加半夏治之。上言破之如豆。入前藥。舊本作如豆大。今如徐忠可駁正。婦人乳中虛。煩亂嘔逆。安中益氣。竹皮大圓主之。有熱者倍白薇。煩喘者加栝實一分。

乳中虛言乳哺而乳汁去多則陰血乏而胃中亦
虛陰乏則火撓而神昏亂胃虛則嘔逆用甘草瀉
心火石膏療煩亂竹皮主嘔逆桂枝和營氣又宣
導諸藥使無杆格之逆煩喘者爲心虛火動故加
栝實以安之

產後下利虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之

傷寒厥陰證熱利下重者用白頭翁湯苦寒治熱
以堅腸胃此產後氣血兩虛故加阿膠甘草然下
利血滯也古人云血行則利自止此方豈獨治產

後哉

婦人在草蓐。自發露得風。四肢苦煩。熱頭痛者。與小柴胡湯。頭不痛。但煩者。千金三物黃芩湯。

自發露。謂自發衣露體得風。非邪外傷者。故不爲自汗風病。蓋產時天機開發。雖微風亦得入之外感之風。內應之火。合化淫於四末。而作四肢苦煩。熱上。至於頭作頭痛。病在表裏之間。故用小柴胡湯。主治少陽。若頭不痛。是無表也。惟肝膽風熱內動。上膈作煩。故用黃芩退熱。苦參養肝。熟地補血。

而益腎水則肝膽之火寧矣

婦人產後虛羸不足。腹中刺痛不止。吸吸少氣。或苦
少腹中急。摩引腰背。不能食飲。千金內補當歸建
中湯。產後一月日得服四五劑爲善。令人強壯。若大
虛。加飴糖六兩。湯成內之。於火上煖令飴消。若去血
過多。崩傷內衄不止。加地黃六兩。阿膠二兩。合八味
湯。成內阿膠。

產後血去營衛俱虛。內不充於五藏。肝木妄動。作
腹中刺痛。上不充於膻中。遂吸吸少氣。下下濟於

腎故少腹急引外連腰脊。六府不和則不能食用。此以益營衛伐肝邪補中和內。○按此卽黃耆建中之變法。彼用黃耆以助外衛之陽。此用當歸以調內營之血。然助外則用桂枝調中則宜肉桂。兩不移易之定法也。

千金二字義見中風門方千金三黃湯下

諸禁○一禁卧二禁酒三禁浴四禁寒五禁汗六禁下七禁利小便八禁寒涼藥九禁起動作勞蓋初產血氣未定遽卧則惡血上升故分娩之後須高卧仰倚切不可卽卧三朝始可稍去其墊尚宜高枕七日

後如無他病方可安枕多有半月後未能貼蒂者酒
能助火亂經誤用不無動血之虞至如雞子猪腎一
切滯氣堅紉難化物及生冷膩滑皆不可食卽砂仁
湯亦能動血咸在禁例浴能升動惡露雖當夏月亦
須禁之曾有產數日後因浴瘀血上衝而斃者亦有
因浴動血誤用寒涼瘀結不行血化爲水喘滿腫脹
而死者不可不慎也新產驟虛最忌著寒寒則血氣
凝滯諸變冗生每至飲食不化腹痛作瀉禍患莫測
欲去其瘀則正氣并脫欲止其瀉則瘀結不行惟薑

桂參朮辛溫峻補。庶幾血行瀉止。故冬月一產卽宜重綿兜護其腹。在夏月亦當覆巾裹之。機要云。胎產之病。從厥陰無犯胃氣。及上中二焦爲之三禁。不可汗。不可下。不可利。小便制劑之法。能不犯三禁。則營衛自和而寒熱止矣。故產後雖有表證。一切風藥皆不可用。以其性升。不特載血上行。令人發暈。抑且令人吐瀉。多致汗脫而死。不特風藥當禁。卽佛手散中芎藭皆爲散用。恐湯能發汗也。至於下藥尤爲切禁。非特硝黃難於輕試。卽溲便數難者。只宜調養元氣。