

校正醫學入門

上海掃葉山房印行

補註醫學入門外集卷之五

丹溪朱先生雜病纂要 詳格致餘論局方發揮丹溪心法纂要日用醫方及今時餘病

雜病提綱 外感風寒暑濕燥火 內傷脾胃氣血痰鬱積熱諸虛痼冷

外感

風 口舌 頭痛 面風 眼 耳 鼻 牙齒 痛風 痺風 斑疹 遊風

中風卒倒分真似 為風為百病長善行數變為卒中昏倒為竅視偏痺為搖搖反張或為寒中或為熱中或

胃氣相搏則不仁與榮氣相搏則半身不遂入經癱瘓入絡膚頑入腑即不識人入臟即舌強吐沫挾熱

則瘳緩挾寒則拘攣挾濕則腫滿有真中者有兼中似中者陽病身熱陰病身涼烏附行經不可藥用

口眼喎斜語話難 風邪初入反緩正氣反急牽引口眼喎斜或左或右急搦人中放項髮灸耳垂珠粟米

去而用正舌藥白附子姜蠶全蝎等分末酒調服二錢○不語有數端有風中心脾者資壽解語湯有

風中心經者小續命湯去桂附加葛蒲有痰塞心竅者導痰湯加葛蒲人參竹茹或苓連有古本強硬語

言不正者用蝎稍二錢半茯苓一兩薄荷二兩為末酒調服二錢或擦牙尤妙又有風 痰塞喉中聲噤噤

熱壅者有血虛氣虛者有腎虛及老人忽言不出者十全大補湯去桂加葛蒲遠志 半身或只一肢不遂此

同上卒倒歪斜不語名風癱身軟有汗者生汗不出者十全大補湯去桂加葛蒲遠志 半身或只一肢不遂此

偏枯言不變智不亂病 四肢癱 此名風痺智亂不能言者難治其症身體無痛緩則四肢不舉急則一身 在膚痠之間溫臥取汗 四肢癱 皆仰或左癱右瘓或一臂不隨時復轉移一臂軀風化痰調氣養血為主 換骨丹黑虎丹神仙飛步丹有脾實者膏粱之疾非肝腎虛痿 又有五痺類風狀見 四症 風癱風痺 搜風順氣丸有脾虛者十全大補湯獨活寄生湯萬寶回春湯 又有五痺類風狀見 四症 風癱風痺 莫浪猜 中暑中寒中濕痰厥氣厥厥虛暈等症皆卒倒不語但風必有歪斜搐搦之症為異雖內 者大省風湯加人參末藥等分水煎熱服得汗即愈或四肢無憑口喎語 西北高真中宜分治東南濕兼 滋者古防風湯入麝一厘調服或自醒能言能食惟身體不遂者地仙丹

中似審實虛主火河間主氣東垣或主濕丹溪內傷兼中似中盡相須三子所主雖殊而實同也況濕則中氣不

也氣衰賊邪容易襲傷氣血壯盛理緻密邪不能入惟中年氣血始衰理空疎加以七情勞後飲食內

病也有醉後當風頭面多汗善渴者名曰漏風宜黃芪六一湯加參朮牡蠣乾葛有房勞中風下體多汗

日內風十全大補湯加附子防風如入風府曰腦風入係頭曰目風在膝理為洩風與漏風同但身盡疼

耳久則為陽風食後曰胃風又名夾食中風久則為下血有傷食變為暴厥亦類中風但停食則胸中滿

悶須探吐及理脾胃有酒濕病亦類中風當分清以瀉濕毒有內傷熱症似中風者有難病虛症似中風

者均不可火動氣中無涎汚中氣脈沉身涼無痰涎為異耳如思慮內脫憂愁肢廢悲哀筋攣過喜皮稿

以風治火動氣中無涎汚威怒腰膝即河間所謂將息失宜五志過極則心火暴甚腎水難制熱氣拂

鬱昏倒筋骨不用久則癱瘓忌服風藥宜藿香正真中腑着四肢手足拘攣或中身前身後身側可治

氣散合星香散虛者八味順氣散實者四七湯真中腑着四肢脈浮有表面見五色惡寒宜小續命

湯或排風湯風從汗散通因通用是也如脈浮不語者用中臟開塞九寢多昏危中臟之絡者口眼俱閉

防風黃芪煎水一担置牀下薰入鼻中良久能言進藥中臟開塞九寢多昏危中臟之絡者口眼俱閉

口閉肝絕眼閉脾絕手撒肺絕痰如拽鋸新睡腎絕遺尿或大吐大瀉下血吐血者皆死宜三化湯搜風

順氣丸麻子仁丸凡攻裏忌腦麝牛黃引風入骨花甘遂損傷氣血如汗多尿少者忌利榮竭無以

制火煩熱愈其候熱中血脈也則奎口眼或近於臟內亦有六經形症則從小續命湯加減微利又有中

退汗止小便自利中血脈也則奎口眼或近於臟內亦有六經形症則從小續命湯加減微利又有中

經亦要知內無便溺外無六經症從中治不可汗下蓋風本於熱熱勝則風動宜養血以勝燥大秦光湯

微利愈風湯加大黃中腑雖宜汗汗多則亡陽中臟雖宜下下多則亡陰若臟腑兼見者或先汗而後利或表裏兼攻者防風通聖散口不能言肢不持手足不能運動乃

亡陰若臟腑兼見者或先汗而後利或表裏兼攻者防風通聖散口不能言肢不持手足不能運動乃

也左為死血經絡滯與少血四物湯少加防風羌活痰與氣虛身右居則痰大流注於右而為痰急治則愈

久則痰火鬱結難治痛者為實先以二陳省風之類治痰後以防風通聖散瀉青丸之類瀉火不痛為虛

血虛者四物湯俱薑汁炒過加竹瀝羌汁肥人濕痰少加附子行經瘦人火動加黃柏氣虛者四君子湯

虛其遺尿聲嘶睡者濃煎參芪加附子薑汁勞傷者補中益氣湯加竹瀝兼通治北開關化涎沫開關散

治右痰痰或者二陳湯加薑汁竹瀝能食者換荆瀝此丹溪雖病通法也通治北開關化涎沫開關散

嗽可治無嗽者死牙關緊急入藥不得者用南星五分龍腦一字端午日午時合每用一字至五分擦牙

熱自開痰甚者宜量虛實吐之虛者稀涎散微微吐出冷涎實者用承蒂炒黃末五分或一錢入全蝎末

半分吹入鼻中立吐如不吐用酸薑汁調下如再不吐用熱薑汁投之此藥不可輕用吐後宜服降火利氣安神定志之藥吐清見傷寒但中風大吐涎出久則手足骨節皆枯不能轉動清利以藥壓下再歸清節可也小兒**順氣活血風自祛**真風症皆痰為患故治以開關化痰為先急則祛風緩則順氣久則活血如驚搐亦然

散虛者薑實回春湯未可全以風治也抑論舊以西北風高真中宜分臟腑者可不分氣血之虛實乎治氣血者中宜分氣血虛實痰火多少調治然真中兼中南北互有且治臟腑者不可不分氣血之虛實乎治氣血者

又可不分臟腑經絡之邪多少乎大抵外感重而內傷輕者先須分表裏祛風為主次用氣若覺煩血痰法調治內傷重而外感輕者先用調補氣血痰法為主次分臟腑經絡祛風為主次用氣

肌蠕動風覺手足麻木肌肉蠕動如用有虫行心抑風亂宜烏藥**預防之法亦堪推**禦風丹五參散史國

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通勝最易感冒新咳嗽惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

芎茶調散痰多者金沸草散扶熱人參敗毒散升麻葛根湯扶寒十神**挾內慎勿專攻外**服食過厚素有

湯挾寒濕消風百解散挾濕神水散扶暑香葛湯時行柴胡升麻湯**挾內慎勿專攻外**服食過厚素有

流涕聲重咳嗽暑被外感則甚者防風通聖散或大黃黃芩等分為丸白水下素虛者只用防風羌活川

芎隨宜加入補藥痰熱中傷食加白朮陳皮青皮山查麥芽挾形寒飲冷加姜桂挾房勞加參求歸地挾

勞役傷氣者補中益氣湯加羌活防**重則傳變輕不傳**風重傳裏一久其能為氣血害風能燥血散氣故

風風虛其者羌活九加味烏荊丸**重則傳變輕不傳**同傷寒治法**久其能為氣血害**古用桂附八物等

湯久不愈者只宜三白湯加減飲之切**寒**咳一霍亂**寒**心脾痛腹痛

中寒無汗肢僵仆傷寒循經漸入中寒不問冬夏或當風取涼或坐地受冷肅殺之氣自皮膚卒入臟腑

逆手足溫厥則生外極冷唇青厥**急分三陰暖下元**倉卒難分經絡急煎姜附理中救之次審中脫疼痛

或或臍腹疼痛五積散加吳萸小腹痛中厥陰者當歸四逆湯加吳萸或五味子如陰盛煩燥熱藥

冷飲或加些涼藥為引溫中散冷補暖下元陽氣復而寒自消矣切忌吐下方兼補血者寒泣血故也**感**

冒尋常和表裏西北苦寒中傷者多東南溫和中傷者少尋常感冒表症見者九味羌活湯芫荽香蘇散

寒入腸胃者霍亂轉筋洞泄下利乾嘔吐逆藿香正氣散或五積散挾食停痰者人參養

胃湯夏秋暴寒折熱於裏者調中湯微下之凡帶漏遺精痼疾痼脚內傷補益加辛溫內傷勞役感寒氣腰膝冷虛勞陰痿諸痛皆寒所為也挾風眩暈不仁挾濕四肢腫痛如內傷房室感寒厥冷四逆湯脈脫三建湯煉臍法

暑病

暑熱汗渴審實虛暑病身熱自汗口渴面垢而已餘症皆後傳變或兼內傷必先問其人素虛胃弱陰陽

經絡最難拘靜居高堂大廈得病似熱症屬心脾經者名中暑陰症動作田野道路得病似傷風症傷勝

自口鼻牙頰達手心主胞絡以火從火故古法暑還取冷水灌流勿嚥入肝則眩中傷傷緩冒伏深分

輕重中暑歸心神昏卒倒傷暑肉分周身煩燥或如針刺或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌

覺變出寒熱不定霍亂吐瀉膨脹中滿瘧痢頭暈腹痛下血暑風暑厥又何如即暑厥症但以手足搐搦

等症但暑病多無身痛間有痛者或為涼浴水濕相搏耳暑風暑厥又何如即暑厥症但以手足搐搦

傷寒熱厥義同黃連香茹散暑風乃勞役內動五臟之火與外火交熾則金衰木旺生風香茹散如羌活

或六和湯合消風散素有痼疾因觸暑動痰熱生風者六和湯合星香散若途卒倒湯藥不便恐氣脫

難治急扶陰涼處不可取濕冷地搦道上熱土故臍上撥開作窠令入尿於其中待求生姜或蒜嚼爛以

熱湯或重便送下外用布蘸熱湯熨氣海立醒後尤不可飲冷水以大劑滋補藥服之如心神恍惚用五

苓散燈心同煎入硃砂末調服有汗加黃芪因酒引暑入腹尿血者去桂加黃連或神痰火絞腸俱可吐

昏驚悸妄言用益元散量加硃砂新汲水調服二錢降胃火治煩熱利濕止渴之要藥痰火絞腸俱可吐

暑毒痼疾火室塞胸中量體虛實吐之火鬱發之義也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調磨

二釐服○絞腸痧腹痛不可忍或連心痛展轉在地手足亦有冷者乃腸絞縮在腹須臾能死急用熱湯

調鹽一兩灌入即安或再用陳艾陳棗陳水陳壁祛暑和中利濕消症自除兼以消導汗多者忌滲○祛暑

王各等分水煎連進三四服刺血法見急救祛暑和中利濕消症自除兼以消導汗多者忌滲○祛暑

香茹散黃連解毒湯清肺生脈散白虎湯加參紫寒熱不定小柴胡湯寒鬱其暑須反治伏陰在內之時

○和中大小調中湯茹苓湯枇杷葉散胃苓湯桂苓甘露飲六和湯寒鬱其暑須反治伏陰在內之時

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加苓

砂仁或大順散或二氣丹冷水下丹丸皆治因暑傷冷
非溫散治暑之謂也誤服發黃發斑蓄血悶亂而死
內傷滋補免清癯者一以滋補為主慎用天熱大

涼之劑暑重尿赤者清暑益氣湯暑輕力倦者補中益氣湯
或為丸中賜暫加香茹扁豆陰虛者滋陰降火湯腎氣丸
三伏炎蒸尤可畏大熱傷氣養生家謂此時

至秋方凝其預防不獨羨香如時常禦暑體實者香茹散益元散
則化水而死預防不獨羨香如時常禦暑體實者香茹散益元散
虛者忌用蓋皮虛者不必因暑勞倦及

去升柴加黃柏芍藥五味子麥門冬有痰加半夏
也如氣衰精神不足煩渴懶食者生脉散誘行丸通用謝傳萬病無憂散

濕病滿
赤白濁 泄瀉 腹痛 水腫 黃疸 痢疾 腳氣

濕氣覺來分內外
風寒暑濕傷人便覺濕氣薰襲人多不覺有自外入者長夏鬱熱山澤蒸氣冒雨行濕
汗透沾衣多腰脚腫痛有自內得者生冷酒麪滯脾生濕鬱熱多腹肚腫脹西北人多

內濕東南內外又分上下中下宜利二便或升提
初入身沉重多困倦
為肢節痛或一身盡痛甚則濕聚

上黃喘咳
首如蒙
物以蒙之也單蒼朮膏妙着脾黃腫脹硬或臍下大便泄湯滲濕湯白着腎脚腰

小便濃
生湯當歸粘痛湯腎着湯青娥丸治外微汗通經絡微汗防已黃芪湯或羌活勝濕湯無汗者五

丹治內滲
便利大為妙工
滲利五苓散黃加茵陳一倍身痛加羌活一倍濕感風合桂枝湯或古法防風湯敗毒散

四氣相兼
兼中濕熱其除濕湯兼風合桂枝湯或古法防風湯敗毒散

大抵百病兼風
則必惡風有汗眩暈兼寒則必惡寒無汗或攣痛兼暑則必面垢煩渴兼濕則必腫滿沉

倦四氣互相兼
惟寒濕濕熱為病濕熱尤多尿赤有渴為濕熱多黑瘦膏粱之人以便清不渴為寒

濕多肥白淡食
之人昔有專用五積清熱燥濕兼補中火動肺金受傷則木旺侵脾令飲食不化鬱為痰

治寒濕防風通聖散
治濕熱宜哉
清熱燥濕兼補中火動肺金受傷則木旺侵脾令飲食不化鬱為痰

積甚則腹脹浮腫
實者下之虛者補脾利濕消導兼
通內外燥脾并升散燥脾板木丸大安丸單蒼朮

以清熱清燥湯是也
濕勝筋痠熱勝筋縮者尤效
汗有熱加黃芩中焦濕加猪苓澤瀉滲利熱加黃連

或平胃散加桑白皮
為主濕在上焦加羌活蒼朮微汗有熱加黃芩中焦濕加猪苓澤瀉滲利熱加黃連

下焦濕加升麻防風
升提熱加防已黃柏龍胆草肥人多濕加蒼朮滑石瘦人多熱加芩芍沉困加參朮

又四製蒼柏
九三精丸
實者大便方可攻
元氣實而濕熱甚者導
水丸或除濕丹舟車丸

燥消渴
燥結

燥有內外屬陽明
大便不利時值陽明燥令久晴不雨黃埃蔽空令人狂惑皮膚乾枯屑起內因七情火燥或

助火邪消
總求金被火相刑
六氣風熱火屬陽寒燥濕屬陰但燥雖屬秋陰而反同風熱火化蓋火盛則

燥血液
為風癰或手足癱瘓偏枯或十指反而莫能搔痒或為雀目內障入心則昏冒僂仆語言蹇澀入脾則隔

滿不食或善饑而瘦或傷積變為水腫腹脹入肺則毛焦乾疥癩鬱咳入腎則津液竭而煩渴及骨蒸

秘結總皆肺金所主
秘勁渴秘雖風熱表裏俱宜潤衛榮
相天皮膚皺揭四物湯去川芎合生脉散加知

陽明與肺為表裏也
大秦芫湯○裏病消渴活血潤燥生津飲○燥結因肝木自旺或肺風入大腸者曰風燥燥風順氣丸因

臟腑積熱或久病鬱熱者曰熱燥四順清涼飲當歸龍薤丸因脾胃伏火便閉不食者曰血燥四物湯加

大黃桃仁或為丸服大便偏秘者導滯通幽湯小使偏秘者導氣除燥湯陰虛火燥者曰虛燥單黃柏丸

補陰丸腎氣丸勞復氣虛燥者補中益氣湯通用四物湯去芍為君天來門冬為臣水蓼為佐升麻紅花

甘草為使風加秦朮或牛膝熱加黃芩血倍生地渴加天花粉五味子閉結加大黃郁李仁麻仁氣虛量

加參芪陰虛加柏大抵宜甘寒潤劑忌辛香動火及一切發汗之藥經曰燥者潤之養血之謂也蓋燥

則血澀而氣液為之凝滯潤則益旺而氣液為之流通由內神茂而後外色澤矣然積液固能生氣積氣

亦能生液當用氣虛者瓊玉膏津虛者單五味子膏血虛者地黃膏凡病遇天燥亦宜量加此等潤劑

火
小使不禁
夢遺
淋
脫肛
小便不通

火因內外分虛實
外因邪鬱經絡積熱臟腑此為有餘之火內因飲食情慾氣盛似火此為有餘火性暴無

常主病多
火病死入其暴變化無常一動便傷元氣偏勝移害他經內經病機十九條而屬火者五劉河

火散於各經浮遊之火入氣分無根之火入血
實火渴閉熱無間
實火內外皆熱口渴虛熱有間口無何

分消陰伏火故曰諸病尋痰火痰火生異症
實火渴閉熱無間
實火內外皆熱口渴虛熱有間口無何

虛火潮熱有
瀉實補虛升且降
實火因外感邪鬱在表者九味羌活湯半表裏小柴胡湯入裏大承氣湯

狂者黑奴丸○虛火氣虛火感因勞倦傷胃無刀身熱宜保元湯補中益氣湯加芍藥黃柏或四君子湯
滲之如大病及吐瀉後身熱如焚命門脈脫為陽衰之病宜以辛熱溫養其火則熱自退附子理中湯
靈散主之○血虛火動因傷色慾午後發熱宜四物湯滋陰降火湯加味逍遙散腎氣丸人中白散若腎
水受傷生地玄參煎膏主之相火旺甚氣從臍下起者正氣湯坎離丸如氣從湧泉穴起入腹者虛極難
治四物湯加白馬膠骨降陰火以代芩連或人中黃亦好外用附子末津調塗足心亦有濕熱鬱者○飲
食鬱火因內傷生冷及飲食不化抑遏陽氣於脾土四肢熱如蟻行以升散之劑發之升陽散火湯火鬱湯
瀉陰火升陽湯○七情五志火起宜隨各經調之大怒火起於肝則手掉目眩清肝湯加龍膽草古茶連
丸醉飽火起於胃則痞塞腫滿瀉黃散戊己丸單石羔丸悲哀火起於肺則氣逆肺鬱瀉白散加黃芩
瀉心湯黃芩丸單苦參丸房勞火起於腎則骨蒸潮熱火補陰丸滋腎丸單黃柏丸心火輕則煩熱痛痒單
重者從其性而升之君火正治可以濕伏故曰五志之火動極不治○總論虛火可補實火可瀉輕者必
之即如實火發狂宜三黃硝黃正治虛火發狂宜先與姜湯然後補陰其火自降凡火瀝折惟從其性而必
酒炒過或兼溫散甘緩又有君相民皆靜且和五行惟火有二心為君火一身之主腎為相火遊行於身
可發汗者風寒生冷鬱也
天賦不可無者若五志之火則由於人是以內傷火多外
感火少噫火不妄動動由於心靜之一字其心中之水乎

內傷

調理脾胃

傷食
痞塊

積聚
蟲瘴

調理脾胃濕熱

脾性濕主乎血陰也胃火化主乎氣陽也太濕則氣滯大乾則血燥濕熱調停則能食
能化而氣血生旺或寒濕傷脾則停飲難化或不思食燥熱傷胃則停食不消或善

調理脾胃

食而瘦由是脾胃不和交相為病胃變為寒脾變為熱大藥以脉浮緩而遲或帶緊為
寒濕脉浮緩而實或細而數為燥熱又肥人多濕瘦人多熱更參以飲食厚薄可也且按心口疼不疼

調理脾胃

勞傷手按心口不痛食傷初寒久則熱勞倦初熱久寒生勞倦傷初起熱中宜甘溫補中久變寒中宜辛
食傷手按心口刺痛食傷初寒久則熱勞倦初熱久寒生勞倦傷初起熱中宜甘溫補中久變寒中宜辛

調理脾胃

熱宜辛甘熱病多火痰量吐便或大濕病腫脹瀉難停消補清熱與燥濕傷元氣不足宜補益食
苦寒潤之熱病多火痰量吐便或大濕病腫脹瀉難停消補清熱與燥濕傷元氣不足宜補益食

飲食俱傷補益消導兼行其中或兼清熱或兼燥濕○補劑補中益氣湯主之消導停食枳梗二陳湯
加山查麥芽枳朮元停飲胃苓湯加半夏化痰丸○清熱小調中湯橘皮竹茹湯凝神散三黃枳朮丸保

和丸○燥濕二陳湯六君子
湯理中湯生胃丹單蒼朮膏
瀉黃散清胃散調胃承氣湯
丸附子理中湯丸補真丸脉
緩濡無力或時隱伏正氣虛
而損也四君子湯參苓白朮
散脉沉細寒邪所乘益黃散
人參養胃湯
自甚也
平胃散

氣
氣滯
氣刺痛

諸氣皆因火作孽
七氣喜怒憂思悲恐驚又曰九氣者挾外感寒熱而言也人身陰陽正氣呼吸升降流
濁火藏薰蒸津液成痰痰鬱成積初起宜四七湯七氣湯辛溫消散稍久宜二陳湯加苓連山梔或當歸
龍蒼丸木香檳榔丸辛涼以折之最忌辛香助火耗氣之劑雖木香亦好上井必佐以知母黃柏丹溪云
上井之氣自肝而出中挾相火間傷生冷與寒熱下香肝積食生冷嘔逆積痛者治中湯加木香或蟠葱散
其熱為甚自覺其冷非真冷也
過飢胃脘痛者四君子湯加木香○挾寒則膝理密而氣斂於中五積散人參四逆湯挾風分心氣能挾
風寒犯腦羌活附子湯挾寒濕五苓散五苓能升降諸氣通利三焦非特分利而已凡此熱劑明知口傷
冷物身受寒氣而後取用亦變法也高陽生專謂冷生氣者泥矣○挾暑喜驚恐驚勞動
熱則膝理開而汗泄於外黃連香茹散加麥根或清暑益氣湯加木香
心氣散不飲過則健忘歸脾湯恐傷腎精怯不尤過則下焦脹滿三和散補中益氣湯驚傷膽神亂不定
過則怔忡失志妙香散十味溫膽湯此三者皆令真元耗散多見不足之症又勞則喘息汗出亦令氣散
尤宜怒懣憂悲思慮逸靜滯結憂傷肝氣上逆過則嘔吐枳梗二陳湯紺珠正氣天香湯熱者柴陳
補益怒懣憂悲思慮逸靜滯結憂傷肝氣上逆過則嘔吐枳梗二陳湯紺珠正氣天香湯熱者柴陳
五膈寬中散悲傷心胞及肺系其氣急過則為狂者枳壳煮散升陽順氣湯思傷脾其氣結過則痞滿退
熱清氣湯溫膽湯木香化滯湯木香枳朮丸此四者皆令氣鬱結多見有餘之症又逆則氣滯亦令氣
結輕者行動即愈結為積聚散虛中木香分氣丸大黃備急丸○氣散則中虛倦怠無力短氣不足以息
重者橘皮一物湯結為積聚散虛中木香分氣丸大黃備急丸○氣散則中虛倦怠無力短氣不足以息
宜調中益氣湯人參養榮湯自汗喘急者養正丹俗云氣無補法不思氣虛不運抑着為病不補氣何由
行且如喘嗽氣鳴以枳梗姜橘蘇桂調其氣以星半細辛點其痰而終不下降者氣之所藏無以收也必
佐以補骨脂補腎則氣始歸元是走注眩暈吞酸噎膈胸膈腹腸胃筋着於一處則眩暈嘔吐吞酸噎膈痞
經曰結者行之散者益之是也

痺泄瀉心腹絞痛流氣飲子主之或木香勻氣
秘傳降氣湯燥者府子仁九清膈蒼沙九選用
氣閉胸滿百藥不効者五香連翹湯小承氣湯如壯盛人兼血兼痰宜審別
復元通氣散○痰壅則氣逆順氣導痰
湯蘇子降氣湯○其者稀涎散微吐之
起五味之偏無日不積此丹溪河間力主為火也雖然七情總發於一心七氣總隸於一氣陽也動則
為火故以降火化痰消積分治量其所稟厚薄而加減之大槩氣虛四君子湯氣實古烏附湯為主火多
合黃連解毒湯加知母枳殼痰多合二陳湯積多合平胃散痛加玄胡索青皮
痰寒加官桂吳萸便閉加木香檳榔男子血虛及婦人胎產氣疾合四物湯

血

吐血
便血

陽氣藏毒
咳唾咯

諸血先須分各經逆則上行順下行
陽盛陰虛錯經妄行火載則上升挾濕則下行是以上溢清道從鼻而出為衄留滯濁道從胃脘而出為
咳唾參入腸間從下諸而出為血痢結於腸胃則成積而為血瘕分經言之衄吐胃也咳唾肺也痰帶
血脾也咯血系腎也溺血小腸膀胱也下血大腸也牙宣胃或腎虛炎也又血從汗孔出者謂之肌外症
血從舌出者謂之舌衄心與肝也從委中穴出者謂之臑血腎與膀胱也大舉逆行難治順行易治外症

有潮夜反重
日無潮者輕有潮者重潮盛脉大者死然熱血亦能作潮
則滑氣寒則凝凝氣則其血立止或元氣本虛又因生冷勞役損胃失血者却宜溫補斂而有痰血凝滯又
當先去痰而後調氣則其血立止或元氣本虛又因生冷勞役損胃失血者却宜溫補斂而有痰血凝滯又
涼反致停痰胸
外感積痰宜涼
火之齊外感四氣邪傳經絡誤汗誤下以致邪逼經血妄行風症已清多
暑毒攻心嘔血者枇杷葉散去丁香香加黃連○濕症色如烟塵多下血者胃風湯當歸和血散○時毒身
熱吐膿者陽毒升麻湯○積熱因飲酒炙燔蓄熱三焦者黃連解毒湯黃連枳殼二味湯龍腦
蘇蘇丸四生丸大金花丸槐角丸○瘰癧因打撲損傷瘀聚胸膈者犀角地黃湯桃仁承氣湯內傷滋陰
補火自平
治宜開痰行氣二陳湯加酒紅花升麻歸身黃連虛者加參朮及附子一片熱者如山梔壯丹

外感積痰宜涼
火之齊外感四氣邪傳經絡誤汗誤下以致邪逼經血妄行風症已清多
暑毒攻心嘔血者枇杷葉散去丁香香加黃連○濕症色如烟塵多下血者胃風湯當歸和血散○時毒身
熱吐膿者陽毒升麻湯○積熱因飲酒炙燔蓄熱三焦者黃連解毒湯黃連枳殼二味湯龍腦
蘇蘇丸四生丸大金花丸槐角丸○瘰癧因打撲損傷瘀聚胸膈者犀角地黃湯桃仁承氣湯內傷滋陰
補火自平
治宜開痰行氣二陳湯加酒紅花升麻歸身黃連虛者加參朮及附子一片熱者如山梔壯丹

外感積痰宜涼
火之齊外感四氣邪傳經絡誤汗誤下以致邪逼經血妄行風症已清多
暑毒攻心嘔血者枇杷葉散去丁香香加黃連○濕症色如烟塵多下血者胃風湯當歸和血散○時毒身
熱吐膿者陽毒升麻湯○積熱因飲酒炙燔蓄熱三焦者黃連解毒湯黃連枳殼二味湯龍腦
蘇蘇丸四生丸大金花丸槐角丸○瘰癧因打撲損傷瘀聚胸膈者犀角地黃湯桃仁承氣湯內傷滋陰
補火自平
治宜開痰行氣二陳湯加酒紅花升麻歸身黃連虛者加參朮及附子一片熱者如山梔壯丹

外感積痰宜涼
火之齊外感四氣邪傳經絡誤汗誤下以致邪逼經血妄行風症已清多
暑毒攻心嘔血者枇杷葉散去丁香香加黃連○濕症色如烟塵多下血者胃風湯當歸和血散○時毒身
熱吐膿者陽毒升麻湯○積熱因飲酒炙燔蓄熱三焦者黃連解毒湯黃連枳殼二味湯龍腦
蘇蘇丸四生丸大金花丸槐角丸○瘰癧因打撲損傷瘀聚胸膈者犀角地黃湯桃仁承氣湯內傷滋陰
補火自平
治宜開痰行氣二陳湯加酒紅花升麻歸身黃連虛者加參朮及附子一片熱者如山梔壯丹

皮藹草生地木香氣急者加灰薤仁桂枝勞心無汗者從苓補心湯有汗者歸脾湯素鬱者清肝解鬱湯
氣壅子蘇子降氣湯如失血後被七情四物湯加木香檳榔陰虛者去木槵加玄參黃柏枳殼○內傷飲
食生冷滯胃清道氣濁血亂者理中湯加乾葛川芎治血能分陰陽定血脈冷量倒者加桂附傷酒吐血
者四君子湯加乾葛川芎○內傷勞役氣虛火盛者單人參湯或四君子湯加蒲黃人乳藕節傷力
吐血者豬肝蘆白芨末食或花藥石散內傷氣散汗出汚衣甚如紅染者黃芪建中湯妙香散或男胎髮
燒灰會之腦血十全大補湯○內傷惡色慾血衰火燥者滋陰降火湯加味逍遙散散鬱四物湯腎氣
丸
吁嗟男女無為疾。驚惕迷悶痞塊疼痛癰疽遺溺等症及婦人經閉崩中帶下皆血病也通用四物湯
涼血心加黃連小腸心胞絡仁木通肺加枯芩大腸實芩肝加條芩膽加黃連腎加黃柏脾加白朮胃
加大黃三焦地骨皮心胞絡壯丹皮清氣心與肺絡不通者加升麻引血歸經血止後加炒黑乾姜引血
石莖乾葛大腸三焦加連翹小腸赤茯苓膀胱滑石琥珀痰血加紅花桃仁韭汁童便以行之血來暴者
加薄荷玄參以散之血不止者加蒲黃京墨茅根久不止者加升麻引血歸經血止後加炒黑乾姜引血
還元血虛加龜板血燥加人乳保全脾胃可長生。血病每以胃藥收功胃氣一復其血自止他如嘔吐後發熱及傷
板血燥加人乳保全脾胃可長生。寒汗下後發熱但用調和胃氣自然氣退可見脾胃能統氣血

痰喘 膈噎 嘔吐 驚悸怔忡健忘
惡心 嘔吐 驚悸怔忡健忘

疫分新久內外邪。疫乃津血所成隨氣升降氣血調和則流行不聚內外感傷則壅逆為患新而輕者形
但疫症初起頭痛發熱類外感表症久則潮咳夜重者黃濁稠粘凝結略之難出漸成惡味酸辣腥鹹苦
注肢節疼痛類風症但疫症胸滿食減肌色如故脈滑不勻不定為異耳。遊溢諸經主病賒。為人如氣血
知疫病尤多生於脾多四肢倦怠或腹痛腫脹泄瀉名曰濕疫若扶食積痰血遂成瘰癧瘡疔於肺多毛
留於胃脘多嘔吐吞酸嘈雜上衝頭面烘熱名曰火疫若因飲酒乾嘔嘔臂脇痛又名酒疫升於肺多毛
焦面白如枯骨咽乾口燥咳嗽喘促名曰燥疫久為老疫鬱痰又七情疫滯咽膈多胸膈痞滿名曰氣疫
迷於心多怔忡顛狂夢寐奇怪名曰熱疫動於肝多眩暈頭風眼目翳動昏迷耳輪搖擺顴肋脹痛左癱
右瘓麻木蹠跛奇症名曰風疫聚於腎多足膝酸軟腰背強痛肢節冷痺骨痛名曰寒疫又名虛疫凡
身習習如蟲行或身中結核不紅不腫或頸項結核似瘰癧非瘰癧或走馬喉痺或胸腹間如有二氣交經
塞煩悶或背脊中常有一點如冷水冷痛或心下冰冷時痛或四肢腫硬似痛非痛或骨節刺痛無常處或
冷涎綠水黑汁或大小便膿或關格不通以至癆瘵疰毒婦人經閉小兒驚搐皆須先去敗瘵然後調理
他如關家胸骨撲傷刺痛不已散血之劑固功續以此風青寒黑濕色白。風疫外感賊邪或腎枯木動或內
自己小便飲之須臾吐痰其痛立止百病兼瘵如此風青寒黑濕色白。風疫外感賊邪或腎枯木動或內

龍虎丹風熱小省風湯搜風化痰丸回神丹竹瀝膏○寒痰因形寒飲冷色深青黑如灰善睡或喘輕者
五積散薑香正氣散重者溫中化痰丸古半疏丸○濕痰或外感濕滯或停飲不散色白喘急者千絳湯
心痛者單半夏丸或神市丸濕熱色黃者
中和丸清膈蒼沙丸在裏者青礞石丸
熱黃其則帶紅紫熱痰因厚味積熱或外感濕溫所致色黃其

痰火鬱稠粘氣如絮○痰因飲食不節過厚火蒸津液成痰稠濁二陳湯加芥連山梔或抑上丸潤下丸
火清金潤肺緩以治之薤白化痰丸痰鬱於心肺之久者凝滯胸膈稠粘難咯忌南星半夏燥藥宜開鬱降
出熱之不下形如破絮或如梅核四七湯久者換蘇子加黃芩山梔海石三仙丸千金指迷丸

食痞酒癖
脇痛加食痞因飲食不化結成痞塊橘半枳朮丸痰壅喘急者瓜蒌實丸山查麥芽煎湯下陰虛者黃白
中湯香附丸傷水心中堅大如柱者名氣分枳朮丸料煎服痰癖便如枳時有水聲者神保丸○酒痰小調

痰飲有五因只一汗吐下溫用莫差府從食脫吐出五飲六症留氣伏飲食為一也皆因飲
水及茶酒停蓄不散耳加外邪生冷之情相傳成痰即酒痰久而濕勝者與傷寒水症大同脈多弦滑或
伏脈下皮如反黑○痰飲水停腸胃腹響輒轉有聲令人暴肥暴瘦懸飲水流在脇咳唾則痛懸懸思水

溢飲水流四肢身體重痛支飲水停膈上脘逆倚息短氣留飲水停心下背冷如手掌大或短氣而渴四
肢痠節疼痛脇痛引缺盆咳嗽轉甚伏飲水停膈滿嘔吐喘咳痰熱惡寒腰背痛淚出或身惕瞶瞶仲景治
諸飲在皮裏膜外表分者大小青龍湯汗之在胸膈者瓜蒂散吐之在四肢經絡脇肋者五苓散分利之
在腸胃裏分者十棗湯下之此皆治標之霸道也從經汗以參蘇飲吐之以二陳湯加防風桔梗探之利

五飲湯下劑開結枳朮丸中問間以小半夏湯古草萊散枳朮丸
溫中化痰丸清氣化痰丸半夏溫肺湯隨虛實加減不必太泥
常法順氣與分導古法順氣為先分導
氣動者曰痰氣順氣導痰丸因火動者曰痰火清熱導痰湯因濕動者曰濕痰導痰湯主之通用二陳湯
能使大便潤而小便長尤為分導要藥風加南星皂角白附子竹瀝寒倍半夏加姜附姜汁火加石羔青

黛濕加蒼朮白朮燥加瓜蒌杏仁老鬱痰加海石芒硝水蜜食積加山查神曲麥芽停水加檳榔痰在脇
下加白芥子以行之痰在四肢加竹瀝痰在經絡用此探吐痰在皮裏膜外加白芥子竹瀝姜汁氣實用
刺墜下溫中潤肺家水冷痰溢上或昏暈夜喘上氣者八味丸三味安腎丸黑錫丹以鎮墜之如痰壅發

厥者蘇子降氣湯三生飲古疏永丹○脾虛不能運化者宜補中燥濕六君子湯加竹瀝姜汁等殺傷脾
失升降者補中益氣湯加半夏竹瀝姜汁○氣血虧乏痰客中焦閉塞清道者仍宜溫中燥脾二陳湯氣
虛合四君子湯血虛合四物湯陰虛腎火炎上肺燥者二陳湯合四物湯去川芎半夏加貝母桑門冬

瓜蒌仁桔梗潤而降之或腎氣丸三一腎氣丸九語云痰無補法且老痰凝滯膠固非暫用溫藥引導必有

痰

痰

痰

痰

痰

上海華樂山房校印

鬱與氣類參看寒鬱如心脾腹痛火鬱如脇痛
跌撲癰疽瘡癰濕鬱如腰脚疝痛分見各類

不得變化故法以順氣為先降火化痰消積分多少治與諸氣
大同凡病當先尋六鬱與痰火有則急治於此無則依雜症治
久則升散三焦通

發在何經加各經火氣
又五鬱治法見第七卷
氣痰滿胸血能食
湯料參之此雜病治法
總要也氣鬱胸滿脇痛
脉沉濡如木香

鬱遇身關節走痛首如物蒙足重亦然遇陰寒者風寒鬱則

或二藥易加參朮紅花炭火其者以平人上納下化水穀滋沛身中陰氣自生如失名

草煎熟入姜汁少許熱服以散其鬱加當歸黃柏沙參或玄參以養其陰痰加其心夏加麥門冬冬加補骨脂益當歸隨參補血白芍隨二朮除鬱因食冷物鬱遏陽氣於脾土中多因血

虛而得之故用炒黑山梔解五臟結蓋少陰血若不早治復忽酒色癆瘵之由也

積熱

積熱三焦審實虛口乾煩渴大便秘
實熱因口服金石炙燂夜卧熱炕或火烘衣被久則蘊積熱毒在上焦則咽乾口燥而具舌糜唇瘡在中焦則胸滿乾嘔作渴在臟腑則

大小便閉法當清心解毒上熱涼膈散中熱調胃承氣湯下熱八正散三焦俱熱三黃湯大金花丸○虛熱因消燦腎水相火炎上口渴煩燥精神短少心悸自汗懶於動作夜臥睡語法當降火滋水三補丸主之或只清之

實分氣血清各經血氣分實熱白虎湯或敗毒散加荆芥青皮白朮血分實熱四順清涼飲氣潤之而已

黃散肺熱瀉白散腎熱滋腎丸小腸熱導赤散胃熱瀉胃湯大腸熱瀉白湯勝之虛炎升降與滋益氣分虛

壯熱加味石羔湯然諸熱皆屬於心熱甚則能傷陰宜砂安神丸以清鎮之

蓮子飲甚者龍腦雞蘇丸久者宜升陽以散之小柴胡湯合四君子湯升陽益胃湯補中益氣湯或疑補中益氣何以治熱孰不知熱因熱用溫能除熱之理蓋大熱在上大寒必伏於內溫能退寒以助地氣地

氣者在人乃胃之生氣使真氣旺而邪熱自退○血分虛熱四物湯加苓連山梔或為丸服久則滋陰以降之秦艽扶羸湯或古歸芪湯滋陰降火湯蒸熱者加味逍遙散散聚離丸○氣血俱虛熱升陽滋陰兼用

十全大補湯人參養榮湯俱加知母黃柏然虛風痰濕熱常相兼變症多端難執一治風熱或熱甚生熱者兼熱久必脾胃不和三白湯參苓白朮散調之

者治其熱而風自消凡頭目腫痛眩暈眼目昏赤耳聾鼻塞口燥舌乾牙宣牙腫斑疹之類皆風熱炎上之所為也初起上攻者川芎茶調散至寶丹四神丹上清丸久而下注血衰者腎氣丸加知母黃柏或當歸龍薈丸四生散心痰熱者因痰生熱或因熱生痰因濕生熱或因熱生濕凡見瀉下痢水腫鼓脹黃疸

痰火滯中之所為也地調中湯大調中湯○濕熱者因濕生熱或因熱生濕凡見瀉下痢水腫鼓脹黃疸遺精白濁痺痛腰痛脚氣之類泄濕熱下流之所為也治見各條丹溪治濕熱上焦黃芩虛者天麥門冬代之中焦黃連虛者白朮茯苓葛根代之下焦草龍胆防己黃柏虛者肥人蒼朮南星滑石瘦人牛膝橘

柳桃仁紅花經曰治病必求其本此風熱度熱濕熱乃百病之根本也

諸虛發熱惡寒自汗盜汗養老痰癆瘵

諸虛專要辨陰陽血陰而氣陽也有暴虛而無傷損者易復有虛而虧損者亦可補益惟久虛而傷壞者弦而微為血虛脈濇而微為血虛甚或寸微尺大而緊者陰虛食少神昏精不藏腰背胸脇筋骨痛潮汗

痰嗽是其常見一二便是外因新損容易復於心因感寒久則損陽自上而下一損於肺則皮聚毛落二損於脾者死二損於肝則筋緩不能自收持三損於脾則飲食不能消冠治宜酸苦若鹹過於脾則不可治矣

又不內外因驚而奪精汗出於心則損脈疾走恐懼汗出於肝則損筋搖體勞苦汗出於脾則損肉飲食飽甚汗出於胃則損腸持重遠行汗出於腎則損骨治宜酸苦若辛散於心則不可治矣抑論心肺損而色應汗多者為陽虛肝腎損而形疲汗多者為陰虛經云損其肺者益其氣損其心者補其榮血損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精是以古方肺損症見四君子湯心損症見四物湯加龍骨牡蠣四肢煩熱酸疼心悸腹痛者小建中湯汗多力少筋骨拘急者黃芪建中湯汗多脈暴結者炙甘草湯暴損氣虛有汗潮熱者補中益氣湯氣虛無汗潮熱者人參養榮湯血虛無汗潮熱者茯苓補心湯暴脫血者益胃升陽湯潮汗疾嗽者黃芪益損湯加半夏大

勞慾久虛成內傷

病後食減盜汗者參苓白朮散加黃芪當歸

虛而面無血色驚悸夢遺盜汗極則心痛咽腫汗勞盡力謀慮則筋骨拘攣極則頭目昏眩脾勞意外遇思則脹滿少食極則吐瀉肉削四肢倦怠關節肩背強痛肺勞預事而憂則氣乏心腹冷胸背痛極則毛焦津枯咳嗽悶熱腎勞矜持志節則腰骨痛遺精白濁極則面垢脊痛此五勞應乎五極者也若原因肺虛以致臟虛臟腑俱虛視聽已衰行步不正名曰精極令人精濁莖弱核小故又曰六極極即傷也七傷者推原勞極之由久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋房勞思慮傷心腎則陰虛血虛勞役餓飢傷胃脾則陽氣虛此傷症之至要也○陰虛四物湯二宜丸腎氣丸火動外潮者四物湯加知母黃柏或滋陰降火湯丸加味逍遙散補陰丸火燥甚者大補陰丸單天門冬膏○陽虛四君子湯保元湯火衰中寒身冷者鹿茸大補湯從蓉散加減內固丸三仙丹溫腎丸臍臍補天丸班龍丸○陰陽俱虛八物湯固真飲子或丸人參養榮湯或十全大補湯加從蓉附子半夏麥門冬或八味丸有火者二至丸異類有情丸○心虛人參固本丸夢授天王補心丹朱子讀書丸肝虛天麻丸鹿茸四斤丸脾虛參苓白朮散橘皮煎丸蒼朮膏白朮膏參苓造化糕太和養肺虛單人參膏單調和心腎養脾胃不論陰陽損傷皆因水五味子膏腎虛小兒絲子丸玄兔固本丸三味安腎丸太極丸

調和心腎養脾胃

不論陰陽損傷皆因水

扶熱與氣細酌量

氣虛者下虛也熱者上熱也又言虛實者正

丸不受峻補者歸茸丸瑞蓮丸冷補丸兼補脾胃二神交濟丹還少丹天真丸返本丸

扶熱與氣細酌量

氣虛者下虛也熱者上熱也又言虛實者正

赤芍脾熱加山梔石斛升麻肺熱加知母桑白皮秦艽茅慈腎熱加玄參赤茯苓前子生地更參積熱門虛炎治法○挾氣者交感丹古菴云心腎主血心惡熱而腎惡燥則清熱潤燥之藥是補心腎而瀉肺脾

也肺脾主氣肺惡寒而脾惡濕則溫寒燥濕之藥是補肺脾而瀉心腎也局方舉用平香燥劑以能健脾胃食然陰血消而心腎損以致虛極火炎面紅發喘痰多身熱如火鐵腫溼泄脈緊不食者死噫凡虛皆陰血陰氣虛也若真陽虛亦不可治從來養性延年藥只是中和功更長溫藥峻補之謂也精不足者溫之以氣溫存以養使氣自充非然之味非膏粱之謂也今人無病貪補而致病者有之有病貪補而不依症用藥反增痰火者有之非惟不足卻病延年亦非養心養性之道且少年慾火正熾尤宜戒補中年以後必資藥餌扶持者亦須量體虛從緩治不可責効目前反致奇疾大槩腎虛者瓊玉膏還元秋石丸延年益壽不老丹耳目衰者還元丹四聖不老丹松柏實丸腎虛無火者何首烏丸卻老烏雞健陽丹腎虛有火者八仙添壽丹羸瘦者大造丸紫河車丹血疾者女貞丹柏葉煎相脂丸秤金丹風疾胃火者松脂丸松梅丸風疾無火者仙人飯痰火瀾涎者茯苓煎氣弱者單人參膏血燥者單天門冬膏地黃膏脾虛者白朮膏脾腎俱虛者加味蒼朮膏此皆養性延年之藥亦必因病選用

沉寒痼冷

沉痼大補

血氣暖脾胃。人身真陽耗散脾胃虛弱加以食寒生冷嗜慾過度以致臟腑停寒不能謂之沉寒積冷不解謂之痼冷宜十全大補湯鹿茸大補湯加姜桂雄附以滋氣血補下元

若原只因生冷傷脾者四桂散附子理中湯補真丸專補脾胃可也又有陰虛內熱因傷冷藥吸將男精

女帶吐瀉奇

或暴下或久瀉或吐瀉俱發宜古半附湯附子理中湯沉香導氣寒肢冷心腹痛三五七散登胎丸遺精金鎖正元丹究源心腎丸疏苓丸崩帶見婦人門腦寒肢冷心腹痛三五七散

四肢冷者古姜附湯古桂附湯氣虛冷汗出者古參附湯古芪附湯血虛冷者古茸附湯通身冷昏暈者三建湯順元胃心腹絞痛甚者椒附丸復陽丹拔外感者正氣補虛湯剛劑慢投恐腎

衰。金液丹黑錫丹養氣丹返陰丹盡皆金石慢劑陰虛性緩漸服取陰取陽無過治。王永此語亦吾師以古

三建湯治心經之元陽虛者責其無火也。大補陰丸治腎經之真陰虛者責其無水也。蓋人之所藉以生

者陰陽之氣耳。不善調攝偏熱偏寒病未至甚治之難若夫精熱始而涼和次而寒取寒取不愈則因

熱而從之從之不愈則投窮矣。由是辛熱比年而弗止殊不知以寒治熱而溫和不衰者由於真水之不足也。以熱

治寒而寒不愈者由於真火之不足也。不知水火不足泛以寒熱藥治非惟臟腑習熱藥反見化於其病而有者弗去無者復至矣。故取之陰所以益腎水之不足而制心火之有餘也。取之陽所以益心火之不足

足勝腎水之有餘也。火之原者陽氣之根。水之主者陰氣之根。非謂火為心而涼為肺。水為腎而主為肺也。此太僕達至理之妙也。又積熱用苦寒藥。必姜汁酒製。沉寒用熱藥。如附子。必用童便蜜製。蓋寒因熱用。熱因寒用。忍相達逆故也。

右雜病提綱

雜病者。或兼外感風寒。暑濕燥火之氣。或挾內傷宿食。氣血痰鬱虛實之情。外感驟則為四中。內傷久。則為沉痾。所以提之於前。以見其為百病大綱。其餘症。皆由此變出。醫能知此門戶。又能知從頭至足問症之法。第一辨其為內傷耶。為外感耶。外感手皆熱。而口能知味。內傷手心熱。而口不知味。外感傷風惡風。面光有汗。傷寒惡寒。面慘無汗。傷暑惡熱。煩渴面垢。傷濕惡濕。重着面黃。內傷勞役傷氣。則惡勞而心口不痛。飲食傷脾。則惡食而心胃刺痛。若夫色慾傷腎。則愈好色而骨蒸口多嗜味。陰虛火動故也。七情思慮傷心。與脾則益善思而恍惚不寐。憂怒傷肺與肝。則愈動氣而痞滿眩嘔。口仍失味。諸氣拂鬱故也。一切血症。日輕夜重。一切痰症。食少肌色如故。一切火症。性急潮熱。一切水症。脇硬心下怔忡。至於辨症虛實。俱以似傷寒陽症者為熱。且積也。似傷寒陰症者為虛。且寒也。又辨其內外有無相兼多寡。或內不外。而為本經自病。男子必審房勞。女人先問經孕。與所處順逆。及曾服某藥。然後証之以脉。萬無一失。噫。機括熟而門類顯者。惟不脉而藥可以廣及。然亦難乎其人之妙悟也。病家一時緊急。盡醫辨。正且將此提綱理會。亦不致差門戶。以後分類有言。外因風寒暑濕。內因七情痰血。痰火食積。而不詳言其症者。正以括之於此也。以意會之。醫門斯可入矣。

雜病分類