

第三冊

內經宣明

雜證方論卷十一內有婦人小兒方

三朝名醫方論

黃帝素問宣明方論卷之七

金河間劉守真撰集

繡谷吳繼宗校刊

積聚論

素問曰積聚留飲痞隔中滿濕積霍亂吐下瘕瘕堅硬腹滿皆太陰濕土乃脾胃之氣積聚之根也積者不散聚者不化留者不行飲者停滯痞者不通隔者阻也中滿者濕為積霍亂吐下為留停瘕瘕者微也瘕假也斯疾迴五臟六腑陰陽變化興衰之制也亢則害承制極則反矣

謂水得燥則消散而得濕則不消乃為積飲也謂人形精神與榮衛血氣津液出入通流謂夫腠理閉密乃為痞也謂腸胃膈絕傳化失常而乃滯也土主形體腹滿於中央乃曰中滿以傳化失度故甚則霍亂吐瀉也瘕者腹中堅硬按之應手然水體柔順而今反堅硬如此者亢則害承乃側也瘕者中雖硬而忽聚忽散無其常故其病未及瘕也經曰血不流而滯故血內凝而乃瘕也

小腸移熱於大腸乃為瘕瘕大腸移熱於小腸謂兩熱相搏則血溢而為伏瘕血溢不利月事沉滯而不行改行為瘕瘕為瘕與伏同瘕與孤同為傳寫誤也世傳冷病然瘕病亦有熱或陽氣鬱結怫熱壅滯而堅硬不消者世傳為寒瘕瘕也或堅痞腹滿急痛寒主筋縮寒故急主痛

極血凝泣而反兼土化制之故堅痞之腹滿或熱鬱於內而腹滿堅結痛不可忍者皆可為誤矣誤矣

何不以脉證辨之凡諸疾病皆有陰陽寒熱宜推詳之五臟六腑四季皆有積聚心之積名曰伏梁在於臍上大如臂上至於心橫於心下如屋梁故曰伏梁肝之積名曰賁音氣在左脇下覆如杯有頭足久不愈令人痰瘡脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如杯名曰息賁結在右脇下覆大如杯久不愈令人灑漸寒熱喘咳發為肺癰腎之積名曰贍音狔狔在於小腹上至心下如狔賁走往來無定久不愈令人喘逆發為骨痿少氣乏力此為五藏之積也常究斯義未可悉也

傳其所勝者死傳不勝者可治假令肺病傳肝肝病傳脾脾病傳腎腎病傳心心病傳肺皆傳所勝五藏之氣虛而內外諸邪所侵故留稽不行遂成積聚其脉沉細而微者是也

木香三棱丸 治一切氣悶胸膈疼痛滿滯衝不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛

無問久新矣

青木香

破故紙

茴香

黑牽牛

甘遂

芫花

大戟

荆三棱

蓬莪茂

川練子

葫蘆芭

芭

戟

已春兩

芭豆

去皮不出油二分

陳米

春將芭豆一處同炒黑

縮砂仁一兩半

右件一十五味用好醋二升除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿入鍋煮盡為度乾為細末醋麪糊和丸如菽豆大每服五七丸食後加減有虛實隨湯水下

導氣枳殼丸

治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分氣逐風功不可述

枳殼

去穢麤炒

木通判炒

青皮去皮

陳皮去白

桑白皮判炒

蘿蔔子

微炒

白牽牛

炒

莢茂

煨

黑牽牛炒

茴香炒

荆三稜

煨各等分

右為末生薑汁打麪糊為丸如桐子大每服二十丸煎橘皮湯下不計時候

透膈寬腸散

治腸上壅實膈熱難行者

白牽牛

一兩

芒硝

三兩

川大黃

二兩

甘遂

半兩

右為細末食後溫蜜水調下一錢虛實加減踈動止

蜜補固真丹

治脾腎真元損虛泄痢痰嗽噦痞水穀酸臭飲食無味嘔腹冷痛肢體麻痺下

虛痿厥上實壅滯腎虛耳鳴脾虛困備耳焦齒槁面黑身悴目黃口燥髮墮爪退風虛偏

枯中滿膈氣一切脾胃虛證常服補養宜通氣血

天南星

牛兩

半夏

製神麤

麥蘖

茴香

炒

京三稜

炮各兩

白附子

乾生薑

官桂

分

川烏頭

生各一兩

芭豆

七箇

牽牛

二兩

代赭石

二兩

右為末水和九小豆大每服十九加至五十九溫水下除泄瀉外並加大黃一兩

本香九 治和脾胃寬胃隔消痰逆止嘔吐進益美飲食

官桂

乾薑各半

木香一分

大黃

蓬莪茂

芫花

醋拌溫炒乾

枳殼去穰

陳皮

各半

半夏二兩

牽牛

半斤取末四兩

茴香

一兩炒

芭豆

四箇

右為末滴水為丸如小豆大每服二三十丸溫水下

軟金九

治心胸腰腹急痛或淋悶并產後經病血刺腹痛

當歸

牛兩

乾漆二錢

斑猫

錢生用各為細末

輕粉

硃砂

粉霜

各一錢

芭豆霜

二錢研

右同研勻棗肉為膏和丸棗豆大新水下一丸病甚者加得利後減

泥金九

治心腹急痛取久新腸沉垢積滯推陳致新

黃蘗

大黃

芭豆

五靈脂

各半兩

猪牙皂角一分

輕粉

粉霜

硃砂各一分乾漆二分

右研勻煉蜜拌得所杵于下丸棗豆大新水下一丸未利更加服

狀元丸

治膈氣酒膈酒積涎嗽腹痛吐逆痞滿

芭豆

五十各取霜

神麴

半兩末

半夏

一兩洗

雄黃

白麴

一兩炒

右研勻滴水丸小豆大細米糠炒變赤色食後溫水下童子二九三四歲一九歲半半丸止噉溫瀉汁下止嘔吐生薑湯下

玄胡丸 治積聚癥瘕解中外諸邪所傷

玄胡索 青皮去白 陳皮去白 當歸 木香 雄黃別研 京三稜 生薑各二兩

右為末酒麪糊為丸如小豆大每服五七丸生薑湯下

又一方 無陳皮 生薑 有廣茂二兩 檳榔分兩同

大延胡索散 治婦人經病產後腹痛腹滿喘悶癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

延胡索 當歸 芍藥 京三稜 川苦練 蓬莪茂 官桂 厚朴

木香 川芎各一分 桔梗 黃芩 大黃各半兩 甘草一兩 檳榔二錢

右為麤末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食前如惡物過多去大黃官桂加黃藥

子染槐子龍骨各半兩如前法煎服平人心急痛加本方得利尤良後常服

三稜湯 治癥瘕痰癖積聚不散堅滿痞膈食不下腹脹

荆三稜二兩 白朮一兩 蓬莪茂半兩 當歸半兩 煨 檳榔 木香三錢

右為末每服三錢沸湯煎服食後每日三服

消飲丸 治一切積聚癥癖氣塊及大小結胸痛不能仰按

天南星

半夏

芫花

自然銅等分生用

右爲末醋煑麩糊爲丸如桐子大每服五七丸食前溫水下良久葱粥投之相虛實加減

除濕丹

治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急津液凝澁便溺不利赤癰疽疔癰發背疥癬走注脚氣無首尾瘡癰功效不可盡述

檳榔

甘蔗

藏靈仙

赤芍藥

澤瀉

葶藶

已去各二兩

乳香

沒藥二兩別研

黑牽牛

半兩

大戟

二兩炒

陳皮

白去白

右爲末麩糊爲丸如桐子大每服五十九至七十九溫水下後食如服藥前後忌酒一

日藥後忌溫麩食溫粥補暖

保安丸 治癰積心腹內結如拳漸上不止搶心疼痛及遠臍腹痛不可忍

川大黃

三兩新水浸一宿蒸熟切片子焙

乾薑

二兩炮

大附子

半兩去皮臍

鰲甲

二兩半好醋煮二升時炙令焙乾妙

右爲末取三年米醋一大升先煎四五合然後和藥丸如桐子大每服十九至二十九空

心醋或酒米飲下後取積如魚腸膿血爛肉汁青泥當下

開結妙功丸

治悌熱內盛癰癰堅積腸結癰癰積聚疼痛脹悶作發有時三焦壅滯二腸燥

澀懊懷煩心不得眠咳喘噦逆不能食或風溫氣兩腿爲腫脹黃瘦眠澀昏暗一切所傷

心腹暴痛風熱燥鬱偏正頭疼筋脉拘攣肢體麻痺走注疼痛頭目昏眩中風偏枯邪氣

工逆上實下虛脚膝冷痛宜通氣血

荆三稜炮

茴香

各二兩

川烏頭

四兩

神麴

麥蘖

大黃

各兩好醋半升熬成稠膏不燥
堅積不須熬膏水丸

乾薑二錢

芭豆

二箇破堅積用
四箇

半夏

半兩

桂二錢

牽牛

三兩

右為末膏丸小豆大生薑湯下十九十五丸溫水冷水亦得或心胃間稍覺藥力暖性却

減丸數以加至快利三五行以意消息病去為度

木香分氣丸

治積滯癖塊不消心腹痞結疼痛搶刺如覆杯狀

陳皮去白

檳榔各二兩破故紙

二兩炒

木香一兩半

黑牽牛

十二兩炒香熟取
末五兩半餘不用

右為末滴水為丸如桐子大每服二三十丸生薑湯下食後臨卧服

開胃生薑丸

治中焦不和胃口氣塞水穀不化噫氣不通噎塞痞滿口淡吞酸食時膨脹噦

逆惡心嘔吐痰水宿食不消咳嗽脇肋刺痛寬中開胃進美食

桂心一兩

生薑

一斤切片子鹽三
兩淹一宿再焙乾

青皮去白

陳皮去白

甘草

炙各
二兩

縮砂仁

四十九
箇

廣茂

當歸各半兩

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食前細嚼沸湯化下

導滯定功丸

治一切心腹卒暴疼痛及胸中不利消食逆定疼痛

大椒

木香各錢

蝎梢三錢

芭豆

八箇出油為度

右爲末後入芑豆霜研勻醋麪糊和丸如菴豆大硃砂爲衣每服五丸至十九丸淡醋湯下
積氣丹 治一切新久沉積氣塊面黃黑瘦諸氣無力癥瘕積聚口吐酸水

檳榔 二箇

芑花 一兩

硃砂 三錢

芑豆 二錢

青皮 去白

陳皮 各三錢

蓬莪朮

雞爪黃連

京三稜

章柳根

牛膝 各一兩

肉豆蔻 二箇

大戟

川大黃

甘遂

白牽牛

乾薑

青礞石

乾漆

木香

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

右爲末醋麪糊爲丸如桐子大每服一丸臨卧燒棗湯下每夜一丸有積者肚內作聲病

退爲度

金露紫苑丸

治一切脾積兩朋虛脹臍疼痛

草烏頭

生

黃連 半兩

官桂

桔梗

乾地黄

乾生薑

川椒

蕪荑

紫苑

去皮

柴胡

防風

厚朴

甘草

人參

鱉甲

酒浸

川芎

貝母

枳殼

去穰

甘遂

芑豆

二兩醋煮半日

硃砂

三錢

右爲末水煮麪糊爲丸如桐子大每服五丸空心臨卧米飲湯下或微踈動詳虛實加減

在香十方青金膏

灌頂法王子所傳十二上願云藥師瑠璃光如來應當供養正偏知行

足善遊世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊方境授治周身中外陰陽不調氣血壅滯變生百病乃至虛羸困倦偏攻酒食內

傷心腹滿塞急痛或酒積食積癰疽積聚瘰癧堅積中滿膈氣食臭酸醋嘔吐翻胃或膈
瘳消中善食而瘦或消渴多飲而數色角翳小便或腸風下血痔瘻痒痛或胃壅赤或偏身
癰疽惡瘡毒已入於裏腹滿嘔吐或成瀉痢或出惡瘡瘰癧肉或下痢腹痛或一切風氣肢
體疼痛及中風偏枯或痰逆生風痰涎嗽兼產後腹痛及小兒疳積諸風潮搐但乎人常
服補養宜行榮衛調飲食

信砒

乳香

輕粉

粉霜

芭豆

已各兩同研

龍腦

牛字

麝香

牛字

青黛

二錢同研

黃蠟

三錢

右研細末鎔蠟入蜜半錢就搓勻旋丸菜豆至小豆大先服小丸病在上食後在下食前
在中不計時候面東頂禮一九淨器盛水送下如合藥即淨處面東每一九密念呪三遍

或病人不能呪請人呪

或師氏呪過

呪曰

信香十方青金膏

藥師圍成蜜遍拋

普濟有緣除百病

常吞一粒體堅牛

密呪曰

但言八金剛

莫說十方佛

五蘊六根俱不道

十二上願自然成

逆氣丸

治心胸滿悶脇肋刺痛不思飲食常服寬膈進美飲食

薑黃 四兩

香附子 四兩

縮砂

甘草

廣茂 各二兩 丁皮

甘松

木香

荊三稜 各一兩

白檀 半兩

藿香葉 半兩

右爲末入菜豆粉二兩用湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服九二十丸細嚼白湯下食後

日進三服

丁香散

治痞癖氣脇下痞滿息而不消積而不散元氣在胃不妨食者

好丁香

于五箇

白丁香 于箇

密陀僧

舶上硫黃

黃鶯調

各五分

右爲細末每服一丸皂子煎湯調下不計時候治壯内生硬物黑瘦如柴嘔吐積滯日三

服食後

聖餅子

治一切沉積氣脹兩脇氣滿無問久新者

大黃 三兩

黑牽牛頭末 一兩

礪砂

三錢

山梔子

半兩

輕粉 二錢

右爲末煉蜜和丸捻作餅子如小錢大厚樣食後每服三餅子細嚼溫酒下臨卧如行粥

補之虛實加減

無憂散 一名萬病散

治風疾瘡腫疥癬或臟腑積冷壅滯氣結風勞膀胱宿冷臟腑虛衰面色

痿黃內有癰癖氣并常有疳虫虵虫攻心腹俱痛忽中傷寒頭痛不忌狀若山嵐時氣瘟

疫之疾並宜急服此藥宜通三五行立瘥或中風口喎語多蹇澁睡後口中涎出不限時

節不問男子女人但五日一服不過三服未瘥人患腰膝疼痛脚氣腫滿運動艱難飲食無味并小兒疳疔脫肛者量大小與服利三五行自瘥大人又泄氣痢狀若休息痢止有時俱一服取下冷膿一二升當日見効藥無四時冷熱老幼衰弱病患悉皆除之任服他藥無妨若服常時蓋緣搜出臟腑中積滯虫膿故也無孕婦人又患血虛氣弱痿黃無力者亦可依方服宜通氣候殊不困倦無妨此藥九有百病並皆治之其功不可具載有孕婦人或過陰晦時即不可服天道清明可進若雖復疾而未愈者再可服

黃耆

木通

桑白皮

陳皮

各兩

胡椒

白朮

木香

各半兩

白牽牛

蜀椒別取頭末

右七味爲細末每服二錢牽牛末二錢生薑二錢切作片子煎生薑湯一大盞調藥須臾

又用生薑湯或溫湯送下平明可行三五次快利無妨如病瘥後以白粥補之痊矣

五積丹

治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者

皂莢一錠

一尺寸大燒留性淨盆合之四面壅食物令出煙

芭豆十二箇白麴二兩二錢同炒令黃色爲度

右爲末醋麴糊爲丸菜豆大每服十九鹽湯下食後加減

金黃丸

治酒積食積諸積面黃疸積硬塊

荊三稜

香附子

半兩

澤瀉

二錢

芭豆

四十九粒油出

黍米粉

牽牛

二錢半

右爲末用梔子煎湯和丸如菜豆大每服三九至五九如心痛又醋湯下七丸

黃帝素問宣明方論卷之七終

黃帝素問宣明方論卷之八

金河間劉守真撰集

繡谷吳繼宗校刊

水濕門

夫諸濕者濕爲土氣火熱能生土濕也故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕物燥乾也濕病本不自生因於大熱怫鬱水液不能宣通即停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以為兼證云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不得宣行亦能爲濕雖有此異亦以鮮矣或跗腫體寒而有水者以畜熱入裏極深本非病寒也

三花神祐丸

治中滿腹脹喘嗽淋閉一切水濕腫滿濕熱腸垢沉積變生疾病久病不已

黃瘦困倦氣血壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛風疾涎嗽頭目旋運瘧疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔逆及婦人經病不快帶下淋瀝無問赤白并男女傷寒濕熱腹滿實痛久新瘦弱俗不能別辨或汎常只爲轉動之藥兼瀉久新腰痛及一切下痢及小兒驚疳積熱乳癖滿並宜服之

甘遂

大戟

芫花

醋拌濕炒各半兩

牽牛子

大黃

兩爲細末

輕粉一錢

右爲末滴水爲丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下每日三服加至快利後却

常服病去爲度設病愈後老弱虛人平人常服保養宣通氣血消進酒食病癖悶結甚者便多服則頓攻不開轉加痛悶則勿服兩丸每服加兩丸至快利爲度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法

崔宣武神祐丸

加黃柏一兩 牽牛四兩 大黃二兩 輕粉二錢 甘遂 大戟 芫花各一兩 依前法

劉庭瑞神祐丸 用此藥治水氣常得効 賈同知稱之不已乃神仙奇絕之藥也

葶藶木香散 治濕熱內外甚水腫脹小便赤澁大便滑洩

葶藶 茯苓去皮 猪苓去皮 白朮各一分 木香半錢 澤瀉 本通 甘草各半兩

辣桂一分 滑石三兩

右爲末每服三錢白湯調下食前此藥下水濕消腫脹止洩瀉利小便若小便不得通利而反轉泄者此乃濕熱痞悶極深而攻之不開是能反爲注泄此正氣已衰而多難救也慎不可攻之而無益耳

白朮木香散 治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧不敢食小便閉者

白朮 木猪苓去皮 甘草 赤茯苓 澤瀉各半兩 木香 檳榔三錢 陳皮二兩去白

官桂二錢 滑石三兩

右為末每服五錢水一盞生薑三片同煎至六分食後去滓溫服

大橘皮湯

治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑洩

橘皮二兩去白

木香一分

滑石六兩

檳榔三錢

茯苓二兩

木猪苓去皮

澤瀉

白朮

官桂各半兩

甘草二錢

右為末每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服

太便秘先服十索湯三日後再服此藥

葶藶膏

治水腫腹脹

牛黃

麝香

龍腦各一分

昆布

海藻二兩

牽牛

桂心各一分

椒目三分

葶藶炒

右為末別搗葶藶熬成膏丸如桐子大每服十九日再服稍利小便為度詳虛實加減

茯苓散

治諸般氣腫等疾

芫花

醋拌炒

澤瀉

郁李仁

甜葶藶

漢防己各一錢

陳皮去白

白檳榔

瞿麥各半兩

葶藶本二錢半

滑石三分

大戟

炒三分

右為細末每服一錢取桑白皮濃煎湯空心調下取下碧淥水如爛羊脂即瘥如未盡隔日

又服腫消如故不用服忌鹽百日

調胃散

治胸膈痞悶不思飲食脇肋硬痛消腹脹

半夏製

甘草炙

厚朴去蘖

陳皮去白

藿香各等分

右為末每服一錢生薑三片棗二枚水一盞同煎溫服食前

二氣散 治水氣蠱脹滿

白牽牛 黑牽牛 各二錢

右為末用大麥麴四兩同一處為燒餅臨卧用茶湯一盞下降氣為驗

雄黃神金散

雄黃 葶蘆一兩用糯米和炒
干熱米不用 澤瀉一兩 椒目半兩 大戟 芫戟去 茯苓去皮

芫花醋五升浸一日炒 甘遂 桑白皮已各一兩

右為末從發時加減一分空心用井花水調下每服一錢加至五錢以利為度忌鹽醋生冷

毒物油膩血物

從腳腫根在心加葶蘆 從肚腫根在腹加椒目

從陰腫根在胸加澤瀉 從膝腫根在肝加芫花

從面腫根在肺加桑白 從心腫根在肋加雄黃

從肢腫根在脾加甘遂 從口腫根在小腸加芫戟

從腰腫根在腎加大戟 從四肢腫根在胃加茯苓

萬勝散 治十腫水氣不可愈者