

金匱要略

卷

金匱懸解卷六

外感雜病

百合狐惑陽陰毒

昌邑黃憲補註載著

百合狐惑陰毒陽毒非同氣也而狐惑之神思迷亂有似百合陽毒之膿血腐敗頗類狐惑不同之中未嘗無相同之象而皆有表邪則同也百合之病有得於吐下發汗者有不經吐下發汗者是傷寒之變證也狐惑之病狀類傷寒是傷寒之類證也陽毒陰毒之病服藥取汗是傷寒之別證也其病氣之變現固以本氣之鬱發然非有表邪之外束則本氣何由而鬱發也此可以會通其病原也

百合一

百合病者百脉一宗悉致其病也意欲食復不能食常默然欲卧不能卧欲行不能行飲食或有美時或有不欲聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則劇吐利如有神靈者身形如和其脉微數每溺時頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛漸漸然者四十日愈若溺時快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月後見者各隨證治之

溺奴弔切
與尿同

百合病者傷寒之後邪氣傳變百脉一宗悉致其病百脉者六氣攸分五行不一而百脉一宗則殊途同歸悉致其病則

百端俱集意未嘗不欲食復不能食常默然無語動止不安
故欲卧不能卧欲行不能行飲食或有甘美之時或有惡聞
食臭之時如寒而無寒如熱而無熱口苦便赤諸藥不效得
藥則劇吐利不測身形如和其脉微數如是則經絡藏府莫
名其部寒熱燥溼莫名其條此有法焉觀其小便溺時頭痛
者水降而氣升也氣水一原在上則爲氣是謂上焦如霧在
下則爲水是謂下焦如瀆在水氣之交是謂中焦清氣昏蒙
心緒煩亂濁氣稍降頭目猶清溺時清氣降泄而濁氣升騰
頭上壅塞是以作痛此其病重兩月乃愈若溺時頭上不痛
但淅淅振悚者氣雖上升未甚壅遏其病頗輕四十日愈若

金匱要略卷六
二
溺時快然但覺頭眩者氣雖上升而不至填塞其病更輕二十日愈其溺時之證或未病而預見或病四五日方出或病二十日及一月後而見者各隨其病之輕重而治之也

百合二

百合病發汗後者百合知母湯主之

百合之病卽其溺時頭痛觀之是病在氣分也主氣者肺肺朝百脉百脉之氣受之於肺一呼則百脉俱升一吸則百脉皆降呼吸出入百脉關通是以肺病則百脉皆病肺氣清明則神思靈爽甘寢飽食肺氣不清則鬱悶懊懣眠食損廢矣是宜清肺肺氣清和百脉自調而其由來非一則用法不同

若得於發汗之後者是汗亡肺津金被火刑也百合知母湯

百合清肺而生津知母涼金而泄火也

百合知母湯十九

百合七枚知母三兩

石先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以清泉水
二升煎取一升去滓別取泉水二升煎知母取一升去滓
後合和煎取一升五合分溫再服

百合三

百合病下之後者百合滑石代赭湯主之

百合病得於下之後者是下傷中氣涇動胃逆肺鬱而生熱

也滑石代赭湯百合清金而泄熱滑石代赭滲溼而降逆也
滑石代赭湯 二十

百合

七枚

滑石

三兩
碎綿裹

代赭石

如雞子大一枚
碎綿裹

右先以水洗百合浸一宿當白沫出去其水更以泉水二
升煎取一升別以泉水二升煎滑石代赭取一升去滓後
合和重煎取一升五合分溫再服

百合四

百合病吐之後者百合雞子湯主之

百合病得於吐之後者是吐傷肺胃之津燥動而火炎也百
合雞子湯百合清肺熱而生津雞子黃補脾精而潤燥也

百合雞子湯 二十一

百合 七枚 雞子黃 一枚

右先以水洗百合浸一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內雞子黃攪勻煎五分溫服

百合五

百合病不經吐下發汗病形如初者百合地黃湯主之

百合病不經吐下發汗病形如初者瘀熱淫蒸敗濁未泄百合清金而除煩熱地黃泄胃而下瘀濁也

百合地黃湯 二十二

百合 七枚 生地黃汁 一升

右先以水洗百合浸一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升五合分溫再服中病勿更服大便當如漆

百合六

百合病一月不解變成渴者百合洗方主之

解缺

百合洗方

百合一升

右以百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮餅勿以鹽豉也

百合七

百合病渴不差者苦萆牡蠣散主之

百合病渴不差者是相火刑金而津液枯槁也苦萆牡蠣散

苦萆牡蠣散 二十七

苦萆根

牡蠣等分

右爲細末飲服方寸匕日三服

百合八

百合病變發熱者百合滑石散主之

百合病變發熱者是溼動胃遊而肺氣不降也百合滑石散
百合滑石而泄熱滑石利水而滲溼也

金匱要略 卷六
百合滑石散

百合一兩滑石二兩

右爲散服方寸匕日三服當微利者止服熱則除

百合九

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此爲逆見陰攻陽乃復下之此亦爲逆

百合病見於陰分者以陽法救之陽長而陰自消見於陽分者以陰法救之陰進而陽自退若見於陽者反攻其陰而發汗愈亡其陽此爲逆也若見於陰者反攻其陽而下之此亦爲逆也

狐惑一

狐惑之爲病狀如傷寒、默默欲眠、目不得閉、卧起不安、蝕於喉、爲惑、蝕於陰、爲狐、不欲飲食、惡聞食臭、其面目乍赤、乍白、乍黑、蝕於上部則聲啞、甘艸瀉心湯主之、蝕於下部則咽乾、苦參湯洗之、蝕於肛者、雄黃散薰之。

夏所嫁反沙去
声玉篇声破

狐惑者、狐疑、惶惑、綿昧不明、狀如傷寒、而病實在裡、默默欲眠、目不能閉、卧起不安、飲食俱廢、其面目乍赤、乍黑、乍白、而無定也。此蓋溼氣過鬱、精神昏憤之病也。溼邪淫泆上下、薰蒸浸漬、糜爛肌肉、剝蝕於喉、嚙其名爲惑、以心主藏神、陽分受病、清氣燔蒸、則神思惶惑而不靈也。蝕於二陰、其名爲

狐以腎主藏志陰分受傷濁氣薰燥則志意狐惑而不清也
蝕於上部其病在心心火刑金是以聲啞心火升炎下寒上
熱甘草瀉心湯參甘薑棗溫補中脘之涇寒芩連半夏清降
上焦之鬱熱也蝕於下部其病在腎腎脈上循喉嚨是以咽
乾其前在陰器則以苦參湯洗之後在肛門則以雄黃散薰
之蓋土濕木陷鬱而生熱化生蟲類前後侵蝕苦參雄黃清
熱而去溼療瘡而殺蟲也

上濕則脾陷而不消胃逆而不納故不能飲食君火不降則
見赤色辛金不降則見白色壬水不降則見黑色病見上下
而根在中焦總由太陰涇土之旺甘艸瀉心湯溫中清上培

土降濁狐惑之的方也

甘艸瀉心湯

二十六方見傷寒太陽

甘艸

四兩

半夏

半兩

黃連

一兩

黃芩

三兩

乾薑

三兩

人參

三兩

大棗

十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升

日三服

傷寒無人參

苦參湯 二十七

苦參

一觔

以水一斗煎取七升去滓熏洗

雄黃散

雄黃 爲細末筒瓦二枚合之燒向肛門熏之

狐惑二

病者脈數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四眥黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之

病者脈數而無表熱鬱鬱微煩默默欲卧自汗常出此狐惑之淫旺而木鬱者也初得之三四日目赤如鳩鳥之眼七八日目之四眥皆黑以肝竅於目藏血而胎火木鬱生熱內蒸而不外發故脈數而身和木賊土困故煩鬱而欲眠風木疏泄故見自汗邪熱隨經而走上竅故目如鳩眼營血腐敗而不外華故目眥灰黑此必作癰膿若能食者膿已成矣以肉

腐膿化木鬱鬆緩是以能食小豆當歸散小豆利水而泄溼
當歸養血而排膿也

赤小豆當歸散 一十九

赤小豆 三升浸令芽出晒乾 當歸 十分

右二味杵爲散漿水服方寸匕日三服

陽毒一

陽毒之爲病面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血五日可治七日
不可治升麻鱉甲湯主之

陽毒之病少陽甲木之邪也相火上逆陽明鬱蒸而生上熱
其經自面下項循喉嚨而入缺盆故面赤喉痛而吐膿血藏

氣相傳五日始周則猶可治七日經氣已周而兩藏再傷故

不可治經所謂七傳者死也

五十三難假令心病傳肺肺病傳肝肝傳脾脾傳腎腎傳心一

藏不再傷故言七傳者七日肺肝再傷故死也

升麻鱉甲湯升麻甘草清咽喉而鬆

結滯鱉甲當歸排膿血而決腐瘀雄黃蜀椒泄溼熱而下逆

氣也

升麻鱉甲湯 三十

升麻 二兩

鱉甲

手指大一片炙

甘草

二兩

當歸

二兩

雄黃

五錢研

蜀椒

一兩炒去汁

右六味以水四升煮取一升頓服之老小再服取汗

陰毒一