

卷六  
七

婦人良方

婦人良方卷之六

薛氏醫按

臨川陳目明編

吳郡薛已註

新

都

道政校

婦人熱勞論第一

婦人熱勞由心肺壅熱傷於氣血以致心神煩躁煩毒頭疼眼  
澁唇乾口舌生瘡神思昏倦四肢壯熱飲食無味肢體酸疼心  
恆盜汗肌膚目瘦或寒熱往來當審其所因調補氣血其病自  
愈矣

○愚按前症乃壯火食氣虛火煎熬真陰之所致也王太僕云  
如大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發  
晝止是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也  
熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助其腎心盛則

生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內竊謂  
前症若肝脾血虛用四物參朮肝脾鬱怒小柴胡合四物湯  
脾胃氣虛補中益氣湯肝脾血虛加味逍遙散肝經風熱加  
味小柴胡湯心經血虛天王補心丹肺經氣虛人參補肺湯  
肝經血虛加味四物湯大抵午前熱屬氣分用清心蓮子飲  
午後熱屬血分用四物參朮丹皮熱從左邊起肝火也實則  
四物龍膽山梔虛則四物參朮黃芪熱從臍下起陰火也四  
物參朮黃柏知母酒拌炒黑五味麥門肉桂如不應急用加  
減八味丸不時而熱或無定處或從腳心起此無根虛火也  
用加減八味丸及十全大補湯加麥門五味主之

### 附治驗

一婦人經行不調飲食少思日晡熱甚余以爲肝脾氣血俱

虛用十全大補加山茱山藥丹皮麥門五味而愈。次年秋寒熱如症仍用前藥而愈。

一婦人生育多胎月經不調兩足發熱年餘其身亦熱勞則足痠痛又年許脣腫裂痛又半年脣裂見血形體瘦倦飲食無味月水不行此氣血俱衰之症彼誤用通經丸等藥復傷氣血遂致不起惜哉。

△黃芪散

治發熱羸瘦心燥口乾不欲飲食或盜汗晡熱

人參

黃芩炒焦

當歸各三錢

柴胡五分

黃芪炒

地骨皮

白茯苓

麥門冬去心

生地黃

白芍藥炒各一錢甘草炒三分

右水薑煎

○△猪肚丸

治熱勞羸瘦

柴胡

赤茯苓

人參

黃芪各一兩



黃連炒三兩

地骨皮

木香各半兩

桃仁去皮

鱉甲各一兩

右為末用嫩猪肚一枚入藥縫合蒸熟研爛丸桐子大每服

三五十丸食前米飲下日一服

附方

清心蓮子飲 治熱在氣分口乾小便白濁夜間安靜書則發

熱又治口舌生瘡或口苦咽乾煩躁作渴小便赤澀下淋不

止或莖中作痛

黃芩炒

麥門冬法

地骨皮

車前子炒

甘草各一錢半

石蓮肉

茯苓

黃芪炒

柴胡去苗

人參各一錢

右每服五錢水煎

補中益氣湯

加味四物湯

四物湯 三方見二十四卷第六論

加味小柴胡湯

小柴胡湯 二方見二十四卷第二論

十全大補湯

加味逍遙散 二方見二十四卷第四論

天王補心丹 寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三

焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽乾育養心神

人參 去蘆

茯苓

玄參

丹參

桔梗

遠志 各五錢

當歸 酒浸

五味

麥門冬 去心

天門冬

柏子仁

酸棗仁 炒各一兩

生地黃 四兩

右爲末煉蜜丸桐子大用硃砂爲衣每服二三十九臨臥  
葉煎湯送下一方加石菖蒲熟地黃杜仲百部茯苓甘草此  
方內天麥門冬玄參生地雖能降火生血化痰然其性沉寒  
損傷脾胃尅伐生氣若人飲食少思大便不實者不宜用

人參補肺湯

方見二十四卷第十二論

加減八味丸

方見二十四卷第十一論

### 婦人客熱方論第二

婦人客熱由元氣虛而外熱乘之以致口燥心煩四肢壯熱肌  
肉消瘦治法當審其因而調補之

愚按前症若客邪所侵用補中益氣加川芎防風肝虛血少  
六味地黃丸胃火飲冷錢氏瀉黃散胃虛用七味湯白朮散  
潮熱時熱八珍湯晡熱內熱逍遙散發熱體倦補中益氣湯

志之發熱小柴胡湯鬱怒發熱加味歸脾湯寅卯酉戌時熱  
升陽益陰湯

附治驗

一婦人素有胃火服清胃散而安後因勞役躁渴內熱肌肉  
消瘦月經不行此胃火消燦陰血用逍遙散加丹皮炒梔以  
清胃熱用八珍湯加茯神遠志以養脾血元氣充足而經自  
行矣

麥門冬散 治四肢倦痛煩悶不食或寒熱往來

麥門冬去心

柴胡

赤茯苓

羚羊角鎊

赤芍藥

桑白皮炒

黃芪炒各四分

生地黃

甘草炒各三分

石膏水煎

附方



補中益氣湯 方見二十四卷第六論

六味丸 方見二十四卷第十一論

瀉黃散 方見五卷第三論

七味白朮散 方見二十一卷第二論

八珍湯

加味歸脾湯

逍遙散 三方見二十四卷第四論

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

升陽益胃湯 方見三卷第九論

清胃散 方見二十四卷首論

○婦人寒熱方論第三

經曰陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒皆由勞傷氣血

陰陽不調寒熱如疲也當分氣血虛實而治之

○愚按前症若寸口脈微名曰陽不足則陰氣上入於陽中用補中益氣湯若尺部脈弱名曰陰不足則陽氣下陷入陰中用益陰腎氣丸若因氣血俱虛用八珍湯若因怒動肝火用小柴胡湯若陰陽俱不足則氣血不歸其本部以致寒熱交爭也

附治驗

一婦人年六十有四入鬱怒頭痛寒熱春間乳內時痛服流氣飲之類益甚時有血如經行又大驚恐飲食不進夜寐不寧兩乳腫脹兩脇炊痛午後色赤余以爲肝脾鬱怒火爆先以逍遙散加酒炒黑龍膽一錢山梔一錢五分服二劑腫痛頓愈又一劑全愈再用歸脾湯加炒梔貝母諸症悉愈

△地骨皮散 治血風氣虛時作寒熱或晡熱內熱

柴胡 地骨皮各一兩 桑白皮炒 枳殼炒

前胡 黃芪炒各五分 白茯苓 五加皮

人參 甘草 桂心 白芍藥各三分

右薑水煎服

△柴胡散 治寒熱體痛口乾心煩飲食少思肌體消瘦

柴胡 黃芪炒 赤茯苓炒 白朮各錢

人參 地骨皮 枳殼炒 生地黃

苦梗 桑白皮炒 赤芍藥各三分 鱉甲錢

麥門冬去心錢 甘草三分 右水薑煎服

△益陰腎氣丸 治諸臟虧損發熱晡熱潮熱盜汗或寒熱往來

五心煩熱或口乾作渴月經不調或筋骨痠倦飲食少思或

頭目不清痰氣上壅咳嗽喘甚胸膈痞悶或小便赤數兩足熱痛或脚足痿軟肢體作痛等症此壯水之主以制陽光之劑也

澤瀉

茯苓

牡丹皮

生地酒拌

山藥

茱萸肉

當歸

五味子炒

熟地自製并膏

右爲末人二膏加煉蜜丸桐子大硃砂爲衣每服五十丸空心淡鹽湯下

補中益氣湯方見二十四卷第六論

六味丸方見二十四卷第十二論

小柴胡湯方見二十四卷第十二論

八珍湯



逍遙散

歸脾湯

三方見二十四卷第四論

○寡婦寒熱如瘧方論第四

倉公傳與褚氏論皆云師尼寡婦獨陰無陽慾心萌而不遂是以慙慙成病以致乍寒乍熱而類瘧狀久則爲勞又有經閉白淫痰逆頭風胸氣痞悶面黧瘰瘡等證皆寡婦之病診其脈獨肝脈弦出寸口而上魚際皆血盛而致經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

○愚按前症若肝脈弦出魚際用生地黃丸血虛佐以四物湯若兼怒動肝火而寒熱佐以加味逍遙散若虧損元氣而寒熱佐以八珍湯若虧損元氣而寒熱佐以補中益氣湯若傷脾氣而寒熱佐以濟生歸脾湯

附治驗

○一寡婦不時寒熱脈上魚際此血盛之症用小柴胡湯加生地黃治之而愈但畏風寒此脾胃氣虛用加味歸脾補中益氣二湯兼服而止

○一婦人因太久出經商發寒熱月經旬日方止服降火涼血藥內熱益甚自汗盜汗月經頻數余日內熱自汗乃脾氣虛弱也月經頻數乃血不歸脾也用歸脾湯六味丸而愈

○一室女寒熱肝脈弦長而出寸口用小柴胡湯加生地烏梅治之而愈既嫁而諸症悉痊

○一室女久患寒熱月經失期以小柴胡湯加生地治之少愈更以生地黃丸而痊

○△生地黃丸

許學士云有一師尼惡風體倦乍寒乍熱面赤心

煩大小柴胡湯雜進其病益劇子診視之曰三部脈無寒邪但肝脈弦長而上魚際服此丸而愈

柴胡

秦艽

黃芩各半兩

生地黄

二兩酒洗

赤芍藥一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服三十丸烏梅湯下日三服

附方

補中益氣湯

四物湯二方見二十四卷第六

加味逍遙散

八珍湯

加味歸脾湯

歸脾湯四方見二十四卷第四論



小柴胡湯 方見二十四卷第二論

六味丸 方見二十四卷第十一論

○婦人惡寒方論第五

婦人惡寒有陰陽二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者脈浮數宜解表發於陰者脈沉細宜溫裏凡惡寒不可過覆衣被及近火熱若寒熱相搏令人寒甚若寒氣入腹血室結聚最難治療

○愚按前症若怠惰嗜臥洒淅惡寒乃陽不能伸發用升陽益胃湯若勞傷形氣而惡寒乃無陽以護衛用補中益氣湯若飲食傷脾胃而惡寒乃元氣虛損用六君子湯若加煩躁妄言或欲飲水仍進前劑但加薑桂若體倦煩渴頭痛自汗用補中益氣加五味麥門東垣云晝則發熱惡寒是陰氣上溢



於陽分也。夜則惡寒，是陰血自旺於陰分也。海藏云：六月大熱之氣，反得大寒之病，當捨時從症，治以薑桂之類。丹溪云：久病惡寒，乃痰鬱於脾，抑遏陽氣，不得外泄，治當解鬱。

附方

升陽益胃湯

方見三卷第九論

補中益氣湯

六君子湯

二方見二十四卷第六論

婦人血風煩悶方論第六

婦人血風煩悶，由勞傷氣虛而風邪乘之，血氣不和，以致肢節

熱、口乾不臥而煩悶也。當調補元氣為主。

○愚按前症多屬肝脾血虛發熱，當參照前寒熱方論主治。

赤芍藥散

治煩悶不食、體倦頭眩、身體疼痛等症。