

拓群

徐灵胎

傷寒約編
上

傷寒約編目錄

太陽病卷之一

太陽經脉證提綱一條

加減建中湯證一條

養陰黑膏湯證一條

痰熱發黃

麻黃連翹赤小豆湯證一條

大青龍無少陰證一條

夾血傷寒證一條

內傷夾傷寒證一條

葛根湯證一條

葛根加半夏湯方

茯苓甘草湯證一條

結胸與痞證一條

大陷胸丸方

臧結死證一條

甘草瀉心湯證一條

乾姜黃連黃芩人參湯證一條

太陽經傷寒一條

加減建中湯方

養陰黑膏湯方

麻黃連翹赤小豆湯方

小青龍湯證一條

夾痰傷寒證一條

陽氣夾傷寒證一條

即紅膏湯證

葛根湯方

五苓散證一條

茯苓甘草湯方

大陷胸湯證一條

小陷胸湯證一條

結胸死證一條

甘草瀉心湯方

麻黃湯證一條

變化黑膏湯證一條

變化黑膏湯方

大青龍湯證一條

小青龍湯方

夾食傷寒證一條

夾水傷寒證一條

溫中如膏湯方

葛根加半夏湯證一條

五苓散方

十棗湯證一條

大陷胸湯方

小陷胸湯方

生薑瀉心湯證一條

半夏瀉心湯方

乾姜黃連黃芩人參湯方

麻黃湯方

變化黑膏湯方

大青龍湯方

夾氣傷寒證一條

夾虫傷寒證一條

溫中如膏湯方

葛根加半夏湯證一條

五苓散煩渴證一條

十棗湯方

大陷胸丸證一條

臧結證一條

生薑瀉心湯方

半夏瀉心湯方

乾姜黃連黃芩人參湯方

大黃黃連瀉心湯證一條

大黃黃連瀉心湯方

附子瀉心湯證一條

附子瀉心湯方

赤石脂禹餘糧湯證一條

赤石脂禹餘糧湯方

旋覆代赭石湯證一條

旋覆代赭石湯方

抵當湯證一條

抵當湯方

畜血發黃證一條

抵當丸證一條

抵當丸方

桃仁承氣湯證

桃仁承氣湯方

畜血喜忘證一條

温病

葛根湯與發散黑膏湯證合一條

葛根湯方

發散黑膏湯方

疎熱黑膏湯證一條

疎熱黑膏湯方

三甲散證一條

三甲散方

温病夾陰

疎邪紅膏湯方

熱傳厥陰

羚羊角散方

温熱與疫有別

葛根加石膏湯方

達原飲方

三消飲方

疫熱迫血

瀉熱理陰陽方

痧疫

寶花散方

清涼至寶飲方

暑疫

青蒿石斛飲方

中風

桂枝湯證二條

形作傷寒脈不弦緊一條

四逆湯方

桂枝加附子湯證一條

桂枝去芍藥生姜新加人參湯方

桂枝人參湯證一條

桂枝加厚朴杏仁湯證一條

桂枝加大黃湯證合上條

茯苓桂枝甘草大棗湯證一條

桂枝去桂加茯苓白朮湯證一條

桂枝加桂湯方

蘇子清氣湯證一條

濕痺

太陽經傷濕證一條

桂枝附子湯方

濕溫

桂枝湯方

藏無他病一條

柴胡桂枝湯證一條

桂枝加附子湯方

桂枝人參湯方

桂枝加厚朴杏仁湯方

桂枝加大黃湯方

桂枝去姜桂加龍骨牡蠣湯證一條

蘇子清氣湯方

甘草附子湯方

桂枝附子去桂加白朮湯方

桂枝去芍藥生姜新加人參湯方

葛根黃連黃芩湯證一條

桂枝加芍藥湯證一條

桂枝甘草湯證一條

茯苓桂枝甘草大棗湯方

鼠粘子湯方

病嘗自汗出

柴胡桂枝湯方

桂枝去芍藥生姜新加人參湯證一條

芍藥甘草附子湯證一條

葛根黃連黃芩湯證一條

桂枝加芍藥湯證一條

桂枝甘草湯證一條

茯苓桂枝甘草大棗湯方

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

桂枝加桂湯證一條

桂枝去芍藥生姜新加人參湯方

葛根黃連黃芩湯證一條

桂枝加芍藥湯證一條

桂枝甘草湯證一條

茯苓桂枝甘草大棗湯方

桂枝未解一條

桂枝四逆相屬證一條

桂枝湯禁

芍藥甘草附子湯方

葛根黃連黃芩湯方

桂枝加芍藥湯方

桂枝甘草湯方

桂枝加桂湯證一條

桂枝去芍藥生姜新加人參湯方

桂枝加芍藥湯方

桂枝去芍藥生姜新加人參湯方

去桂加白朮湯證一條

甘草附子湯證一條

桂枝加芍藥湯方

桂枝去芍藥生姜新加人參湯方

桂枝加芍藥湯方

蒼朮白虎湯證一條

前胡疎肺飲方

中暑

消暑十全散發一條

中暑渴證一條

痙證

炙甘草湯方

見傷寒脈結代心動悸

陽明病卷之二

陽明病提綱一條

誤汗便難證一條

陽明病機一條

陰結陽結證一條

陽明衄血證二條

讖語死證一條

黑逍遙散方

固瘕證一條

梔子豉湯證一條

猪苓湯方

蒼朮白虎湯方

大力子湯方

中暑

消暑十全散方

清暑益氣湯方

痙證

胃實外證一條

蜜導方

太陽轉屬證一條

陽明桂枝證一條

讖語證一條

讖語鄭聲一條

舉輕占拜散方

穀疸證一條

白虎加人參湯證一條

梔子豉湯方

甘草豉湯方

發癩痧疹隱疹累水珠論一條

犀角地黄湯方

中暑

中暑脈證一條

痙證

桂枝加葛根湯方

即桂枝湯加葛根桂枝湯見中風

陽明病脈三條

猪膽汁導方

本經成實證一條

陽明麻黃證一條

讖語脈一條

熱入血室證三條

陽明中風證二條

枳實理中湯方

白虎加人參湯方

生薑豉三湯證合一條

猪苓湯方

補中益氣湯方

不可下證一條

陽明傷寒證一條

太陽轉屬證一條

小青龍合吳茱萸湯證一條

酸棗仁湯方

梔子豉湯方

陽明中寒證一條

除中證一條

猪苓湯證一條

梔子甘草豉湯方

猪苓湯方

猪苓湯方

猪苓湯方

猪苓湯方

猪苓湯方

猪苓湯方

猪苓湯方

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯方

瓜蒂散證一條

白虎湯證一條

寒濕發黃證一條

蒸蒸發熱證一條

大承氣湯證一條

譫語發潮熱證一條

汗出譫語證一條

腹滿不減證一條

目中不了了大便鞭證一條

腹脹不大便急下證一條

少陽病卷之三

少陽病提綱一條

太陽少陽併病一條

嘔而發熱證一條

陽明病脇下硬滿證一條

柴胡桂枝湯證一條

梔子乾姜湯證一條

梔子柏皮湯證一條

瓜蒂散方

白虎加人參湯證三條

承氣湯證一條

胃不知譫語證一條

大承氣湯方

潮熱獨語證一條

譫語潮熱反不能食證一條

二陽併病一條

口燥咽乾急下證一條

梔子乾姜湯方

梔子柏皮湯方

四逆湯證一條

三陽合病一條

調胃承氣湯方

小便數大便硬證一條

勿令大泄下證一條

大便硬則譫語證一條

繞臍痛煩躁證一條

發汗不解腹滿證一條

自利清水心下痛急下證一條

梔子厚朴湯證一條

梔子湯禁

吐後變證一條

茵陳蒿湯證一條

煩熱如瘧證一條

小承氣湯方

飲水噦證一條

下利譫語證一條

不大便腹滿痛證一條

發熱汗多急下證一條

少陽傷寒證一條

少陽誤下證一條

陽結陰結證合一條

嘔多不可攻證一條

柴胡桂枝湯方

少陽中風證一條

小柴胡湯證一條

小柴胡加減證一條

少陽轉屬陽明證一條

柴胡證反下一條

少陽欲罷脈一條

小柴胡湯方

陽明少陽合病一條

熱入血室如瘧證一條

柴胡桂枝乾姜湯證一條

柴胡證反下一條

柴胡證反下一條

柴胡桂枝乾姜湯方

柴胡加芒硝湯方

傷寒熱結寒熱證一條

小建中湯不瘥證一條

黃芩湯證黃芩加半夏生薑湯證合一條

少陽負脈一條

太陰病卷之四

太陰病提綱一條

太陰黃發證一條

桂枝加芍藥湯方

太陰經中風證一條

少陰病卷之五

少陰病脈證提綱一條

少陰亡陽證一條

少陰中風

少陰中風脈一條

少陰傷寒

少陰病可治不可治證三條

柴胡加龍骨牡蠣湯證一條

調胃承氣湯證一條

嘔而復利證一條

建中湯禁

黃芩湯并加半夏生薑湯方

柴胡加龍骨牡蠣湯方

大柴胡湯證一條

小建中湯證一條

黃連湯證一條

黃芩湯并加半夏生薑湯方

柴胡加芒硝湯證一條

大柴胡湯

小建中湯方

黃連湯方

理中湯證一條

太陰死證一條

桂枝加大黃湯方

寒實結胸證一條

自利證一條

桂枝加芍藥加大黃二湯證合一條

太陰經桂枝證一條

三物白散方即三物小陷胸湯

四逆湯證一條

寒實結胸治二條

少陰自利證一條

八味腎氣湯方

少陰病脈一條

少陰病脈陰陽俱緊二條

少陰不可汗不可下證一條

少陰病陽回證一條

少陰病死證三條

少陰病欲解一條

麻黃附子細辛湯證一條

麻黃附子細辛湯方

火劫證一條

真武湯證二條

四逆湯證十條

通脈四逆湯證二條

少陰病冷結膀胱一條

茯苓四逆湯方

吳茱萸湯方

白通加豬胆汁湯方

豬苓湯方

甘草湯桔梗湯二證合一條并方

苦酒湯證一條

厥陰病卷之六

厥陰病提綱一條

肝乘肺證一條

烏梅丸方

當歸四逆加吳茱萸生姜湯方

厥陰脈二條

麻黃附子甘草湯證一條

下厥上竭證一條

真武湯方

四逆湯方

通脈四逆湯方

少陰傷寒脈足一條

乾姜附子湯證二條

白通湯白通加豬胆汁湯證三條

黃連阿膠湯證一條

豬苓湯禁

苦酒湯方

肝乘脾證一條

厥陰消渴證一條

當歸四逆湯證一條

厥陰病圖膿血證二條

厥陰病無陽證一條

麻黃附子甘草湯方

附子湯證二條

桃花湯證一條

四逆加人參湯證一條

少陰病厥證二條

少陰傷寒煩躁證一條

乾姜附子湯方

黃連阿膠湯方

豬膚湯證一條

半夏散及湯證一條

四逆散證一條

左金丸方

厥陰中風證一條

當歸四逆湯方

白頭翁湯證二條

厥陰病無陽證一條

少陰傳經便血證一條

附子湯方

桃花湯方

四逆加人參湯方

少陰亡血證一條

茯苓四逆湯證一條

吳茱萸湯證三條

白通湯方

豬苓湯證二條

豬膚湯方

半夏散及湯方

四逆散方

枳朮丸方

烏梅丸證一條

當歸四逆加吳茱萸生姜湯證一條

白頭翁湯方

厥陰病無陽證一條

熱厥利證

厥熱相應往來證四條

參附湯證一條

參附湯方

發癰證一條

厥利難治證一條

見厥復利證一條

炙甘草湯證一條

炙甘草湯方

傷寒欬逆上氣脈散死證一條

陰陽易證

燒裨散證一條

燒裨散方

諸寒熱證

六味丸證一條

八味丸證一條

六味丸方

八味丸
方即八味腎氣湯
方見少陰

吳江徐大椿著

太陽證提綱

太陽之為病。脉浮。頭項強痛而惡寒。

太陽主表。其脉浮而有方。與陽明兼長大。少陽兼弦細。三陰之微浮者不同。頭項主一身之表。太陽經脉榮於頭。會於項。故太陽病。則頭連項而強痛。與陽明頭額痛。少陽頭角痛者。迥別。惡寒為寒在表。六經雖各惡寒。而太陽應寒水之經。故惡寒特甚。與陽明二日自止。少陽往來寒熱。三陰內惡寒者。懸殊矣。脉浮。頭項強痛。惡寒八字。為太陽一經受病之綱領。無論風寒溫熱疫癘雜病。皆當做此以分經定證也。

傷寒

太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。體痛。嘔逆。脈陰陽俱緊者。名曰傷寒。

已發熱是寒傷於表。即發熱以拒之。未發熱是寒邪凝斂。熱不遽發。即發熱之遲早。可知其人陽氣之盛衰。寒邪之重輕。雖有已發熱未發熱之不同。而惡寒體痛嘔逆之證。陰陽俱緊之脉。先見便可斷其為傷寒。而非他病也。傷寒必惡寒。寒邪外束。一身之陽氣不舒。則體痛。寒邪內侵。胃中之陽氣不化。則嘔逆。寒令脉緊。陰陽指浮沉。不專指尺寸。此太陽經傷寒之脈證。

麻黃湯證

太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。

太陽主一身之表。其經直抵腰中。故傷寒則身疼腰痛。主筋所生病。筋皆會於手足肢節。故受寒則骨



節疼痛具經會於頭為諸陽主邪寒邪外束陽氣不伸而皮毛閉遏故頭痛發熱惡風無汗而喘也太陽為開立麻黃湯以開之則汗出而邪自解發熱疼痛自除矣前條惡寒嘔逆此條惡風無汗前陰陽俱繁此並不言脈是互文見意處二條俱麻黃湯論要知麻黃湯治中風重劑寒傷於表者可通用之非專治傷寒之主劑也蓋風寒本同一氣風中無寒即是和風何足病人必風開腠理則寒得入於經絡乃病傷寒耳故不必於風寒而鑿分但審脈之虛實施治庶無差誤矣

麻黃湯

治發熱惡寒頭痛項強身疼腰痛骨節疼痛無汗而喘脈緊有力者

麻黃

一兩 桂枝 一錢 杏仁 二錢 甘草 五分

水煎去渣溫服

嘔者加半夏生姜一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡氣煩躁不得眠也汗多者溫

粉撲之

寒邪傷表陽氣不伸故寒熱身疼無汗嘔逆而喘非此開表逐邪之峻劑不足以當之也麻黃入肺能去骨節之風寒從毛竅出為衝分發散風寒之品桂枝入心能化心液通經絡而出汗為營分解散寒邪之品杏仁為心果溫能散寒若能降氣為肺家逐邪定喘之品甘草甘平外拒表邪內和血氣為中宮安內攘外之品此湯入胃行氣於元府輸精皮毛毛脈合精而溱溱汗出表邪盡去不留則痛止喘平寒熱頓解不必藉汗於穀也不用養素者以生養之橫散麻黃之上升大棗之甘滯礙杏仁之速降若脈浮絛汗自出或尺中微遲者是建中所主非麻黃所宜麻黃湯為發汗重劑專治表實裡氣不虛者投之恰當一戰成功可一不可再嘔逆加半夏生姜即非麻黃湯法矣兼治冷風哮喘

加減建中湯證

脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗以營氣不足血少故也

脉繁身疼是據脉驗證法邪從汗解則陽氣得伸而身自不疼矣假令尺中脉遲以尺傷陰資血少則營氣不足雖發其汗不特無汗而身疼不除則營氣反虛而亡血亡津液之變頓起陽盛者不妨發汗變證惟衄衄乃邪解陰虛者不可發汗亡陽之變恐難挽回建中法加減始為合劑耳

加減建中湯 治發熱惡寒無汗身疼脉浮弱者
製首烏酒炒 川桂枝 六分 芍藥酒炒 淡豆豉 錢半 當歸身 三錢 炙甘草 錢半 白雲神煨 梓新會皮 錢半 鮮生姜 三片 肥大棗 三枚

水煎去渣溫服 此養營解邪之劑血少則營氣不足絡脈空虛寒邪得以留戀經中故用首烏滋血歸芍養營淡豉解表姜桂祛寒茯神霍梗安神啟胃炙草大棗緩中益虛緩方和劑合之陳皮共勳養正祛邪之力

變化黑骨湯證

傷寒脉浮緊者麻黃湯主之不發汗因致衄

脉繁無汗用麻黃湯發汗則邪從汗解而陽氣得泄陰血不傷奪汗則無血也若不發汗而陽氣內擾陽絡受傷則血外溢而衄血奪血則無汗也再用平溫汗劑何異抱薪救火合變化黑骨湯主之

變化黑骨湯 治發熱無汗口燥鼻衄或汗後發熱不解脉浮數不振者
原生地 五錢 荆芥穗 錢半 建連翹 三錢 白茯神煨 梓川貝母去心 生查肉 三錢 淨蟬衣 錢半 紫丹參 錢半 生甘草 五分 西湖柳三錢炒

水煎去渣溫服 此疎熱存陰之劑不發汗則陽邪受隔陽絡受傷而衄血故以荆芥連翹疎熱外泄生地川貝解熱存陰茯神丹參以安神和血查蟬柳草以調中攘外也

醒家不可發汗。汗出必額上脈緊急。目真視不能。胸不得眠。

太陽脈起。目內眦上額。已脫血而復汗之。則津液枯竭。故脈緊急而目真視也。亦必腎俱絕矣。目不轉。故不能。胸目不合。故不得眠。勉用黑膏。冀挽萬一。

香陰黑膏湯 治心腎液竭邪迫垂危脈滿急疾欲脫者

懷生地 六錢 淡豆豉 水炒 生洋參 三錢 肥麥冬 三錢 真阿膠 三錢 生白芍 錢半 白玉竹 三錢 川貝母

二錢 淮山藥 三錢 忍冬藤 三錢 乾荷葉 三錢

水煎去渣溫服。已脫血而復汗之。則津血大傷。經脈失養。遂成危迫之候。生地滋先天之水。麥冬潤後天之津。阿膠益血。芍藥飲陰。山藥洋參。填中土以生金生水。玉貝忍冬。清心氣以通脈。通經。淡苳荷葉。提陽升陽。如起涸轍之魚。以冀寒合逢春。洵為生津潤燥。起死回生之劑。

熱發黃證

兩發於陽而反下之。熱入因作結胸。若不結胸。但頭汗出。餘處無汗。至頸而還。小便不利。身必發黃也。寒氣侵人。人即發熱以拒之。是為發陽。助陽散寒。一汗而寒熱盡解矣。若不發汗而反下之。熱反內陷。寒邪與水氣隨熱而入於胸。必結熱氣。陷炎上不能外越。故頭有汗而身無汗也。小便利即濕熱在內。亦解不利則濕熱內蒸於腋。而黃色外見於皮膚。

麻黃連翹赤小豆證

傷寒發熱在裏。身必發黃。麻黃連翹赤小豆湯主之。

熱反在裡。不得外越。謂之疼熱。非發汗以逐之。則濕氣終不散。然仍用溫散。是抱薪救火也。故於麻黃湯去桂枝之辛溫。加連翹梓皮赤小豆之苦寒降泄。可解表清火而利水。一劑而三善備矣。且以見太

陽熱之治與陽明迥別也

麻黃連翹赤小豆湯 治表邪內陷不解發熱發黃脉濇浮數者

麻黃 八分 連翹 錢半 小豆 三錢 梓皮 錢半 杏仁 二錢 甘草 五分 姜皮 八分 大棗 三枚

潦水煎去渣溫服 皮膚之濕熱不散仍當發汗而在裡之熱不清非桂枝所宜故於麻黃湯去桂

枝而加赤小豆之酸以收心氣甘以瀉心火專走血分而通經絡行津液而利膀胱梓白皮寒能清肺

熱苦以瀉肺氣專走氣方而清皮膚理胸中而解煩熱連翹杏仁瀉火降氣麻黃姜皮開表逐邪甘草

大棗和胃緩中潦水煎之降火除濕也其表有不解黃有不退者乎

大青龍湯證

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青湯主之

寒風之厲熱鬱於中故煩躁而腹兼惡寒蓋風有陰陽汗出脉緩是中於鼓動之陽風不汗出而脉緊

乃中於凜冽之陰風也風令脉浮浮緊而沈不緊與傷寒脉陰陽俱緊有別發熱惡寒同桂枝證身疼

痛不汗出同麻黃證惟煩躁是本證所獨風感於表非發汗不解熱鬱於裡非大寒不除故於麻黃湯

倍麻黃以大發其汗加石膏以并除其煩躁中風本惡風比惡寒甚故不見其更惡風耳

大青龍湯 治寒風在表火鬱於中發熱身疼無汗煩躁舌白中焙脉浮緊數有力若脉浮弱汗出惡風

者不可服服之則筋惕肉瞤此為逆也

麻黃 錢半 桂枝 錢半 杏仁 二錢 甘草 錢半 石膏 五錢 生姜 三片 大棗 五枚

水煎去渣溫服 煩躁是熱傷其氣無津不能作汗故發熱惡寒身疼不解特加石膏之泄熱生津以

除煩躁然其性沈而大寒恐內熱頓除表寒不解變為寒中而脇熱下和故也必倍麻黃以發表又倍

甘草以和中。更用姜棗調和營衛。一汗而表裏雙解。風熱兩除。何患諸證不平乎。此大青龍清內攘外之功。所以佐麻黃二方之不及也。青龍以發汗命名。少陰亦有發熱惡寒無汗煩躁之證。但脈不浮頭不痛為異。

傷寒脈浮緩發熱惡寒無汗煩躁身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之。

陽氣太重微寒外束亦令無汗煩躁發熱惡寒也。傷寒脈浮緊身必疼浮緩身不疼。前條中陰列之風此條受輕微之寒蓋陽運則身輕陽鬱則身重乍有輕時乃鬱陽得伸也。無少陰證者則少陰虛陽不歸亦有發熱惡寒無汗煩躁之證。法當溫補以回陽。若反用麻黃之散石羔之寒則真陽立亡矣。此條陽氣重傷寒微故以大青龍湯小其制而雙解之。

大青龍湯見前

小青龍湯證

傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之。發熱是表不解乾嘔而欬是心下水氣不散水性流動其變多端水氣下而不上則或渴或利上而不下則或噎或喘留而不利行則小便不利少腹因滿也。小青龍兩解表裏之邪復立加減法以治或然之證。此為太陽機樞之劑。

小青龍湯 治發熱心下水氣乾嘔而欬脈緊弦細者

桂枝一錢芍藥錢半酒炒甘草五分半夏錢半麻黃一錢細辛三分乾姜五分五味五分

水煎去渣溫服 渴者去半夏加栝實 微利去麻黃加芫花熬令赤色 噎者去麻黃加茯苓喘者去麻黃加杏仁去皮尖

風寒夾水氣浸漬胸中。內侵肺胃。則發熱乾嘔而欬。是小青龍主證。故於桂枝湯去大棗之甘泥。加麻黃以開元府。半夏除嘔。細辛逐水氣。五味乾姜以除欬也。既用麻辛發表。不須生姜之橫散。渴是心液不足。故去半夏之燥。易括萹之潤。利與噎。小便不利與喘。則病機偏於向裏。故去麻黃之發表。加附子以除噎。羌花茯苓以利水。杏仁以定喘耳。大小青龍俱是兩解表裡之劑。當知太青龍治裡熱。小青龍治裡寒。且小青龍治水之動而不居。亦與五苓散治水之留而不行者不同。兼治膚脹最捷。又主水寒射肺冷哮證。

夾氣傷寒證

發熱惡寒。胸滿脇痛。手按不堅不硬。左關脈實大。傷寒藥中。加箭金。弦實。加青皮。弦滯。加香附。弦澇。加青木香。弦浮。加烏藥。右三部脈實大。加檳榔。右關獨實。加枳實。弦實。加厚朴。弦滯。加枳殼。弦澇。加白豆蔻。緊澇。加草豆蔻。滯澇。加廣木香。弦澇微澇。加新會皮。氣陷。加升柴。氣虛。加參芪。氣熱。加苓連。氣寒。加姜附。

夾血傷寒證

脇間拒按。脇下或剗下。必有一處堅硬。實滿。痛有定跡。非若氣病之流走也。左關脈實大。加歸尾。桃仁。弦實。加全歸。赤芍。弦滯。加全歸。延胡。弦澇。加全歸。羌蔚子。弦浮。加當歸。紅花。弦澇。加當歸。丹參。若脈大血堅。非蒲黃五靈脂。不能奏効。

夾痰傷寒證

胸滿惡心。或心嘈眩暈。嘔出痰涎。或痰鳴氣喘。欬吐肢麻。右關脈滑數有力。加括萹實。弦細有力。加法半夏。右寸浮滑。加蘇子。滑數。加川貝。弦滑。加白芥子。滑大。加杏仁。泥。右關滑實。非萊菔子。不能破結開。

痰
夾食傷寒證

胸滿惡心。心下堅實拒按。噯腐吞酸。惡食疼痛。右關滑實。加建朮山查。弦實。加生山查。炒麥芽。實。加菜服子。弦滯。加白木炭。弦細。加柚汁。煮炒白木皮。

夾水傷寒證

胸中飽悶。漉漉有聲。惡心泛泛。嘔出清涎綠水。右關脉弦。加半夏。白通草。右關脉細。加細辛。茯苓。右三

夾虫傷寒證

臍腹絞痛。吐瀉出蚊。心嘈思食。嘔出青涎。甚則面生白點。是為虫花。亦必腹中起扛為確據。脉實如檣。榔。鶴蟲。無美雷丸。脉虛。史君子作湯。煎本病藥。

內傷夾傷寒證

倦怠懶言。無氣以動。右脉偏細。偏軟。或濶大無力。加參耆。尤宜於表散藥中。間有氣傷不能化血。而血積於中者。切勿破之。但須調營托裏。血絡化而邪自解。

陽虛夾傷寒證

足冷陽縮。舌白戴陽。脉細緊滯。宜紅膏湯。加調營解邪藥。凡係傷寒。無不發熱。惡寒。至於夾證。或托或化。必期中病為節。切勿過行。尅伐。有傷清陽之氣。反致外邪內陷。救藥莫及矣。

溫中紅膏湯 治陽虛傷寒。足冷陽縮。身熱面戴。陽脉細緊滯者。

製附子八分 鹽一分 淡豆豉八分 水煎 炮姜一分 茯苓八分 桂枝八分 當歸身三錢 白茯苓二錢 炙甘草錢半