

傷寒正醫四錄

傷寒正醫錄

卷十 目次

春溫二十一條 方俱在正傷寒

夏熱八條

白虎湯加味

通解散 葱白香豉湯

竹葉石膏湯

黃連解毒湯 加減

發斑十二條

升麻葛根湯

三因加味羌活湯

加味小柴胡湯

消毒犀角飲

大青四物湯

當歸丸

葛根橘皮湯

漏蘆連喬湯

黃連一物湯

五物木香湯

孫兆山梔散

加減三黃石膏湯

通脉四逆湯

附子理中湯

陰毒甘草湯

調中湯
大建中湯

人參三白湯

黃連解毒湯

竹葉石羔湯

白虎湯加味

補中益氣湯

疫二十五條

達原飲加味

承氣湯

白虎湯加味

柴胡清燥湯

茵陳蒿湯

瓜蒂散

舉斑湯加味

桃仁承氣湯

犀角地黄湯

清燥養榮湯

柴胡養榮湯

瓜貝養榮湯

栝郎順氣湯

人參敗毒散

補中益氣湯

二黃湯

荊芥敗毒敗

生犀散

人中黃丸

清熱解毒湯

人中黃散 雙解散

普濟消毒飲

蒼朮白虎湯

火劫十條

桂枝加桂湯

蜀漆龍骨牡蠣救急湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

狐惑四條

治蠱桃仁湯

黃連犀角湯

雄黃丸

雄黃銳散

終

傷寒正醫錄卷十

春溫

內經曰冬傷於寒春必病溫。又曰冬不藏精春必病溫。仲景別無溫病篇。朱奉議活人書與劉守真輩俱以傷寒並論。後人群起非笑。謂傷寒專在霜降以後。春分以前。遂有宜於冬不宜於春夏。宜於北不宜於南諸說。幾視桂枝麻黃如鴆毒。陶節庵雖妄自變方。猶能師仲景之意。如陽虛不能發汗。用參芪桂附之再造散。何習之者。

不辨陰陽虛寔。但以模稜作活計乎。愚親試盛暑冒寒。一服桂枝立愈。每致疑於溫病篇遺失之言。及讀尚論序云。治溫法度俱錯。出於治傷寒中。蓋天氣有涼燥。人身之六經則同。謂春夏融和。無嚴肅之氣。感寒者少。則可。若六經治法具載正傷寒中。嘉言以冬傷於寒。冬不藏精二者分條。卽摘傷寒論以証之。內經雖云必先歲氣。母伐天和。又云有故無殞。則春溫以正傷寒爲依據。甚爲有見。因之。

冬傷於寒

太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病。

脈浮頭痛項脊強者爲太陽病。然冬傷於寒感春月之溫氣而發則厥陰風木主事與太陽之寒水不涉。故雖從太陽而不惡寒也。或新中微寒且表氣素虛者亦有衛虛惡風營虛惡寒。然必微而不甚。此所以爲春溫證也。

形似傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴。被火者必譫語。弱者發熱脈浮者解之當汗出愈。

風性緩弱不弦緊而弱者非傷寒也。弱者發熱卽內經

諸弱發熱也。脉浮而解之乃解肌。不可發汗。

脉浮熱甚。反灸之。此爲寔。實以虛治。因火而動。必咽燥吐血。

浮熱甚。邪氣實也。傷寒已不可灸。况溫病乎。

病如桂枝證。頭不痛。項不强。寸脉微浮。胸中痞硬。氣上衝咽喉。不得息者。胸有寒痰也。當吐之。宜瓜蒂散。又云病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐蚘。

瓜蒂散取吐頑痰而逐水。則膈快矣。有痰而悞發汗。亡津而胃虛。必蚘上逆。

病人手足厥冷。脉乍緊者。邪結在胸中。心下滿而煩。飢不能食者。病在胸中。當須吐之。宜瓜蒂散。

此非厥陰之厥冷。乃邪結在胸。類傷寒之痰證也。

病人身大熱。反欲得近衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。身大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。

前是表實裡虛。後是表虛裡實。

病在陽。應以汗解之。反以冷水噀之。若灌之。其熱被却不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。服文蛤散。若不差者。與五苓散。寒實結胸無熱証者。與三物小陷胸

傷寒正醫金
湯自散亦可。

病人藏無他病。時發熱自汗出而不愈者。此衛氣不和也。先其時發汗則愈。宜桂枝湯主之。又云病自汗出者。此爲營氣和。營氣和者。外不諧。以衛氣不共衛氣和諧故耳。以營行脉中。衛行脉外。復發其汗。營衛和則愈。

春溫症。由肌肉而達於皮膚。則自陽明胃經。傳入太陽膀胱。故只用解肌。不可發汗。

病人脉數。數爲熱。當消穀引食而反吐者。此以發汗。令陽氣微。陽氣虛。脉乃數也。數爲客熱。不能消穀。以胃中虛冷。

故吐也。

因發汗而陽微。則胃虛不能食。非不藏精之真陽微。不過客熱而脈數也。溫其胃卽愈。

病人耳聾無聞者。以重發汗。虛故也。

此與傷寒少陽邪盛者迥異。見溫症禁過汗也。

病人不大便五六日。繞臍痛。煩躁。發作有時者。此有燥屎。故使大便硬也。病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能臥者。有燥屎也。宜大承氣湯。大下後五六日不大便。煩不解。腹滿痛者。有燥屎也。宜大承氣湯。

熱邪據陽明胃中。津液必傷。故雖宜汗而只用桂枝。但解肌而不大發汗也。宜下而必用大承氣。取亟下而驅邪也。總是愛惜津液之故。雖治傷寒且然。況溫病乎。凡病若發汗。若吐。若下。若亡津液。陰陽和者必自愈。

既無內傷。又非冬不藏精。則元氣勝者易愈。傷寒與溫病同也。

解肌諸方

桂枝湯

桂枝加葛根湯

升麻葛根湯

葛根柴胡

湯

葛根蔥白湯

葛根黃芩黃連湯

附方

人參敗毒

散 參蘇飲 海藏大羌活湯

解肌後痛不去反惡寒者虛也。芍藥甘草附子湯。

脈細身倦者方

服可

解肌後身疼痛脈沉者桂枝加芍藥人參新加湯。

解肌汗出過多心下悸欲得按者桂枝甘草湯。

解肌後煩渴脈洪大白虎加人參湯。

解肌後腹脹滿厚朴生姜甘草人參湯。

解肌後不惡寒但惡熱者調胃承氣湯。

解肌後惡熱無下證知母石膏湯。

解肌後脉微數小便不利微熱煩渴五苓散

吐法 瓜蒂散 梔子豉湯

清熱 白虎湯加參 白虎加蒼朮湯 玄參升麻湯

升麻梔子湯 竹葉湯加石膏

和解 小柴胡湯加桂 小柴胡去半夏加人參栝蒌湯

小柴胡加硝湯

疎風 荊芥散 獨活湯 風引湯 續命湯減麻黃附子

分利 五苓散發渴小便赤者用 猪苓湯汗多者不可用 天水散晨砂

散 天水 牡礪澤瀉散治腰以下有水氣

開結 三物小陷胸湯 三物白散

下法 大承氣湯 調胃承氣湯 大柴胡湯 心下痞者當下若煩

躁嘔不止者宜兩解

下後脉促胸滿。桂枝去芍藥湯。若微惡寒。去芍藥加附子湯。悞以丸藥下之。身熱不去。微煩。梔子乾姜湯。三法俱溫以散表。

下後利不止。脉促表未解。喘汗者。葛根黃連湯。涼以解表。

下後身熱不去。心中結痛。梔子豉湯。

下後心煩腹滿。卧起不安者。梔子厚朴湯。吐以散邪。

下後心中懊憹而煩有燥屎者大承氣湯取仍從下解

下後寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利吐膿

血泄利不止爲難治麻黃升麻湯取其解錯雜之邪

下後傷血脉濇葶蘆苦酒湯取其壯陰

大汗使陽氣微又大下使陰氣弱其人亡血病惡寒後乃發熱無休止時陰陽既虛炁血俱弱故其熱不可止息

葶蘆梔子湯鹹苦湧泄以助陰

解毒諸方 黃連解毒湯 黃連湯 黃連阿膠湯 黃

連瀉心湯 黃連龍骨湯 黃連犀角湯 黃連橘皮