

師竹醉民碧企備觀

英國海得蘭儒門醫學卷終

儒門醫學目錄

卷上

論養身之理

光

熱

空氣

地氣附

水

飲食

運動

卷中

論治病之法

中風

痿

腦炎

腦傷風

腦氣筋痛

煩惋善怒

羊頭瘋

酒狂

心病

心悸

肝炎

膽淋

黃疸

肺炎癰即肺

肺胞膜炎

肺癆病

欬血

氣喘

傷風咳嗽

時行傷風

內腎病

內腎炎

膀胱炎

多溺

淋

白濁

胃不消化

胃中有酸

胃中發氣

嘔吐

腸炎

便祕

疝

蟲

痛風

風溼

風溼腰痛

臀下腦氣筋痛

瘰癧

頸核腫脹

炎症

血溢

脈管跳血囊

迴血管炎

水腫

瘡

似瘡

寒熱

熱症

腹痛抽筋

霍亂吐瀉

泄瀉

赤白痢

六核腫脹

頭痛

眼炎

鼻衄

口瘡

牙痛

喉痛

喉炎

喉左右核炎

氣管炎

會厭炎

失音

爛喉痧

經閉

血虛

白帶

臟燥

妄言笑

乳炎

乳癰

子宮炎

腦中有水

驚癇

呃逆

哮

行遲

痘瘡

水痘

癰

皮膚生炎

皮病

疹子

疔毒

瘻子

痔瘡

裂坼凍瘡

禿瘡

跌打損傷

牙關緊閉

身虛泄血

暈船

急救証治

附

狂犬瘋

毒蟲傷

流血

骨折斷

脫骱

湯火傷

受傷

諸物體

溺水

自縊

中毒

失魂

受大驚

卷下

論方藥之性

酸類藥

醋酸

果酸

檸檬酸

檸檬汁

硫強水

硝強水

鹽強水

草酸

輕衰

鹼類藥

鉀養

鉀養炭養

鈉養炭養

肥皂

鎂養

鎂養炭養

鎂養二炭養

石灰

白石粉

淡輕水

改血藥

汞

汞綠

汞綠

碘

鉀碘

鈉綠

硫黃

沙沙把列

蒲公英

魚肝油

收斂藥

白礬

鉛散

鋅養

鋅養硫養

樹皮酸

幾奴

拉搭尼根

兒茶

洋蘇木

拖門替拉

玫瑰花瓣

烙灸藥

銀養淡養

發汗藥

淡輕養醋酸

淡養_五以脫

綠以脫

鉀養_五綠養_五

圭厄嚙

吐藥

打打伊密的

瀉藥

啞囉

草麻油

噶囉嘶

巴豆油

衣拉特噃

藤黃

蜜

渣臘

大黃

辛擎葉

司卡暮尼

路式里鹽

番元明粉

利小便藥

布羅末樹頭

布故草

噶枝噤

噶拜把

松香油

鉀養淡養五

斑蝥

化痰藥

叱哩咯

辛衣格

士哇盧

到魯樹汁

安神藥

鴉片

嘆啡啞

罌粟殼

羊躑躅

啤啦咁喲

補火藥

醋

葡萄酒

以脫

樟腦

阿魏

辣椒

薑

桂皮

薄荷

芥子

甘松

而烏草

沒藥

補藥

鐵

鐵養檉
檉酸淡
輕檉
檉酸
鐵養炭
養

鐵碘

鐵綠

青礬

金雞哪樹皮

雞哪霜

高林布根

苦白木

黃連

橙皮

畢澄茄

揩暮米辣

奇勒大

荆芥

單西草葉

各里司里尼

雜藥類

毛地黃

草烏頭

鉢

噶囉咗

菸草

黑暮拉克草

甘草

巴離拉木

鉢養三淡養_五

硼砂

錫

鈣養綠

炭

阿拉伯樹膠

胡麻子

亞懸架

蜜佗僧膏

附卷

慎疾要言

病症大略

簡易良方

路式里鹽 詳見瀉藥類

斑蝥有
毒 斑蝥所作之各藥能感動身體知服之則有大
毒故此藥惟外科常用之用法依其藥之濃淡分兩種性
情如用之甚少祇令皮膚發紅而癢作斑蝥洗藥用斑蝥
一分浸於橄欖油四分內或可將斑蝥酒與樟腦洗藥和
勻之作斑蝥酒法用斑蝥半兩浸於準酒二升內以上之
法爲用其藥之淡者如用濃者能令皮膚發泡卽如藥肆
出售之斑蝥硬膏可作弔炎之用或可將斑蝥醋用駱駝
毛筆點之作斑蝥醋法用斑蝥二兩磨勻浸於酸醋一升
內久之卽成嬰兒不可用弔炎藥用斑蝥硬膏法將硬膏

貼在欲發泡處待十二小時輕手揭去如泡未破可用翦刀翦破以放其水再加冷膏作冷膏法用白蠟一兩杏仁粉半錢玫瑰花油五滴先將蠟與杏仁油和勻稍加熱融化之再將硼砂用玫瑰花水消化之稍加熱將二物調和添入玫瑰花油待冷成膏外鋪麻絨則易愈外科醫士有加發炎之藥令其多放水者不使速愈以射利也

用弔炎藥之意令皮膚內各質之病能愈卽如心肺有病
竇上加弔炎藥腦髓有病耳後貼弔炎藥用於他處者意
亦相同其理難明祇以爲皮膚上生一種輕病則皮膚內
之重病可減且腦氣筋之性情以外病爲重注意於皮外
之病而皮內之病可減但此說尙無確據要之人身內有