

本草从新

吳氏醫學述第三種本草從新目錄

卷三上

木部 香木類

柏子仁

側柏葉

松脂

松節

松花

杉材

赤肉桂

交桂

桂

洋桂

桂心

桂枝

木犀花

桂葉

辛夷

沉香

沉

桂

黃蠟

沉

煎香

換丁香

母丁

白檀香

紫檀

角

沉香

桂

難骨香

黃熟香

丁香

香

白檀香

紫檀

角

楓

降真香

烏藥

乳香

沒藥

血竭

阿魏

龍腦香

樟腦

阿魏

麝香

蘇合香

乳香

沒藥

血竭

阿魏

胡桐淚

木淚

木脂

安息香

蘇合香

乳香

沒藥

血竭

阿魏

胡桐淚

木淚



吳氏醫學述第三種

以人周蘭先生庭

武原吳儀洛遵程輯

有榆菴培同較

有杜雋望

本草從新

木部 香木類

補心脾  
滋肝腎

柏子仁

辛甘而平氣香能透心脾

凡補脾藥多燥唯此香能

舒脾而偏潤助脾  
藥中兼用最妙

性潤能滋肝腎

好古曰明經氣分藥益

智寧神聰耳明目

香通竅

養血止汗

心生血汗爲心液

除

風溫愈驚癪澤皮膚辟鬼魅 多油而滑作瀉

者禁與多痰亦忌 蒸晒炒研去油油透者勿

入禁畏菊花

涼血清  
吐分溫  
熱

側柏葉 味苦微寒性濇而燥

西向得金之氣

最清血

分濕熱止吐衄崩淋腸風尿血血痢一切血證

去風溫諸痺歷節風痛

肢節大痛晝靜夜劇名曰虎歷節風亦風寒溫

所致塗湯火傷

搘爛水調塗

生肌殺蟲多卷凍瘡汁烏

鬚髮 丹溪以爲補陰要藥然終屬苦寒燥清

之品唯血分有濕熱者以此清之爲宜若真陰

虛者非所宜也 柏有數種唯根上發枝數莖

蒙茸茂密 千頭柏又名佛手柏者爲真或炒

或生用桂牡蠣爲使惡菊花宣酒

燥溫祛風

松脂

一名松香  
一名瀝青

苦甘溫燥祛風去濕化毒生肌

止痛敷膏而貼崩中惡癰牙疼研末而嘗

齶齒有孔

松脂維塞虫  
卽從齒出

感太陽之氣而生燥可去溫甘

能除熱故外科取用極多性溫而燥血虛者勿服 水煮百沸白滑方可用

松節 苦溫而燥治骨節間之風濕丹溪曰能燥血中之

燥溫祛風

溫

燥性過於松脂血虛尤忌  
忤碎酒浸良

祛風生  
毛髮

松毛 苦溫可生毛髮宣敷凍瘡及風濕諸瘡

忌同松脂 切細用

潤益氣  
祛風

松花 甘溫潤心肺益氣止血除風亦可釀酒  
須及時取用不堪久停令人善繆諸痘瘡傷損  
和白沙糖即爲糕餅可佳 并濕爛不癥 多食發上焦熱病

宣散腫  
脹

杉木卽杉

辛溫開發除心腹脹滿腳氣腫痛

柳子

厚纂救死方云得腳氣半夜痞絕腸塊如石脅因大腹抵擣七枚連子搘碎童便三升煮分二服

水材木

辛溫開發除心腹脹滿腳氣腫痛

柳子

若一服得快利卽停後服散風毒去惡氣沈壽齋著

稍

作棺尤貴性直燒灰最發火藥  
挾虛者勿用 有赤白二種赤油斑如野雞者

大瘧補

命門火

平肝通

血脈引

火歸元

肉桂

辛甘大熱有小毒氣厚純陽入肝腎血分

補命門相火之不足

兩腎中間先天祖氣乃真火也人非此人不能有生

無此真陽之火則無以蒸糟粕而化精微脾胃衰敗氣盡而亡矣

●益陽消陰治

痼冷沉寒疏通血脉宣導百藥

熱則能發汙去

營衛風寒

辛則善散

下焦腹痛奔豚疝瘕木得桂而

枯削桂針木根

木卽死

又能抑肝風而扶脾土

肝木盛面克土

辛散肝風 療脇痛驚癲寒熱久瘧

用淨肉桂錢餘將發時口

甘益脾土

中醫爲木剋不能防水

中醫爲土爲水方中多用之

之

如五苓

虛寒惡食濕勝泄瀉舌行水方中多用之

之類

周無糧之火降而歸元從治欬逆結氣

目赤腫痛格陽喉痺等證

以熱攻熱名曰從治通經催生

嘔膈

辛熟能動血故也

出交趾者最集今甚難得尋

州者庶幾必肉厚氣香色紫有油味辛甘嘗之舌上極清楚者方可用若嘗之舌上不清及切

開有白點者是洋桂大害人

去粗皮

其毒在皮不

見火

須臨用切碎羣藥煎好

得人參甘草參

良忌生蒜石脂

大燥補  
陽活血

桂心

入心脾血分能引血化汙化膿內托癰疽

痘瘡

同丁香治痘瘡灰塌

消瘀生肌補虛寒宣氣血利閉

節治風癥癩瘕噎膈腹滿心腹諸痛

輕解肌  
調營衛

桂枝

辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱

經溫經通脈發汗解肌

能利肺氣經曰能散爲陽

治傷風

頭痛

無汗能發

傷寒自汗

有汗能止

桂枝爲君芍藥甘草爲佐加姜棗名桂枝湯能和

營實表調和營衛使邪從汗出而汗自止

王好古曰

或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗處比皆用桂枝湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝

甘草湯此又能閉汗也二義相通否乎曰仲景  
云太陽病發熱汗出者此爲營弱衛強陰虛陽  
必湊之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛  
氣自和風邪無所容遂自汗而解非若麻黃能  
開腠理發出其汗也汗多用桂枝者以之調和  
營衛則邪從汗解而汗自止非桂枝能閉汗孔  
也○亦惟有汗者宜之若傷寒無汗則當以發  
汗爲主而不獨調其營衛矣故曰無汗不得服  
桂枝有汗不得服麻黃以桂枝湯中有芍藥故也

亦治手足痛風脇痛

桂枝湯中有芍藥故也

桂枝用作引經藥風屬肝桂枝能平肝東垣曰桂  
枝橫行手背以其爲肢也又曰氣薄則發泄桂  
枝上行而解表氣厚則發熱肉桂下行而補腎  
李士材曰肉桂乃近根之最厚者桂心卽在中  
之次厚者桂枝卽項上細枝肉桂在下主治下  
焦桂心在中主治中焦桂枝在上主治上焦  
此本乎天者親上本乎地者親下之義也

桂性偏陽陰虛之人一切血證最能動血不可誤投

最能動血

桂子辛

溫入腎助陽消

木犀花辛溫用百藥煎熬見茶作糕餅噙生

陰

津辟臭化痰治風蟲牙痛同麻油蒸熟潤髮及

作面脂桂葉搗碎浸水洗髮去垢除風

宣散上焦風熱

辛夷

一名木筆花  
一名迎春花

辛溫輕浮入肺胃氣分能助

胃中清陽上行通於頭腦溫中解肌通九竅利

閔節主治鼻淵鼻塞

肺主鼻胆移熱於腦則鼻多濁涕而淵風寒客於腦

則鼻塞經曰老滯爲涕王水曰胆液不溢則爲濁涕如臭不已故曰鼻淵

及頭痛面

黑作面脂目眩齒痛九竅風熱之病辛香走

宣虛人偶感風寒而鼻塞者禁之頭痛屬血虛火熾者服之轉甚李時珍曰肺開竅於鼻陽明胃脈環鼻上行腦爲元神之府鼻爲命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭爲之傾九竅爲之不利○人之記性皆在腦中小兒善忘者腦未滿也老人健忘者腦漸空也凡人外見一形必有一形留於腦中今人每記憶往事必閉目上瞪而思索之此卽寧神於腦之意也去外皮毛毛射肺令人微焙芎窮爲使惡石脂畏菖蒲石膏蒲黃黃連

宜調氣  
重煖胃

沉香 辛苦性溫諸木皆浮而沉香獨沉故能下

氣而墜痰涎怒則氣上能降亦能升故能理平肝下氣

諸氣而調中

東垣曰上至天下至泉用與使最相宜

其色黑體

故入右腎命門煖精助陽行氣溫中治心腹疼

痛噤口毒痢癥癬邪惡冷風麻痺氣痢氣淋肌

膚水腫大腸虛閉氣虛下陷陰虧火旺者切勿沾唇

色黑沉水油熟者良香甜者性平辛辣者性熱

鴟鴞斑者名黃沉如牛角黑者名角沈咀之軟削之卷者名黃蠶沉甚難得半沉者爲煎香棲香勿用雜骨香雖沉而心空并不堪用不沉者爲黃熟香

人湯

剝磨汁沖服丸散紙裹置懷中待燥研之忌

火

溫腎  
煖胃

丁香

辛溫純陽泄肺溫胃大能療腎壯陽事煖

陰戶治胃冷壅脹嘔噦呃逆

嘔逆有痰阻氣滯食塞不得升降者

有火鬱下焦者有傷寒汙吐下後中氣大虛者  
有陽明內熱失下者有痢疾大下胃虛而陰火  
上沖者丹溪曰入之陰氣依胃爲養土傷則木  
挾相火直冲清道而上古人以爲胃寒用丁香  
柿蒂不能清瘀利氣唯助火而已時珍曰當視  
虛實陰陽或池熟或降氣或溫或補或吐或丁  
可也古方單用柿蒂取其苦溫降氣濟生加丁  
香生姜以取其開鬱散瘀亦嘗取效朱氏但執  
以寒治熱矯杜之過矣

痃癖奔豚腹痛口臭

丹溪曰脾有

中濁氣上行發爲口氣治以丁腦治以丁  
香是揚湯止沸耳唯香薷最捷膚症齒齦痘瘡

灰曰不發辛熱而燥非屬虛寒豈勿施用

雄者顆小爲丁香雌者顆大爲母子香即雞舌

香異鬱金忌火

宜理氣

白檀香 辛溫調脾胃利胸膈療噎膈之吐止心腹之疼辟鬼殺蟲開胃進食能引胃氣上升

單和血

紫檀香 酸平血分之藥和營氣消腫毒敷金瘡

止血定痛

諸香動火耗氣夏月藿香辟臭尚

謂其散真氣而開毛孔況服之乎癰疽潰後諸瘡膿多及陰虛火盛俱不宜用

宣辟惡  
止血生

降真香 辛溫辟惡氣怪異療傷折金瘡止血定

肌

痛消腫生肌

周崇被海寇亦傷血出不止敷花  
蕊石散不效軍士李高用紫金藤

散敷之血止痛定明日結痂無瘢曾救  
萬人紫金藤卽降真香之最佳者也

忌同

檀香 燒之能降諸真故名

宣順氣

烏藥

辛溫香氣上入脾肺下通膀胱與腎能疏

胸腹邪逆之氣一切病之屬氣者皆可治

四磨湯治

七情鬱結上氣喘急者降中兼收泄中兼補也  
方用人參烏藥沉香枳榔各濃磨汁七分合煎

服氣順則風散故用以治中氣中風

厥逆痰壅口噤脈伏

身溫爲中風身冷爲中氣又有痰爲中風無痰  
爲中氣局方治此亦用烏藥順氣散許學士云  
暴怒傷陰喜傷陽憂愁不已氣多厥逆往來  
得中氣之証不可作中風治○老人卒倒大抵