

臨證指南醫案

臨證指南醫案目錄

卷三

嘔吐 噎噎 吐衄 不食 腸痺 便閉 肺痺 胸痺 喘呃 疝 風 寒 風 溫熱 暑

此症年過
五十者不
治

陽上結
陰下格

臨證指南醫案卷三

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲同較

〔噎膈反胃〕

吳脈小清。腕中隱痛。嘔惡吞酸。舌絳不多。此高年陽氣結於上。陰液衰於下。為關格之漸。當開痞通陽。議治

一法

川連

人參

薑汁

半夏

枳實汁

竹瀝

盧陰陽逆亂。已成關格。議用附子瀉心湯。為上熱下寒主治。

徐七老人食入涎湧。吐痰畧能嚥粥。二便艱少。是陽不轉旋上結。陰枯於下。便難極難調治。勿用腥油羶味。脈

弦大而搏。議妙香丸。又妙香丸仍服。每五日服大半夏湯。

毛老年形消。不食不便。氣衝湧涎。乃關格之症。議用進退黃連湯。

川連

淡乾薑

半夏

薑汁

人參

茯苓

附子

生白芍

濮七旬有年。納食腕脹。大便乾濇。並不渴飲。痰氣凝遏阻陽。久延關格最可怕。

川連

枇杷葉

半夏

薑汁

杏仁

枳殼

杜七老人積勞久虛。因渴飲冷。再傷胃陽。洞泄復加嘔吐。不受湯飲食物。上不得入。下不得出。此為關格難治

之症

人參

半夏

川連

淡乾薑

某清陽日結。腹窄不能納穀。陰液漸涸。腸失潤。大便難

桂枝

川連

半夏

薑汁少許

杏仁

茯苓 此症大忌燥熱

畢五夏問診。視曾說難愈之病。然此病乃積勞傷陽。年歲未老。精神已竭。古稱噎膈反胃。都因陰枯而陽結也。

秋分後復診。雨脈生氣日索。交早咽燥。晝日溺少。五液告涸。難任剛燥陽藥。是病諒非醫藥能愈。

大半夏湯。加黃連薑汁。

某脈寸口搏大。按之則濇。形瘦氣逆。上不納食。下不通便。老年積勞內傷。陽結不行。致脫閉陰枯。腑乏津營。

肝陰 胃汁

頌勞 陽亢 肺液 津液

液腐 氣滯

肺胃 氣不 降

肝鬱 氣逆

酒熱 鬱滯 肺胃

公二便交阻病名關格為難治

人參 枳實

川連 生乾薑

半夏

茯苓

蘇四向來翻胃原可撐持秋季驟加驚憂厥陽陡升莫制遂廢食不便消渴不已如心熱嘔吐涎沫五味中喜食酸甘肝陰胃汁枯槁殆盡難任燥藥通關胃屬陽土宜涼宜潤肝為剛臟宜柔宜和酸甘兩濟其陰

烏梅肉

人參

鮮生地

阿膠

麥冬汁

生白芍

某陽明汁乾成膈

梨汁

柿霜

玉竹

天冬

麥冬

甜杏仁

川貝

生白芍

三角胡

王五老年血氣漸衰必得數日大便通爽然後腕中納食無阻此胃汁漸枯已少胃氣下行之旨噎症萌矣病

乃操持太過身中三陽燔燥燥津所致故餌藥未能全功議用丹溪法

此潤膈之妙方若其壅滯亦無效

麥冬汁

鮮生地汁

柏子仁汁

甜杏仁汁

黑芝麻汁

杜蘇子汁

松子仁漿

水浸布紙絞汁

瀉清燉自然膏

馬六勞心勞力經營向老自衰平日服餌桂附生薑三十年病食噎不下膈吐出此在上焦之氣不化津液不

注於下初病大便艱澀按經云味過辛熱肝腸有餘肺津胃液皆奪為上燥倣嘉言清燥法不治之症

麥冬

麻仁

鮮生地

甜水梨

桑葉

石膏

生甘草

某

脈瀉左大食入為噎是屬液虧先宜理氣後用潤劑

半夏

雲茯苓

枇杷葉

枳實

竹瀝

不治之症

程

舌黃微渴痰多咳逆食下欲噎病在肺胃高年姑以輕劑清降

鮮枇杷葉

杏仁

鬱金

瓜蒌皮

山梔

淡香鼓

沈

格拒食物涎沫逆氣自左上升此老年悒鬱所致公使腑腸濁泄僅可延年議兩通陽明厥陰之法

半夏

苦杏仁

茯苓

橘紅

竹瀝

薑汁

俞

酒熱鬱傷腕中食阻而痛治以苦辛寒

小川連

半夏

香鼓

枳實

茯苓

薑汁

又

苦辛化燥噎阻不舒而大便不爽治手大陰

鮮枇杷葉

紫苑

蘇子

杏仁

鬱金

桃仁

某憂思鬱結凝痰阻礙已屬噎塞之象當怡情善調

炒半夏半錢

茯苓錢五

秫米錢三

枳實錢一

薑汁三小匙

憂鬱

楊四脈弦而小瀉食入脘痛格拒必吐清涎然後再納視色蒼眼筋紅黃昔肥今瘦云是鬱怒之傷少火皆變

壯火氣滯痰聚日擁清陽莫展脫管隘不能食物噎膈漸至矣法當苦以降之辛以通之佐以利痰清膈

莫以豆寇沉香劫津可也 不治

川黃連

杏仁

桔梗

土瓜萋皮

半夏

橘紅

竹瀝

薑汁

胃陽

朱三未老形衰納穀最少久有心下忽痛畏進湯飲不安近來常吐清水是胃陽日薄噎膈須防議用太半夏

湯補肺為宜

人參

半夏

茯苓

白香粳米

薑汁

河水煎

白六少食頗安過飽食不肯下間有冷膈涎沫湧吐而出此有年胃陽久餒最多噎膈反胃之慮飲以熟酒脫

中似乎快爽顯然陽微欲結所幸二便仍通濁尚下泄猶可望安

熟半夏二兩

茯苓二兩

生益智仁二兩

丁香皮錢五

新會皮一兩

淡乾薑一兩

右藥淨末分量用香

淡豆豉一兩洗淨煎汁法丸淡薑湯服三錢

呂六勞倦飢飽皆傷胃陽年及花甲最慮噎膈翻胃此麪飯酒肉重濁之物與病不合

半夏

薑汁

香豉

土瓜萋皮

杏仁

橘紅

馮六有年陽微酒濕厚味釀痰阻氣遂令胃失下行為順之旨脘窄不能納物二便如病在上中議以苦降

辛通佐以養胃用大半夏湯 不治

半夏

人參

茯苓

薑汁

川連

枳實

又胃屬脾陽以通為補見症脘中窒塞納食不易過膈膚淺見識以白豆蔻木香沈香麝莫獲速功不知老

人日衰愈投泄氣斯冲和再無復振之理故雲岐子九法後賢立辨其非夏季宜用外臺茯苓飲加葛蒲佐

以竹瀝薑汁辛滑可矣

顧四脈濡緩無力中年胸脇時痛繼以早食晚吐此屬反胃乃胃中無陽濁陰腐墮議做仲景陽明辛熱宣通

噎膈反胃

龍文書局校印

之例

吳興

半夏

華撥

淡乾薑

茯苓

又辛熱開濁吐減行走勞力即吐痰水食物陽氣傷也用吳興理中湯

尤脈緩右關弦知飢惡食食人即吐肢浮便唐弱少不渴飲此胃陽衰微開合之機已廢老年噎膈反胃乃

大症也

不治

人參

茯苓

淡附子

淡乾薑

炒粳米

薑汁

又通胃陽法服臍病原無所補祇以老年積勞傷陽之實所服之劑開肺即是泄氣苓連苦寒劫陽薑汁與

乾薑附子並用三焦之陽皆通耳若枳朴仍是泄氣與前義悖矣

人參

茯苓

淡附子

淡乾薑

劉旺脈左小弦右濡滑五旬又四陰陽日衰勞煩奔走陽愈傷致清氣欲結食入脫痛痰涎湧逆皆噎膈反胃

見症其飲酒愈甚由正氣先餒非酒能致病

川連

枳實汁

茯苓

半夏

廣皮白

黑山梔

薑汁

竹瀝

包六胸脫痞悶噎逆三四日必嘔吐粘膩或黃綠水液此屬反胃六旬有年是亦重病

川連

半夏

枳實

鬱金

竹茹

薑汁

陸脈沉微陽氣大傷陰濁僭踞旦食不能暮食周身掣痛背脹病狀著難愈之症

人參

附子

乾薑

茯苓

澤瀉

姚六腑陽不通降濁壅為反胃累遭病反老年難以恢復自能潛心安養望其悠久而已藥不能愈是病矣

人參

附子

乾薑

公丁香

薑汁和丸

某積勞有年陽氣漸衰濁凝瘀阻脫中常痛怕成噎膈便塞之症

桃仁

紅花

延胡

川棟子

半夏

橘紅

鬱金汁

瓜蒌皮

李雨關脈蹇澀食人氣阻吐涎稍通前已吐過痰濁膠粘此皆久積勞倦陽氣不阻旋速為噎膈反胃之症

此病最多反覆必須身心安遠方可却病徒藥無益耳

登隔有痰者極多此方為宜

陽衰
脫痺
血瘀

陽虛
陰濁
凝滯

半夏

薑汁

桃仁

韭白汁

香豉

瓜蒌皮

鬱金

某胃痛得瘀血去而減兩三年宿病復起食進痞悶怕其清陽結而成膈大意益氣佐通仍兼血絡為治

人參

半夏

茯苓

新會皮

木香

生益智

當歸

桃仁

水法丸服三錢

張三早食暮吐大便不爽病在中下初因勞傷胃痛痰瘀有形之阻

半夏

枳實

製太黃

桃仁

韭白汁

經云三陽結謂之膈又云一陽發病其傳為膈仲景云朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反丹溪謂

噎膈反胃名雖不同病出一體多因氣血兩虛而成然歷觀噎膈反胃之因實有不同大抵飲食之際氣

忽阻塞飲食原可下咽如有物梗塞之狀者名曰噎心下格拒飢不能食或食到喉間不能下咽者名曰

膈食下良久復出或膈宿吐出者名曰反胃夫噎膈一症多因喜怒悲憂恐五志過極或縱情嗜慾或恣

意酒食以致陽氣內結陰血內枯而成治宜調養心脾以舒結氣填精益血以滋枯燥夫反胃及胃中無

陽不能容受食物命門火衰不能薰蒸脾土以致飲食入胃不能運化而為朝食暮吐暮食朝吐治宜益

火之源以消陰翳補土通陽以溫脾胃故先生於噎膈反胃各為立法以治之其陽結於上陰虧於下而

為噎膈者用通陽開痞通補胃腑以及進退黃連附子瀉心諸法上熱下寒為治其肝陰胃汁枯槁及煩

勞陽亢肺胃津液枯而成噎膈者用酸甘濟陰及潤燥清燥為主其液虧氣滯及陽衰血瘀而成噎膈者

用理氣逐瘀兼通血絡為主其胃陽虛而為噎膈反胃及憂鬱痰阻而成者用通補胃腑辛熱開濁以及

苦降辛通佐以利痰清膈為主其肝鬱氣逆而為噎膈者兩通厥陰陽明為治其酒熱鬱傷脾胃氣不降

而為噎膈者用輕劑清降及苦辛寒開肺為主而先生於噎膈反胃治法可謂無遺蘊矣張景岳云治噎

膈大法當以脾腎為主其理甚通當宗之又有飲膈熱膈及憂氣志食寒之膈其主治各載本門茲不復

贅錄治九是證每因血枯氣衰致此凡香燥消滯之藥久在禁內案中雖有一二微用辛熱而亦必諦審其為陽微

濁路者其餘或苦辛泄滯而兼潤養或酸甘化液而直滋清或鬱悶於氣分而推揚穀氣或勞傷於血分而宣通瘀濁總以調化機關和潤血脈為主陽氣結於上陰氣衰於下二語實為證之確切論也姚亦陶

果係屬症百無一生不必言治若反胃則古以
案多用人參其意以為不食胃虛不可不用參以補其精氣不知噎膈之症必有瘀血頑痰逆氣阻膈
胃氣其已成者百無一治其未成者用消痰去痰降氣之藥或可望其通利若用人參雖或一時精氣稍
旺而病根益深是永無愈期矣

噎噎

王二初用辛通見效多服不應想雨濕泛潮都是濁陰上加致胃陽更困做仲景胃中虛客氣上逆噎氣不除

例

人參 旋覆花 代赭石 半夏 茯苓 乾薑 治此方也但仲景以
味淡嘔惡噎氣胃虛濁逆 白旋覆花 釘頭代赭 半夏 薑汁 人參 茯苓

某 壯年飲酒緊溼脾陽受傷已久積勞飢飽亦令傷陽遂食入反出噎氣不爽隔拒在乎中焦總以溫通鎮
逆為例 白旋覆花 釘頭代赭 茯苓 半夏 淡附子 淡乾薑

徐 噎氣不爽食後甚 杏仁 半夏 橘紅 厚朴 鬱金 桔梗
陳仁 多噎胸膈不爽胃陽弱宜薄味 人參 生白朮 茯苓 新會皮 半夏 益智仁 厚朴 生薑

某 噎氣腹微痛脾胃未和 人參 焦白芍 茯苓 茯苓 炙甘草

脾肺 胃陽 脾陽 不脾虛和胃

噎是飽食而氣出胃口人人有之方亦云噎非病也此非病也俗名冷逆噎即病之是病者之病非為一

內經止有噎字而無噎字故經云五氣所病心為噎又云寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃故為噎
夫噎噎一症或傷寒病後及大病後多有此症蓋以汗吐下後大邪雖改胃氣弱而不和三焦因以失職
故清無所歸而不升濁無所納而不降是以邪氣留連噎噎作飽胸膈不爽而為心下痞鞭噎氣不除乃
胃陽虛而為陰所格阻陽足則充周流動不足則膠固格阻矣仲景立旋覆代赭湯用人參甘草養正補
虛薑棗以和脾胃所以安定中州者至矣更以旋覆花之力旋轉於上使陰中隔阻之陽升而上達又
用代赭石之重鎮降於下使鬱陽留滯之陰降而下達然後參甘大棗可施其補虛之功而生薑半夏可

肝犯胃

奏其開痞之效。而前賢治噯噯一症。無出仲景右矣。故先生於胃虛客氣上逆。及胃陽虛。脾胃不和。胸氣不降。而為噯噯者。每宗仲景法。加減出入。或加杏仁。桔梗。以開肺。智仁。朴米。以散滿。甘草。白芍。以和胃。靡不應手取愈。可謂得仲景心法矣。鄒時乘

嘔吐

高四因阻吞酸痞脹。食入嘔吐。此肝陽犯胃。用苦辛泄降。

吳茱萸

川連

川棟子

杏仁

茯苓

半夏

厚朴

錢七脈細。右堅大。向有氣衝。長夏土旺。嘔吐不納。食頭脹。腕痺。無非厥陽上冒。議用苦辛降逆。酸苦泄熱。不加

嗔怒。胃和可愈。

川連

半夏

薑汁

川棟子皮

烏梅

廣皮白

金三四脈細小。而弦。風木乘土。當春勢張。食入不變。嘔吐。得小便通少。緩治。以通陽。

炮附子

人參

半夏

吳茱萸

淡薑

茯苓

又脈右弦濇。陽微陰凝。食入則吐。胃痛脹甚。半月前用藥得效。後反大便欲解不通。臍腸不利。濁乃上攻。先

用玉壺丹七分。四服。

蔣三脈沈。食入嘔吐。忌冷滯食物。

吳茱萸

半夏

薑汁

茯苓

公丁香柄

廣皮白

顧脈濡弱。左脇下久有聚氣。納食釀積於胃脘之中。兩三日嘔噯吞酸。積物上湧。吐出。此皆怫怒動肝。肝木

犯胃。胃中陽傷。不能傳及小腸。遂變化失司。每七八日始一更衣。為胃氣不主下行故也。法當溫胃。陽制肝

逆。宿病久纏。恐多反覆。此等將成反胃之症。何可純用辛熱。

淡附子

淡乾薑

薑汁

生白芍

淡吳茱萸

白粳米

朱胃中不和。食入嘔吐。怒動而病。必先治肝。溫膽。合左金為宜。去甘草。茯苓。加薑汁。

某氣自左升。腹中膨滿。嘔吐涎沫。黃水。暴咳不已。是肝氣逆乘。過胃犯肺。當制肝和胃。安就丸。

某嘔黑綠苦水。顯濁下焦。濁邪犯胃。

人參

川椒

烏梅

茯苓

紫石英

桑螵蛸

沈 食過逾時。漾漾瀉瀉欲吐。診脈濡瀉。以胃虛肝乘。宗仲景旋覆代赭法。

旋覆花 代赭石 人參 半夏 茯苓 廣皮

王 肝病犯胃嘔逆。口吐清涎。頭暈。乳房痛。肢麻痺。 人參二兩 茯苓二兩 桂枝木七錢

川楝子一兩 川連七錢 烏梅半兩 當歸半兩 生白芍兩

某 冷濕傷胃。肝木上侮。衝氣欲嘔。腹痛。淡吳茱萸 厚朴 草薢 藿香梗 木瓜 茯苓

毛 姬因驚。肝氣上犯。衝逆嘔吐。涎陽升至顛。為頭痛。脈右弱左弦。當從厥陰陽明治。

人參 川連 茯苓 川楝 川椒 烏梅 乾薑 生白芍

某 脈弦虛。食已漾漾欲吐。咽阻。中痞有痰。 人參 吳茱萸 茯苓 半夏 廣皮 薑汁

陸 鼻明。湯水下咽嘔吐。右脈小欲歇。明是勞傷。肝乘胃反。小半夏湯加檀香泥沙白粳米。

顏 乾嘔脇痛。因惱怒而病。是厥陰侵侮陽明。脈虛不食。當與通補。大半夏湯加薑汁桂枝南棗。

某 肥膩滯胃。肝木始得再乘土位。致氣逆上壅嘔出。久病至節反劇。最屬不宜。總是調攝未盡善。奈何。

暫與降逆平肝安胃一法。 降香 蘇子 旋覆花 茯苓 半夏 廣皮 韭汁

范 脇痛入腕。嘔吐黃濁水液。因驚肝。肝風振起。犯胃平昔液衰。難用剛燥。議養胃汁以熄風方。

人參 此是飲症 炒半夏 炒麥冬 茯苓 廣白皮 炒香白粳米

又 六味去更換芍加麥冬阿膠秋石 動氣肝逆痰性凝寒滯胃。卒然大痛嘔涎。乃逆滯上攻也。治肝厥以通例。

炒黑川椒 烏梅肉 生乾薑 川桂枝木 人參 白芍

某 精勞傷陽先已脇痛。昨頻吐微眩。脈弱汗出。胃中已虛。肝木來乘。防有呃逆吐衄。微仲景食入則嘔。

者。吳茱萸湯主之。

吳茱萸 半夏 茯苓 薑汁 粳米

王四早上水飲米粥至晚吐出不化知濁陰酉戌升逆癥形痛而漸大九藥吐出不化胃陽之極矣兩逆平肝理氣不效法當辛熱開濁不治之症

某肝風犯胃嘔逆眩暈苦降酸泄和陽佐微辛以通胃

川連 黃芩 烏梅 白芍 半夏 薑汁

李厥吐腹痛氣衝 安胃丸

王胃虛少穀肝來乘尅嘔吐不能受納蓋臟厥象也

人參 川連 附子 黃芩 乾薑 枳實

張氏勉強攻胎氣血受傷而為寒熱經脈之氣而為身痛乃奇經衝任受病而陽維脈不用事也內經以陽維為病苦寒熱維者一身之剛維也既非外感羌蘇柴葛三陽豆發世無是病又芍藥枳朴之屬辛散繼以苦寒未能中病胃口屢傷致湯飲皆噦出無餘大便不通已經半月其吐出形色青綠涎沫顯然肝風大動將胃口翻空而腸中污水得風相如浪滾東西蕩漾矣熄風鎮胃固是定理但危篤若此明理以還天眷耳

淮小麥 粒 大麻仁 錢 阿膠 二錢 生地 二錢 秋石 拌人參 錢 南棗肉 錢 方不切病宜專治吐

此症乃瘀血留中之能病此者乃

厥陰

陳氏未病先有耳鳴眩暈恰值二氣之交是冬藏根蒂未固春升之氣池越無以制伏更屬產後精氣未復又自乳耗血去液虧真陰日損陽氣不交於陰變化內風上巔犯竅衝逆肆橫胃掀吐食攻腸為瀉襲走脈絡肌肉皆腫譬如諸門戶盡撤遂致暴風飄漾之狀醫者辛散苦降重墜不但病未曾理致陽更泄陰愈涸煩則震動即厥由二氣不能自主之義閱王先生安胃一法最為卓識所參拙見按以兩脈右手濡弱虛象照然左脈空大按之不實亦非肝氣肝火有餘皆因氣味過辛散越致二氣造偏茲以病因大旨兼以經義酌方 人參 茯苓 半夏 白芍 煨薑 炒粳米

周痛從少腹上衝為嘔為脹是厥陰穢濁致患

補脾胃

韭白根

淡吳茱

小茴香

桂枝木

兩頭尖

茯苓

小茴香

又炒橘核

炙山甲木

韭白

歸尾

川棟子

延胡索

徐六氣衝偏左厥逆欲嘔盡方適伏飲在於肝絡辛以通之

吳茱

半夏

茯苓塊

淡乾薑

代赭石

旋覆花

某脈搏肢冷嘔逆下痢白積生冷水寒鬱生陽氣上擡心大痛乃厥陰濁邪上攻

吳茱

丁香

藿香

川棟子

木香

廣皮

茯苓

褚二清涎上湧食物吐出乃飢飽傷及胃中之陽禁鮮葷冷滑經年可安

半夏

厚朴

生益智

薑汁

生白米

茯苓

宋三陽微不運水穀悍氣聚滯致食入即嘔周身牽掣不和乃陽明之脈不用事也久延恐致腫脹

苓薑木桂湯如厚朴椒目

陸七食已即吐病在胃也用辛以通陽苦以清降

半夏

川連

厚朴

茯苓

薑汁

曹四早食頗受晚食必胃痛嘔吐陽氣日微濁陰聚則有形夜痛至曉陰邪用事乃劇

半夏

薑汁

淡乾薑

秦椒

厚朴

茯苓

王診脉右濡左弦舌白不飢瘀血上吐下瀉胃陽大傷藥餌下咽則湧前醫用大半夏湯不應詢如所吐皆

係酸水痰沫議以理陽方法此飲症也

人參

茯苓

川椒

乾薑

潘八食後吐出水液及不化米粒二便自通並不渴飲五年不愈宜理胃陽用仲景法

熟附子

半夏

薑汁

白粳米

又泄濁陰劫水飲以安胃陽服四日腹脹吐水已減知陽腑之陽非通不闔再宗仲景法

真武湯加人參

范脉虛無神聞穀乾嘔汗出振寒此胃陽大虛不必因寒熱而攻邪

人參 茯苓 炒半夏 薑汁 烏梅 陳皮

又 脈微細小。胃陽大衰。以理中兼攝其下。人參 淡熟附子 茯苓 炒粳白米 炒黃淡乾薑

又 人參 茯苓 乾薑 煨益智仁 廣皮 生白芍

金 參藥不受。皆濁陰在上。阻塞氣機。幾無法矣。勉與白通湯。加人尿猪膽汁。急進以通陽泄濁。

附子 生淡薑 葱白 五寸 人尿 猪膽汁

沈 九吹笛震動元海病。治宜填實下焦。但嗆食吐出。又便溏不實。中無砥柱。陰藥下未受益。中再受傷矣。

做補益中宮。仍佐鎮逆一法。人參 焦米 炒焦半夏 茯苓 旋覆花 代赭石

吳 寒熱邪氣擾中。胃陽大傷。酸濁上湧。吐出。脘痛如刺。無非陽衰。陰濁上僭。致胃氣不得下行。高年下元衰

憊。必得金底煖蒸。中宮得以流通。擬用仲景附子瀉心湯。通陽之中。原可泄熱開導。前藥按法用之。

人參 半錢 熟附子 半錢 淡乾薑 錢 三味另煎汁 川連 炒半夏 半錢 枳實 錢 茯苓 錢 後四味

用水一盞滾水一杯煎三十沸。和入前三味藥汁服。

江 脈弦遲。湯水不下。膈嘔吐涎沫。此陽結飲邪阻氣。議以辛熱通陽反佐苦寒利膈。用瀉心法。

人參 附子 乾薑 先煎一杯入薑汁四分 川連 黃芩 半夏

枳實 滾水煎和入前藥服

孫 叶食物隨入即吐。並不渴飲。當年以苦辛得效。三載不發。今心下常痛如辣。大便六七日始通。議通膈

生薑瀉心湯。生薑汁 四分 川連 六分 黃芩 二錢 熟半夏 三錢 枳實 錢 人參 五分 同煎

又 問或不吐食物。腹中腰脅似乎氣墜。自長夏起。心痛頭重。至今未減。思夏熱必兼濕。在裡水穀之濕。與

來之熱相洽。結聚飲邪矣。當緩攻之。議用控涎丹五分。間日一用。

五 診脉左弦右弱。食粥脫中有聲。氣衝湧吐。此肝木乘胃。生陽已薄。皆情懷不適所致。大半夏湯

某 中焦火衰。食下不運。作酸嘔出。炒黃乾薑 錢 川椒 炒 三 半夏 少 錢 茯苓 三 錢 炒飴糖 錢

中陽虛

區士

龍文書局校印

鮮竹如錢

半夏

金石斛

茯苓

廣皮白

枳實

薑汁

吳兩番探吐脫痛立止氣固宣暢胃津未能無損風木來乘外冷裡熱診脈右大並不搏指當少少進穀以

養胃多噯多下泄氣調和中焦為宜

炒竹茹

半夏

川斛

橘紅

黑山梔

香豉

曹四少腹屬肝肝厥必犯陽明胃脘故作痛嘔二年來病人已不知因何起病醫徒見病圖治想肝腎必自內

傷為病久則奇經諸脈交傷經謂衝脈動而諸脈交動也議溫通柔潤劑從下焦虛損主治

淡菴卷乾

茯苓

當歸

杞子

炒沙苑

肉桂心

後加鹿角霜

何寒熱嘔吐胸中格拒喜煖飲怕涼平昔胃陽最虛熱邪內積體虛邪實最防痙厥

人參

黃芩

炒半夏

薑汁

川連

枳實

某舌赤濁嘔不寐不飢陽邪上擾治以苦辛進瀉心湯

淡黃芩

川連

炒半夏

枳實

某鬱熱阻飲痺嘔有年最慮嗜膈

半夏

金斛

薑汁

茯苓

杏仁

廣皮白

毛氏舊有胃痛脫痺嘔吐之病秋前舉發已得小安近痛嘔復來身體熾熱宿病未罷而暑熱穢氣上竅侵入

三焦混淆恐內閉變現痙厥川連

淡黃芩

半夏

薑汁

黑山梔

枳實

某舌黃不渴飲久嗽欲嘔吐前用金匱麥門冬湯養胃小效自述背寒口吐清痰暑濕客邪未盡虛體當輔

正醒脾却暑

人參

茯苓

廣皮

半夏

薑汁

郭五知飢能納忽有氣衝涎沫上湧脫中格拒不堪容物內經謂肝病吐涎沫丹溪云上升之氣自肝而出木

火上凌暴金受剋咳倉日加治以養金制木使土宮無戕賊之禍滋水制火令金臟得清化之權此皆老年

積勞致傷豈攻病可效

蘇子

麥冬

枇杷葉

杏仁

北沙參

桑葉

丹皮

降香

曹四勞倦嗔怒嘔吐身熱得汗熱解而氣急不寐不飢仍是氣分未清先以上焦主治以肺主一身氣化也

杏仁

鬱金

山梔

香豉

橘紅

瓜蒌皮

嘔吐症內經與金匱論之詳矣乃後人但以胃火胃寒痰食氣滯立論不思胃司納食主乎通降其所以
不降而上逆嘔吐者皆由於肝氣衝逆阻胃之降而然也故靈樞經脉篇云足厥陰肝所生病者胸滿嘔
逆况五行之生剋木動則必犯土胃病治肝不過隔一之治此理淺近易明人乃不能察而好奇之輩反
誇隔二隔三之治豈不見笑於大方也哉試觀安胃丸理中安丸所用椒梅及胃虛客氣上逆之旋覆
代赭此皆胃藥乎抑肝藥乎於此可省悟矣今觀先生之治法以泄肝安胃為綱領用藥以苦辛為主以
酸佐之如肝犯胃而胃陽不衰有火者泄肝則用芩連棟之苦寒如胃陽衰者稍減苦寒用苦辛酸熱此
其大旨也若肝陰胃汁皆虛肝風擾胃嘔吐者則以柔劑滋液養胃熄風鎮逆若胃陽虛瀉陰上逆者用
辛熱通之微佐苦降若但中陽虛而肝木不甚亢者專理胃陽或稍佐椒梅若因嘔傷寒鬱化熱劫灼胃
津則用溫膽湯加減若久嘔延及肝腎皆虛衝氣上逆者用溫通柔潤之補下焦主治若熱邪內結則用
瀉心法若肝火衝逆傷肺則用養金制木滋水制火總之治胃之法全在溫通虛則必用人參藥味皆屬
和平至於治肝之法藥味錯雜或寒熱互用或苦辛酸鹹並投蓋因厥陰有相火內寄治法不得不然耳
但觀仲景烏梅丸法概可知矣案輯六十有餘大半皆由肝邪為患非先生之卓識安能暢發此理乎哉
華岫雲

肝胃虛

所錄諸方屬蓄飲者四五屬反胃者二三反胃自有主治之法蓄飲亦有成方可用乃全不分列難以治
肝胃之藥參錯成方又用人參及薑附者七八皆與反胃蓄飲相反則嘔吐一症此本全未見也

不幸矣
洞定有一金姓者患嘔吐症數年其先人於此老甚相契此老謂多治之年餘皆用此等方而病
者幾殆因求治於余余曰蓄飲也世無知者為製一方其病立已其人因受業於余即此可徵矣

吐就

王

厥陰吐蛇寒熱乾嘔心胸痞拒舌黑渴不欲飲極重之症
烏梅肉錢桂枝木錢炒黑川椒四白芍錢小川連三黃芩錢生淡乾薑錢

脈右歇舌白渴飲腕中痞熱多嘔逆稠痰曾吐蛔蟲此伏暑濕皆傷氣分邪自裏發神欲昏冒溼相不達

此亦痰飲
病也

自利粘痰議進瀉心法。半夏瀉心湯

又凡疝蟲上下出者皆屬厥陰乘犯陽明內風入胃嘔吐痰涎濁沫如仲景厥陰篇中先厥後熱同例試論寒熱後全無汗解謂至陰伏邪既深焉能隔越諸經以達陽分閱醫藥方初用治肺胃後用溫膽茯苓飲但和胃治痰與深伏厥陰之邪未達前進瀉心湯苦可去濕辛以通痞仍在上中服後胸中稍舒逾時稍寐寐醒嘔吐濁痰有黃黑之形大凡色帶青黑必係胃底腸中逆湧而出老年衝脈既衰所謂衝脈動則諸脈皆逆身迷嘔吐之時周身牽引直至足心其陰陽蹻維不得自固斷斷然矣仲景於半表半裡之邪必用柴芩今上下格拒當以桂枝黃連湯為法參以厥陰引經為通理之使俾衝得緩繼進通補陽明此為治厥陰章旨也

淡乾薑 桂枝 川椒 烏梅 川連 細辛 茯苓 此病宜用鎮安法

又肝鬱不舒理進苦辛佐以酸味者恐其過剛也做食穀則嘔例

人參 茯苓 吳萸 半夏 川連 烏梅

又瘧來得汗陰分之邪已透陽經第痰嘔雖未減青綠形色亦不至最屬可喜舌心白苔未淨舌邊漸紅而

神倦困憊清邪佐以輔正一定成法 人參 半夏 茯苓 枳實汁 乾薑 川連

又食入欲嘔心中溫溫液液痰沫味鹹脊背上下引痛腎虛水液上泛為涎督脈不司約束議用真武撤其

水寒之逆二服後接服 人參 半夏 桂枝 茯苓 煨薑 南棗

又別後寒熱三次較之前發減半但身動言語氣衝湧痰吐逆四肢常冷寒熱汗出時四肢反熱此陽衰胃

虛陰濁上乘以致清氣無以轉舒議以胃中虛客氣上逆為噎氣嘔吐者可與旋覆代赭湯仍佐通陽以制

飲逆加白芍附子

又鎮逆方雖小效究是強制之法凡痰飲都是濁陰所化陽氣不振熱必再熾仲景謂飲邪當以溫藥和之

前方劫胃水以醒陽亦是此意議用理中湯減甘草之守仍加薑附以通陽并入草菓以醒脾