

2017

# 临床执业助理医师资格考试

## 押题秘笈

阿虎医考命题研究中心 组编

免费赠送

习题精讲班网络课程

### 三套卷子 题题解析



上海科学技术出版社  
Shanghai Scientific & Technical Publishers

全国百佳图书出版单位  
Top 100 Publishing Houses in China



阿虎医考  
AHUYIKAO.COM

# 临床执业助理 医师资格考试

## 押题秘笈



## 模拟试卷一

阿虎医考命题研究中心 组编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

---

2017 临床执业助理医师资格考试押题秘笈/阿虎医考  
命题研究中心组编. —上海:上海科学技术出版社,2017. 1  
ISBN 978-7-5478-3388-9

I. ①2… II. ①阿… III. ①临床医学—资格考试—  
习题集 IV. ①R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 292512 号

---

授权码粘贴处

2017 临床执业助理医师资格考试押题秘笈

阿虎医考命题研究中心 组编

---

上海世纪出版股份有限公司 出版  
上海科学技术出版社  
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行  
200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co  
印刷

开本 787×1092 1/16 印张 13.25  
字数: 230 千字  
2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷  
ISBN 978-7-5478-3388-9/R·1292  
定价: 35.00 元

---

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,  
请向工厂联系调换

# 临床执业助理医师资格考试

## 第一单元

姓 名：\_\_\_\_\_

准考证号：\_\_\_\_\_



## A1 型选择题(1~62 题)

## 答题说明

每一道试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。

1. 嵌顿疝发生率最高的是  
A. 脐疝  
B. 斜疝  
C. 直疝  
D. 股疝  
E. 切口疝
2. 阻塞性肺气肿最常见的病因是  
A. 支气管哮喘  
B. 支气管扩张  
C. 慢性支气管炎  
D. 重症肺结核  
E. 肺尘埃沉着病(尘肺)
3. 医德评价方式不包括  
A. 正式社会舆论  
B. 非正式社会舆论  
C. 传统习俗  
D. 内心信念  
E. 卫生行政仲裁
4. 属于不可逆性病变的是  
A. 水泡变性  
B. 脂肪变性  
C. 核碎裂  
D. 线粒体肿胀  
E. 内质网扩张
5. 胸外心脏按压抢救心脏骤停,下列何项表现最常提示治疗有效  
A. 上肢血压达 7.89 kPa(60 mmHg)  
B. 心音清晰规则  
C. 触及颈动脉搏动  
D. 瞳孔变小  
E. 神志恢复
6. 风心病二尖瓣狭窄最重要的体征是  
A. 心尖区第一心音亢进  
B. Graham Steel 杂音  
C. 心尖区舒张中晚期隆隆样杂音  
D. 二尖瓣开放拍击音  
E. 肺动脉瓣区第二心音亢进
7. 为提高医务人员对患者识别的准确性,医院管理中强调必须严格执行“三查七对”制度。其中“三查”是指  
A. 开方查、配药查、输液查  
B. 门诊查、住院查、家访查  
C. 门诊查、住院查、出院查  
D. 开方查、取方查、发药查  
E. 操作前查、操作中查、操作后查
8. 上消化道出血部位是指  
A. 食管、胃出血  
B. 食管、胃、十二指肠球部出血  
C. 屈氏韧带以上部位出血  
D. 空肠以上部位出血  
E. 回盲瓣以上部位出血
9. 下述哪项不是痔形成的因素  
A. 无静脉瓣  
B. 静脉壁薄弱,结缔组织萎缩缺乏支持  
C. 直肠上、下静脉丛畸形  
D. 腹压增高  
E. 直肠肛管慢性感染
10. 胸部损伤外科治疗原则是  
A. 纠正酸碱平衡失调  
B. 纠正电解质紊乱  
C. 给予脱水利尿剂  
D. 给予镇痛、输血  
E. 纠正循环、呼吸功能障碍

11. 慢性萎缩性胃体胃炎的发病原因主要是
- A. 慢性缺氧
  - B. 与胆汁反流有关
  - C. 与长期吸烟、饮酒有关
  - D. 由 B 型萎缩性胃炎(胃窦胃炎)发展而来
  - E. 与自身免疫有关
12. 复方碘溶液治疗一般用于
- A. 甲亢术前准备
  - B. 甲亢术后复发
  - C. 甲状腺癌
  - D. 甲减
  - E. 甲状腺炎
13. 肝硬化患者全血细胞减少最主要的原因是
- A. 营养吸收障碍
  - B. 骨髓造血功能低下
  - C. 脾功能亢进
  - D. 上消化道出血
  - E. 肝肾综合征
14. 周围型肺癌长大阻塞支气管管腔时, X 线表现为
- A. 膈肌抬高
  - B. 全肺不张
  - C. 气管明显移位
  - D. 气管分叉角度增大
  - E. 节段性肺炎或肺不张
15. 急性出血坏死型胰腺炎特征性病变是
- A. 上腹部可触及包块
  - B. 脐周及侧腹部呈青紫色
  - C. 黄疸
  - D. 腹痛向腰背部放散
  - E. 腹痛持续 1 周以上
16. 短期饥饿时, 血糖浓度的维持主要靠
- A. 肌糖原分解
  - B. 肝糖原分解
  - C. 酮体转变成糖
  - D. 糖异生作用
  - E. 组织中葡萄糖的利用
17. 溃疡性结肠炎腹痛的规律是
- A. 进食—腹痛加剧
  - B. 腹痛—进食—缓解
  - C. 进食—腹痛—便后缓解
  - D. 腹痛—便意—便后缓解
  - E. 腹痛—便意—便后加剧
18. DNA 携带生物遗传信息这一事实意味着
- A. 不论哪一物种的碱基组成均应相同
  - B. 病毒的侵染是靠蛋白质转移至宿主细胞来实现的
  - C. 同一生物不同组织的 DNA 其碱基组成相同
  - D. DNA 的碱基组成随机体年龄及营养状况而改变
  - E. DNA 以小环状结构存在
19. 共同参与型的医患关系模式最适合于
- A. 急性病病人
  - B. 绝症病人
  - C. 慢性病病人
  - D. 重症病人
  - E. 精神病病人
20. 反映直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的心理过程是
- A. 感觉
  - B. 知觉
  - C. 记忆
  - D. 思维
  - E. 想象
21. 中国居民膳食宝塔最高层是
- A. 蔬菜
  - B. 谷类
  - C. 奶类

- D. 油脂  
E. 肉类
22. 关于溶血反应的治疗哪项是不恰当的  
A. 肝素治疗  
B. 20%甘露醇 250 ml 静脉快速滴注  
C. 减慢输血速度至每分钟 10 滴  
D. 5%碳酸氢钠 250 ml 静脉滴注  
E. 输血浆
23. 肺结核空洞、肺癌空洞和肺脓肿空洞的鉴别,最主要的项目是  
A. 病史、症状、体征  
B. 胸部正、侧位 X 线片+体层照片  
C. 放射性核素扫描  
D. 痰细胞学和细菌学检查  
E. 肺部 B 超
24. 恶性肿瘤对邻近组织器官侵犯的主要方式是  
A. 直接蔓延  
B. 淋巴管播散  
C. 小静脉播散  
D. 小动脉播散  
E. 种植性播散
25. 室性心动过速伴严重血流动力学障碍时,治疗应首选  
A. 利多卡因  
B. 电复律  
C. 慢心律  
D. 普鲁卡因酰胺  
E. 奎尼丁
26. 慢性阻塞性肺疾病(COPD)的主要特征是  
A. 大气道阻塞  
B. 小气道阻塞  
C. 双肺哮鸣音  
D. 桶状胸  
E. 胸片显示肺野透亮度增加
27. 普萘洛尔抗心绞痛的主要机制是  
A. 降低心脏前负荷,减少耗氧量  
B. 降低心脏后负荷,减少耗氧量  
C. 扩张冠状血管,增加供氧量  
D. 降低心内压,减少耗氧量  
E. 减慢心率,抑制心肌收缩力,耗氧量下降
28. 以下哪一项更符合肝硬化失代偿期的临床表现  
A. 蜘蛛痣,腹水,月经失调  
B. 黄疸,齿龈出血,脾大  
C. 肝掌,腹水,性功能减退  
D. 腹水,脾大,下肢水肿  
E. 黄疸,脾大,胃底静脉曲张
29. 除下列哪一种氨基酸外,均为营养必需氨基酸  
A. 赖氨酸  
B. 丝氨酸  
C. 苏氨酸  
D. 色氨酸  
E. 甲硫氨酸
30. 对结核分枝杆菌 A 菌群作用最强的抗结核药物是  
A. 异烟肼  
B. 利福平  
C. 吡嗪酰胺  
D. 链霉素  
E. 乙胺丁醇
31. 近年来对心力衰竭的治疗更强调  
A. 强心、利尿、扩血管  
B. 降压、扩冠、抗凝  
C. 溶栓、抗血小板  
D. 主动脉内球囊反搏术支持下心脏移植  
E. 祛除病因和诱因,调节代偿机制,减少神经体液因子的负面效应
32. 结肠癌最早出现的症状是  
A. 贫血

- B. 腹部肿块
- C. 排便习惯改变
- D. 腹部隐痛
- E. 肠梗阻症状

33. 典型的坏血病是由下列何种物质缺乏而引起的

- A. 核黄素
- B. 泛酸
- C. 硫胺素
- D. 维生素 K
- E. 维生素 C

34. 酮体生成过多的主要原因是

- A. 摄入脂肪过多
- B. 肝内脂肪代谢紊乱
- C. 脂肪运转障碍
- D. 肝功能低下
- E. 糖供给不足或利用障碍

35. 属于感染性心内膜炎主要诊断标准的是

- A. Osler 结节
- B. Janeway 损害
- C. 风湿性心脏病伴发热
- D. 睑结膜瘀点
- E. 两次血培养均为同一典型致病菌

36. 急性梗阻性化脓性胆管炎最为关键的治疗是

- A. 静滴大量抗生素
- B. 输液, 补充血容量
- C. 纠正酸中毒
- D. 营养支持
- E. 胆道减压手术

37. 关于肺癌的临床表现, 哪一项不正确

- A. 肺癌转移至淋巴结的典型部位为前斜角肌区
- B. 发热的原因多为肿瘤继发感染
- C. 咯血以中央型肺癌多见

- D. 转移淋巴结的大小反映了病程的早晚
- E. 气促可由心包积液引起

38. 急性出血坏死型胰腺炎出现肠麻痹时不宜应用的药物

- A. 奥曲肽
- B. 肾上腺糖皮质激素
- C.  $H_2$ 受体阻断药
- D. 质子泵抑制药
- E. 抗胆碱能药物

39. 广义的职业病是指

- A. 与职业有关的疾病
- B. 由生产性毒物引起的疾病
- C. 由物理、化学性因素引起的疾病
- D. 由生物性因素引起的疾病
- E. 由职业性有害因素引起的特定疾病

40. 因溃疡病作胃大部切除术, 适当的胃切除是

- A. 30%~40%
- B. 40%~50%
- C. 50%~60%
- D. 60%~70%
- E. 70%~80%

41. 老年慢性呼吸衰竭患者, 呼吸表浅, 嗜睡, 需使用呼吸中枢兴奋剂时, 下列哪项是错误的

- A. 有明显缺氧、二氧化碳潴留者可使用
- B. 使用 12 小时无效者, 应考虑作气管插管或气管切开
- C. 必须与氧疗、抗感染、解痉、祛痰等措施相结合
- D. 各种原因所致的呼吸衰竭均为适应证
- E. 发生烦躁不安、抽搐时应减量或停药

42. 下列不属于吸烟健康干预促成因素的是

- A. 预防吸烟与戒烟
- B. 有无吸烟的限制(包括禁止吸烟的法律)

- C. 戒烟后生理状况得到改善
- D. 提供戒烟服务
- E. 规划纸烟的价格

43.  $t$  检验时,  $P > 0.05$  统计上可认为

- A. 两总体均数不同
- B. 两总体均数相同
- C. 两样本均数不同
- D. 两样本均数相同
- E. 两总体均数相同, 两样本均数不同

44. 如果某医师欲采用横断面调查研究的方法, 调查高血压病在人群中的分布情况, 选择最合适的指标为

- A. 病死率
- B. 发病率
- C. 死亡率
- D. 患病率
- E. 出生率

45. 在诊断闭合性腹部外伤合并内出血中, 以下哪一项最重要

- A. 右季肋部挫伤, 合并肋骨骨折
- B. 血红蛋白 90 g/L, 红细胞  $3 \times 10^{12}$  /L
- C. 右上腹明显压痛及腹肌紧张
- D. 血压 80/60 mmHg, 脉搏 110 次/分
- E. 腹腔穿刺抽出不凝固的血液

46. 比较完整的心理健康概念是指

- A. 十全十美的心理状态
- B. 适应环境和适应自我
- C. 没有疾病
- D. 适应自我
- E. 适应环境

47. 下肢静脉曲张进展到晚期可能出现的并发症中, 不包括

- A. 急性出血
- B. 踝上足靴区皮肤湿疹
- C. 血栓性静脉炎
- D. 踝上足靴区皮肤发生溃疡

E. 下肢淋巴水肿

48. 省、自治区、直辖市人民政府应当在接到发生或者发现不明原因的群体性疾病报告的几小时内向国务院卫生行政部门报告

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 3 小时
- D. 4 小时
- E. 5 小时

49. 下列哪一项不是我国冠心病主要的易患因素

- A. 高血压病
- B. 高脂血症
- C. 吸烟
- D. 甲状腺功能低下
- E. 糖尿病

50. 下列哪些因素不是高血压的病因

- A. 家族遗传
- B. 高钠饮食
- C. 高不饱和脂肪酸饮食
- D. 肥胖
- E. 睡眠呼吸暂停低通气综合征

51. 通常所说的血型是指

- A. 红细胞膜上的受体类型
- B. 红细胞表面特异凝集素的类型
- C. 红细胞表面特异凝集原的类型
- D. 血浆中特异凝集素的类型
- E. 血浆中特异凝集原的类型

52. 血中哪一种胆红素增加会在尿中出现胆红素

- A. 未结合胆红素
- B. 结合胆红素
- C. 肝前胆红素
- D. 间接反应胆红素
- E. 与清蛋白结合的胆红素

53. 关于成分输血的描述,错误的是

- A. 减少输血传播传染病的发生
- B. 治疗效果不如全血好
- C. 输血不良反应少
- D. 节约血液资源
- E. 便于保存和使用

54. 下列关于酶的叙述哪项是正确的

- A. 酶的高度催化效率是因为分子中含有能传递氢原子、电子或其他化学基团的辅基或辅酶
- B. 酶的最适 pH 随反应时间缩短而升高
- C. 有些酶有同工酶,它们的理化性质不同是因为酶活性中心的结构不同
- D. 酶是高效催化剂,一般可用活力表示其含量
- E. 不同的酶催化不同的反应是因为其辅酶不同

55. 糖皮质激素治疗严重感染,下列哪项是无益的

- A. 抗炎作用
- B. 免疫抑制作用
- C. 抗休克作用
- D. 抗细菌内毒素作用
- E. 退热作用

56. 下列各项中,对诊断急性肺水肿最有特征性的是

- A. 气促、发绀、烦躁不安
- B. 肺动脉瓣第二心音亢进
- C. 心尖区可闻及奔马律
- D. 肺部有哮鸣音
- E. 呼吸困难伴咳粉红色泡沫痰

57. 慢性胃溃疡最常见的并发症是

- A. 穿孔
- B. 出血
- C. 幽门狭窄
- D. 癌变
- E. 并发胆囊炎

58. 属于心脑血管疾病的二级预防措施是

- A. 功能康复
- B. 戒烟
- C. 改善饮食结构
- D. 加强体育锻炼
- E. 定期体检

59. 取得执业助理医师执业证书后,具有高等学校医学专科学历的,要参加执业医师资格考试,必须在医疗、预防、保健机构中工作满

- A. 6 个月
- B. 1 年
- C. 2 年
- D. 3 年
- E. 5 年

60. 属于纤维素性炎的是

- A. 小叶性肺炎
- B. 风湿性心外膜炎
- C. 心肌炎
- D. 急性扁桃体炎
- E. 流行性脑脊髓膜炎

61. 某病早期治疗效果良好,若漏诊后病情加重,对此病的诊断试验应特别注重

- A. 提高阴性预测值
- B. 提高阳性预测值
- C. 降低假阳性率
- D. 提高特异度
- E. 提高灵敏度

62. 医学模式转变在医学伦理学方面的重要性是指

- A. 促进医学思维方式的变革
- B. 提高社会防治疾病的地位
- C. 实现了在更高层次上对人的健康的全面关怀
- D. 加速了祖国医学的整理和提高
- E. 促进医师知识结构的现代化



## A2 型选择题(63~116 题)

## 答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

63. 男,60 岁。因发作性心前区疼痛 5 年,加重 1 周入院,近 1 周无明显诱因突然胸痛,持续时间较长,心电图 ST 段压低  $>1\text{ mm}$ ,生化检查:TC  $5.7\text{ mmol/L}$ ,LDL  $2.0\text{ mmol/L}$ ,TG  $3.1\text{ mmol/L}$ ,最合理的诊断是  
A. 冠心病不稳定型心绞痛、高脂血症  
B. 冠心病不稳定型心绞痛、高胆固醇血症  
C. 冠心病不稳定型心绞痛、混合性高脂血症  
D. 冠心病不稳定型心绞痛、高低密度脂蛋白血症  
E. 冠心病不稳定型心绞痛、低高密度脂蛋白血症

64. 男,55 岁。进食后胸骨后烧灼感 3 周,上消化道钡餐造影示:食管中段黏膜紊乱、中断,管壁僵硬,管腔狭窄,长约  $3\text{ cm}$ ,此时首先考虑的诊断是  
A. 食管裂孔疝  
B. 食管囊肿  
C. 食管癌  
D. 食管平滑肌瘤  
E. 食管憩室

65. 某心理治疗师,在公园遇见一位他的患者正与其熟人在一起游玩,正好面对面,但是这位治疗师看到他的患者并未主动与他打招呼,因而他故意装作不认识而未理睬他的患者。因为他知道,心理治疗要注意的一个原则是  
A. 保密原则  
B. 真诚原则  
C. 中立原则  
D. 回避原则

E. 灵活原则

66. 医师胡某与一药厂达成协议后,在开具处方时使用该药厂生产的药品,并接受了该药厂给予的提成。对于胡某的违法行为,有权决定给予行政处分并没收其违法所得的部门是  
A. 药品监督管理部门  
B. 工商行政管理部门  
C. 公安部门  
D. 消费者权益保护协会  
E. 卫生行政部门

67. 男,50 岁。活动后胸闷痛,疑心绞痛,发病时查心电图,可能有哪项改变  
A. 窦性心动过速  
B. ST 段下移  
C. ST 段抬高呈单向曲线  
D. T 波高尖  
E. 左室肥厚

68. 女,55 岁。既往健康,3 周前急性发病,发冷、发热,脓血痰,量多,呼吸困难,发绀,胸痛,体征:右肺叩呈浊音,有水泡音,白细胞  $25 \times 10^9/\text{L}$ ,中性  $92\%$ ,胸片右下肺大片阴影,边缘不清楚,其中有数个空洞和液平面,伴有局限性液气胸。诊断最可能是  
A. 支原体肺炎  
B. 过敏性肺炎  
C. 病毒性肺炎  
D. 肺结核继发感染  
E. 金黄色葡萄球菌肺炎

69. 女孩,4 岁。体检被发现左上腹有鹅蛋

大包块、质硬，随呼吸上下移动，应首先考虑

- A. 肾结核
- B. 肾积水
- C. 脾大
- D. 肾母细胞瘤
- E. 肾结石

70. 男，59岁。上腹隐痛2个月余，伴腹胀不适、食欲差。X线钡餐检查可见胃窦处较大充盈缺损，有腔内壁龛，直径约2.5cm。最可能的诊断是

- A. 浅表性胃炎
- B. 胃息肉
- C. 胃溃疡
- D. 胃癌
- E. 胃淋巴瘤

71. 女，33岁。健康体检时ECG发现偶发房性期前收缩。既往体健。查体：心界不大，心率80次/分，心脏各瓣膜区未闻及杂音。该患者最恰当的处理措施是

- A. 寻找病因，定期随诊
- B. 口服普罗帕酮
- C. 口服慢心律
- D. 口服胺碘酮
- E. 静脉注射利多卡因

72. 女，40岁。心悸、胸闷半年，1个月前晕厥2次，来院时心率50次/分，阿托品治疗后症状未见改善。心电图示三度房室阻滞，交界性逸搏节律。最好选用何种治疗

- A. 异丙肾上腺素静脉滴注
- B. 阿托品静脉滴注
- C. 麻黄碱(麻黄素)
- D. 安装永久起搏器
- E. 安装临时起搏器

73. 男，30岁。右下腹痛、里急后重伴脓血便2年，查体：腹部无异常发现。大便多次细菌培养及阿米巴培养阴性，服抗生素无效。首选的进一步检查方法是

- A. 腹部B超
- B. X线钡灌肠检查
- C. 血CEA检查
- D. 结肠镜检查
- E. 手术探查

74. 女，32岁，工人。劳累后出现低热、干咳1个月，当地诊所为其静脉滴注“左氧氟沙星”1周后热退，未继续治疗。此后常有间断干咳，痰中带血及关节痛。查体：T 37.3℃，消瘦，双肺未闻及干湿啰音。胸部X线片示两上肺斑片状影。最可能的诊断是

- A. 肺炎支原体肺炎
- B. 肺结核
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 真菌性肺炎
- E. 肺炎克雷伯杆菌肺炎

75. 某肝硬化患者，近2个月来右上腹持续性疼痛，发热，乏力。今日突然出现全腹痛1小时。查体：T 38.7℃，BP 9/5 kPa(70/40 mmHg)，P 120次/分，巩膜黄染，腹壁抵抗感，全腹压痛(+)，反跳痛(+)，肝肋下4.0cm，凸凹不平，脾肋下2.0cm，移动性浊音(+)。试验性穿刺抽出血性不凝固液体，最可能的诊断是

- A. 肝硬化门静脉高压
- B. 肝硬化并结核性腹膜炎
- C. 肝硬化并原发性肝癌破裂
- D. 消化性溃疡穿孔
- E. 肝硬化并自发性腹膜炎

76. 男，57岁。咳嗽、咳痰约17年，每于冬春两季发作持续时间3个月。近5~6年来活动后气促伴喘息。查体：双肺叩诊过清音，双肺呼吸音减弱，有散在干啰音，双下肺有细湿啰音。下列哪项诊断是正确的

- A. 慢性肺脓肿
- B. 支气管扩张并肺部感染
- C. 慢性肺源性心脏病
- D. 慢性阻塞性肺疾病
- E. 肺癌

77. 女,63岁。反复冬季上腹痛3年,腹痛多于餐后半小时发作,餐前缓解,病发1周。查体:神志清,无贫血貌。腹部剑突下压痛(+),肝脾未触及。最可能的疾病是

- A. 胃癌
- B. 慢性胃炎
- C. 十二指肠溃疡
- D. 慢性胆囊炎
- E. 胃溃疡

78. 男,70岁。右季肋部胀痛、食欲减退、尿黄5个月。乙肝肝硬化病史7年。查体:肝肋下5cm,表面不平,质硬,压痛。最可能的诊断是

- A. 肝脓肿
- B. 原发性肝癌
- C. 继发性肝癌
- D. 乙肝活动期
- E. 胆囊炎

79. 某幼儿园有200名儿童,近一周内有30名儿童相继出现发热,手心、脚心出疹子,口腔有溃疡等症状,经诊断均为手足口病。提示该病流行强度为

- A. 聚集
- B. 散发
- C. 流行
- D. 大流行
- E. 暴发

80. 男,32岁。体重超过标准体重35%,父母及兄弟姐妹无肥胖史,无用激素类药物史,甲状腺功能正常,这种肥胖最可能的原因是

- A. 摄入蛋白质过多
- B. 运动量小
- C. 摄入总热能大于总热能的消耗
- D. 碳水化合物摄入过多
- E. 脂肪摄入过多

81. 男,39岁。患下肢静脉曲张2年,平卧

后下肢曲张静脉消失后,在腹股沟下方扎橡胶带阻断大隐静脉,然后让患者站立,曲张静脉迅速充盈,考虑诊断为

- A. 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全
- B. 隐-股静脉瓣膜功能不全
- C. 交通支瓣膜功能不全
- D. 下肢深静脉血栓形成
- E. 单纯性大隐静脉曲张

82. 男,60岁。身高167cm,体重76kg,近3个月来出现烦渴,多饮,多尿,体重下降9kg,至医院查空腹血糖为6.8mmol/L,下一步应该进行什么检查或处理

- A. 可能是尿崩症
- B. 可诊断为糖尿病
- C. 应测定尿糖以明确诊断
- D. 应进行OGTT试验
- E. 可诊断为空腹血糖受损

83. 女,31岁。右下肢局部皮肤红肿热痛,中央部缺血、坏死,流出脓液稀薄,粉红色。其致病菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B.  $\beta$ 溶血性链球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 粪球菌

84. 男,62岁。急性心肌梗死突然出现心尖区收缩期杂音3级,呈吹风样,无震颤,心衰明显加重,最可能的原因是

- A. 再发心肌梗死
- B. 梗死后心绞痛
- C. 乳头肌功能失调或断裂
- D. 室壁瘤形成
- E. 心律失常

85. 男,60岁。冬天进入浴室后不久便突然晕倒,其血流动力学的始动因素是

- A. 全身血管收缩
- B. 心输出量减少

- C. 容量血管舒张
- D. 血流速度加速
- E. 血量减少

86. 男,40岁。因上腹部不适及黑便行胃镜检查,示:胃窦部黏膜严重充血,水肿,小弯侧有多处糜烂及黏膜下出血点,病理切片中有中性粒细胞、淋巴细胞浸润,血管破坏及出血,曾因关节痛服用过消炎痛等药物。应诊断何病最为适宜

- A. 急性糜烂出血性胃炎
- B. 胃窦部多发性溃疡
- C. 萎缩性胃炎
- D. 胃泌素瘤
- E. 肥厚性胃炎

87. 男,28岁。因急性阑尾炎穿孔行阑尾切除术,术后4天切口红肿,有脓性分泌物,将缝线拆除后引出30ml脓液,10天后再次缝合而愈合。该患者切口愈合类型应记为

- A. II/乙
- B. II/丙
- C. III/甲
- D. III/乙
- E. III/丙

88. 男,30岁。长期饮酒,突然呕大量咖啡色胃内容物。查体:脉细速,收缩压80mmHg,面色苍白,四肢湿冷。急救中应首先

- A. 插入三腔双囊管
- B. 静脉点滴止血药物
- C. 输血
- D. 内镜止血
- E. 胃肠减压

89. 男,45岁。持续胸痛伴发热1天。心电图上除aVR导联外,其余导联ST段均呈弓背向下型抬高。该患者最可能的诊断为

- A. 主动脉夹层
- B. 自发性气胸
- C. 急性心包炎

- D. 急性心肌梗死
- E. 变异型心绞痛

90. 男,20岁。经常感冒,最近有心悸,不能平卧,下肢水肿。查体:颈静脉稍充盈,心界向两侧明显扩大,心尖区第一心音减低,有病理性第三心音,无杂音,诊断为

- A. 急性风湿热
- B. 冠心病心衰
- C. 结核性心包炎心包积液
- D. 病毒性心肌炎
- E. 梗阻性肥厚型心肌病

91. 女,53岁。左乳头脱屑、结痂半年。去除左乳头表面痂皮,刮片细胞学检查发现有派杰(Paget)细胞。最可能诊断是

- A. 乳腺粉刺癌
- B. 乳腺黏液癌
- C. 浸润性导管癌
- D. 湿疹样乳腺癌
- E. 浸润性小叶癌

92. 男,33岁。有溃疡性结肠炎病史,4天前出现脓血便,未行系统治疗。1天前又出现高热、明显腹胀。查体:腹膨隆,明显压痛和反跳痛,肠鸣音减弱。X线腹部平片可见结肠扩张,结肠袋形消失。此患者最可能出现的并发症是

- A. 结核性腹膜炎
- B. 自发性腹膜炎
- C. 中毒性巨结肠
- D. 肠穿孔
- E. 结肠狭窄

93. 男,22岁。半月前感冒,咽部肿痛,治疗后好转。但发现有血尿,镜检:血尿(+++),蛋白(±)。肾活检荧光检测:IgA和C3大量的块状沉积,患者可能诊断为

- A. IgA肾病
- B. 系膜增生性肾小球
- C. 膜增生性肾小球肾炎

D. 膜性肾病

E. 微小病变性肾小球病

94. 为研究职业接触放射性物质与骨肿瘤发生的关系,某人选取 1 000 名接触放射性物质的女职工和 1 000 名电话员作为研究对象,观察 1980~2010 年间的骨肿瘤发生率,结果接触放射性物质的女工中有 20 例骨肿瘤患者,而电话员中仅有 4 例,这种研究属于

A. 横断面研究

B. 实验研究

C. 队列研究

D. 临床研究

E. 病例对照研究

95. 女,28 岁。Graves 病患者,应用国产丙基硫氧嘧啶+普萘洛尔治疗 2 周,病人出现低热,乏力加重、咽痛,WBC  $2.7 \times 10^9/L$ ,粒细胞  $<1.5 \times 10^9/L$ ,下述哪种处置最为合适

A. 继续现有治疗

B. 改用进口丙基硫氧嘧啶

C. 维持现有治疗+升白细胞药

D. 改用放射性核素治疗

E. 停抗甲状腺药,升白药物及预防治疗感染

96. 某幼儿园大班 11 名 6 岁儿童接受百日咳疫苗注射后,做血清抗体测定,其抗体滴度分别为:1:20,1:20,1:20,1:40,1:40,1:80,1:80,1:160,1:160,1:320,1:640。描述抗体滴度集中趋势的指标应选用

A. 标准差

B. 极差

C. 算术平均数

D. 几何平均数

E. 四分位间距

97. 男,60 岁。冠心病患者,心衰服地高辛、氢氯噻嗪 1 周后症状加重。心电图示有多

发性室性期前收缩。下列处理哪项错误

A. 吸氧

B. 补钾

C. 利多卡因

D. 毛花苷 C

E. 停氢氯噻嗪改用螺内酯

98. 男,62 岁。反复下腹疼痛 6 个月,伴大便稀烂,3~4 次/日,无黏液及脓血或与便秘交替,近半年体重下降约 4 kg,间歇性低热,查体:贫血貌,双肺未见异常,心率 96 次/分,未闻及病理性杂音,全腹软,右下腹轻度压痛,可疑包块,直肠指检阴性。为明确诊断,进一步做哪项检查最有帮助

A. 钡剂灌肠检查

B. 胃肠道钡餐检查

C. 腹部 CT

D. 结肠镜检查

E. 腹部 B 超

99. 男,63 岁。既往有高血压、冠心病及胃溃疡,1 天前突然剧烈上腹部刺痛、濒死感伴发热。白细胞增多,心电图 II、III、aVF、ST 段抬高,有病理性 Q 波,诊断为

A. 心绞痛

B. 急性心包炎

C. 急性肺动脉栓塞

D. 急性心肌梗死

E. 急腹症

100. 男,65 岁。近 2 年来活动时气喘。查体:BP 130/50 mmHg,胸骨左肋第 3 肋间可闻及舒张早期叹气样杂音。与上述心脏病变相关的体征为

A. Ewart 征

B. 心尖部开瓣音

C. Austin-Flint 杂音

D. Graham-Steel 杂音

E. 奇脉

101. 男孩,16 岁。因阑尾炎穿孔术后持续

发热半月。右上腹及右肋缘下疼痛,并向右肩部放射,摄片示右侧胸腔积液。考虑

- A. 腹腔感染
- B. 右膈下脓肿
- C. 右肺部感染
- D. 阑尾残株炎
- E. 肠间脓肿

102. 男,52岁。幼年有麻疹病史,常伴有脓痰和少量咯血。曾经支气管造影检查证实右下叶后基底段及内侧段支气管扩张。近4~5年来症状加重,伴气急。1个月前肺功能测定FEV<sub>1</sub>占肺活量38%。近2天来咯血不止,24小时总量超过600ml。治疗措施选择下列哪一项**不合适**

- A. 预防窒息
- B. 支气管镜局部用药或球囊压迫止血
- C. 选择性支气管动脉栓塞
- D. 手术治疗
- E. 氧疗

103. 某医师在为患者施行右侧乳房肿瘤摘除术时,发现左侧乳房也有肿瘤,当即进行活检,确诊为乳腺病。医师判断将来可能癌变,未征求患者意见,同时切除了左侧乳房。医师的这种做法,违背了病人权利的哪一点

- A. 平等的医疗权
- B. 保密权
- C. 隐私权
- D. 知情同意权
- E. 获得信息权

104. 男,57岁,工人。吸烟40年。慢性咳嗽,咳痰伴喘息30年,近10年上楼、快走时均感呼吸困难,休息可缓解。查体:桶状胸,叩诊呈过清音,语颤减弱,双肺呼吸音减弱。下列哪一项检查对判定肺功能的损害意义最大

- A. 潮气量
- B. 肺活量
- C. 最大通气量

- D. FEV<sub>1</sub>占预计值百分比
- E. 每分钟静息通气量

105. 男,53岁。咳嗽、痰中带血2周。胸片及CT示左下肺团块影,未见纵隔淋巴结及远处转移。纤维支气管镜黏膜活检示:鳞状细胞癌。首选治疗方案应该是

- A. 化疗
- B. 放疗
- C. 靶向治疗
- D. 介入治疗
- E. 左肺下叶切除术

106. 女,20岁。乳房肿块,边缘清晰,活动度大,生长缓慢,最常见的是

- A. 乳管内乳头状瘤
- B. 乳腺结核
- C. 乳腺炎性肿块
- D. 乳腺纤维腺瘤
- E. 乳腺囊性增生病

107. 给一术后病人输血10分钟,病人诉头痛、恶心、寒战、高热、呼吸困难、腰背部剧烈疼痛、心前区压迫感。血浆游离血红蛋白30mg/dl,应诊断为

- A. 溶血反应
- B. 细菌污染反应
- C. 过敏反应
- D. 免疫反应
- E. 发热反应

108. 女,40岁。发现室间隔缺损38年。3个月前拔牙后持续发热至今。查体:体温37.6℃,睑结膜苍白,有瘀点,胸骨左缘第3肋间可闻及全收缩期杂音,脾肋下可触及。最有助于确诊的检查是

- A. 腹部B超
- B. 血常规
- C. 血培养
- D. 血清铁
- E. 尿蛋白

109. 为探讨血清胆固醇水平对冠心病的影响,根据血清胆固醇水平将 1 000 名 35 岁以上男性人群分为两组:一组胆固醇水平高于临界值,为暴露组,共 500 人;其余 500 人血清胆固醇在正常值范围内,作为对照组。随访 5 年,暴露组有 45 人发病,对照组有 10 人发病。该研究中,胆固醇水平高于临界值者患冠心病的相对危险度是

- A. 2.0
- B. 45.0
- C. 4.5
- D. 10.0
- E. 1.0

110. 女,68 岁。原有肺源性心脏病病史。受凉后发热伴咳嗽痰,发绀加重,次日神志模糊,嗜睡,血压 90/67.5 mmHg,无病理反射。患者最可能并发

- A. 脑血管意外
- B. 感染性休克
- C. 肺性脑病
- D. 电解质紊乱
- E. 弥散性血管内凝血

111. 男,50 岁。既往体健,查体时发现肝在右肋下 3 cm,质硬、压痛、脾可触及、ALT 正常、肝穿刺病理有假小叶形成,应诊断为

- A. 慢性活动性肝炎
- B. 慢性持续性肝炎
- C. 代偿期肝硬化
- D. 肝硬化失代偿期
- E. 急性肝炎

112. 男,78 岁。高血压 10 年,平时血压多为 150~190/70~85 mmHg,有关这类患者的临床特点,哪项不正确

- A. 脉压波动较大
- B. 易有直立性低血压
- C. 为收缩期高血压
- D. 脉压小
- E. 此类患者应使用主要降低收缩压的药物

113. 患者王某为了戒除烟瘾,在每次吸烟后,应用某种引起恶心、呕吐的药物,反复几次,就再不想吸烟了。其采用的这种戒烟方法是

- A. 系统脱敏法
- B. 条件操作法
- C. 自我调整疗法
- D. 厌恶疗法
- E. 暴露疗法

114. 女,50 岁。既往无高血压及糖尿病病史,间断凌晨 4 时左右发作胸痛,每次 20~30 min,动态心电图检查示发作时心电图 II、III、aVF 导联 ST 段抬高约 0.2 mV,发作后心电图很快恢复正常,有关该患者治疗最合理的是

- A. 不需长期服药,发作时含化硝酸甘油治疗
- B. 口服  $\beta$  受体阻断药治疗
- C. 口服长效钙拮抗剂治疗
- D. 口服 ACEI 治疗
- E. 考虑溶栓治疗

115. 某患者因疾病的治疗需要欲接受肠切除术,向医生了解小肠的生理功能及手术的相关知识。医师解释说明小肠作为吸收主要部位的原因中,不包括

- A. 小肠绒毛内富含毛细血管
- B. 小肠含有丰厚的平滑肌
- C. 食物在小肠内停留时间很长
- D. 小肠黏膜表面积巨大
- E. 食物在小肠内已被分解为小分子物质

116. 女孩,12 岁。近几个月常感觉疲倦,头昏乏力,心悸。学习注意力不集中,记忆力减退。实验室检查:血红蛋白 90 g/L,原卟啉大于 500  $\mu\text{g/L}$ ,该患者最可能的原因是

- A. 锌缺乏
- B. 铁缺乏
- C. 钙缺乏
- D. 碘缺乏
- E. 维生素 D 缺乏