

驗方新編卷五目錄

肚腹

腹痛辨症

陰症腹痛

寒症腹痛

肚腹畏寒

熱症腹痛

虫疾腹痛

大人小兒腹中疳疾虫疾作痛及男婦痞塊癥瘕各
項肚腹脹痛

食滯腹痛

身受寒熱心腹疼痛上下關格不通大便閉塞小便
短澁渾身紉緊手足腰膝彊硬不省人事

忽然肚脹如鼓

腹中緊脹

肚腹麻木

忽然肚黑

肚腹脹大亮如水晶

臍眼出膿

臍中出水

臍眼出血

肚腹堅硬臍眼出虫

肚腹左右生癰

肚臍生癰

少腹疽

小腸疽

臍下二三寸關元丹田二穴冷結小腹有形作痛

腸胃中癢不可忍

增補疝古方

痞疾

治痞諸方

腹中堅如鐵石痛如刀割

腹中堅如鐵石臍內出水變作虫行之狀繞身作咬

痛癢難忍掃撥不盡

婦人血蠱

髮癥

好飲清油者是喉中如有虫上下亦是

米瘕

好食生求者是

肉瘕

常喜食肉者是

虱瘕

蛇瘕

龜鼈瘕

蛟龍瘕

腹脹面黃

蟲疾

寸白虫疾

蚘虫上出口鼻

鼓脹

附浮腫

鼓脹辨症

治水鼓法

水鼓小便不通

日滿開鹽法

治氣鼓法

治血鼓法

各種鼓脹

食物積滯腹脹如鼓

肚腹脹滿飲食如常

十種水腫

通身浮腫

病後浮腫

脇部

兩肋之下爲脇愚人多有以肩甲下爲脇者不可不知

左脇有聲作疼嘔水

左脇鬱氣疼痛

怒氣動肝寒熱旬日左脇凝聚作痛難以舒轉

左脇作痛

右脇有形攻心作痛嘔吐清涎週身寒凜痛止則無形跡

右脇脹痛不食

肝燥脇痛

兩脇不時作痛

脇痛連腰脊不能轉側

脇痛腸出臭穢

脇下生瘡

脇下漏瘡形如牛眼

兩脇脹滿

背部

發背治法

背癰諸方

背熱如火

腰部

腎虛腰痛

腎虛腰痛脚軟

閃跌毆打腰痛

脾濕腰痛

腰腿風濕冷痛

男婦腰痛如刺面腫而黑氣血虛憊髮落齒枯唾涕

痰涎腰脊痛不能行

各腫腰痛

纏腰丹

腰痛牽心氣絕欲死

驗方新編卷之五

肚腹

腹痛辨症

腹痛各症應與傷寒門參看

臍眼上痛者食痛也臍眼下痛熱手按之不痛或其痛多急或痛如刀割或吐或瀉或痛甚而覺有冷氣皆寒痛也手按之更痛冷物熨之不痛或自下而痛上或時痛時止腹滿堅結皆熱痛也時發時止痛在一處而不移者或有塊硬起者虫痛痞痛也又聞煎炒食物香氣則痛痛時口吐清水或口渴者亦虫痛也

陰症腹痛

男女交合之後或外受風寒或內食生冷等物以致肚腹

疼痛腎囊

俗謂卵胞

內縮亦有不縮者手足灣屈紫黑重則牙

緊氣絕謂之陰症傷寒治法見卷十四傷寒門

寒症腹痛

參看陰症傷寒各方

或炒鹽熨之或炒葱薑熨之或用熱灰熨之或用滾水一壺隔布熨之均止痛妙法也

又方 或飲胡椒湯加糖沖入不可加鹽或飲姜湯均妙

又方 龍眼連壳燒存性研末兌酒服屢試屢驗

又方

白芍

叁錢

甘草

肉桂

各壹錢

水煎服此張景仲神

方也

肚腹畏寒

肚腹容易受寒動輒疼痛不已甚至寒中三陰命在須臾遲則難救此下部虛損真陽不足命門火弱故也非大加

腹畏寒上貼附桂膏又加厚棉腰圍數層遇寒仍不濟事

一老醫以製附子

五錢乾薑壹錢

上肉桂

五分研末兌服無水

煎連服十餘劑雖天寒肚腹亦不畏冷再加補中補氣等

藥調理全愈附子走而不守得乾薑則守而不走如不信

單用附子一味熬濃汁滴紙上水必散開加乾薑熬之滴

紙上則水不散矣

用炮薑則不效

此秘傳也

又方

九製硫磺

丸

見內外備用諸方門

服之神效

熱症腹痛

服六一散最妙或用銅鐵冷物熨之或服痧藥亦可若痛甚者或嘔或瀉者照卷十五霍亂痧症各方治之又上吐下瀉而腹痛者如作霍亂痧症治之不效須照噎隔反胃門內上吐下瀉方治之

虫疾腹痛

虫痛如有塊硬起者用手在硬處久久揉擦揉至一日其虫卽死從大便而出或查痞疾門各方治之

大人小兒腹中疳疾虫疾作痛及男婦痞塊癥瘕各
項肚痛脹痛

方見痞疾門

食滯腹痛

方見飲食滯積門

身受寒熱心腹疼痛上下關格不通大便閉塞小便短澀渾身綳緊手足腰膝疆硬不省人事

照卷十一內外備用諸方門土熨法治之最妙

忽然肚脹如鼓

此症肚腹猝脹漸大如鼓此寒極也遲則不救急用武營烏鎗藥二錢爆竹藥功緩不效以頂好燒酒煎滾冲服得吐瀉卽生非陡然脹大者不可誤用

腹中緊脹

腹硬如石痛如刀割見後痞疾門

白糖煮酒飲數次即愈

肚腹麻木

此風襲也多煮葱頭食之並用葱薑炒熱熨之自愈

忽然肚黑

凡肚皮忽然青黑色此乃血氣失養風寒失以乘之所變怪形真危惡之敗症也若不速治難救急用大青

研細末

每服一錢五分以好酒調下黑退即愈否則終危此起死回生之方也 大青多生溪溝旁葉似火蔴葉藥店多假生草藥店有之又有小青葉細性味相同功力稍緩

又方 鉛粉和鹽炒焦敷之亦效

肚腹脹大亮如水晶

柚子皮燒灰冲服神效柚子兩廣最多他省頗少以橘紅代之亦可

又方 取癩蝦蟆六隻將四足紮住以蝦蟆肚皮在人肚腹光亮之處輕輕摩擦幾次再用一癩蝦蟆照前摩擦用至六隻卽愈但蝦蟆眉內有蟾酥須防其迸出射人傷眼宜用紬帕遮住病人兩眼

蝦蟆用過之後卽放水中使吐毒氣以救其命至要至要

臍眼出膿

此症先流臭水久則出膿不腫不疼多年不愈用葦菜葉

扁柏葉二味共搥取汁一酒杯加童便一茶杯蒸熱服
外用蘆甘石要能浮水者用好醋泡一晝夜瓦上焙乾研末
敷如不見效當請明醫治之不可忽也

臍中出水

龍骨醋泡焙枯研敷或用赤石脂研末敷均效或照上
臍中出膿方治之更妙

臍眼出血

方見諸血門

肚腹堅硬臍眼出虫

方見痞疾門

肚腹左右生癰

卽腸癰也須照腸癰方治之

肚臍生癰

肚臍腫大如瓜臍眼高突者是紅赤者照癰毒各方治之不紅不熱者照陰疽各方治之。

少腹癰

生臍下一寸五分氣海穴或生二寸關元穴或生三寸丹田穴皆由七情火鬱而生也分別紅白陰陽治之

小腸疽

生小腹內按之如掌堅硬而熱微痛小便多出汗畏寒皮

色如常或現微腫脈緊實而有力者是也服犀黃丸見陰直門

即愈此林屋山人秘法也

臍下三三寸關元丹田二穴冷結膀胱小腹有形滿

痛手足厥冷

此厥陰傷寒重症宜用仲景當歸四逆湯治之桂枝

當歸各貳錢芍藥參錢細辛叁分通草壹錢伍分甘草捌分大棗

貳枚水煎服神效其人有久寒者加吳茱肆分生薑壹錢

酒一小杯兌服

腸胃中瘞不可忍

此火鬱結不散所致用柴胡梔子炒花粉各叁錢白芍