

傅氏眼科審視瑤函方目

卷之二目錄

淫熱反尅之病

芍藥清肝散

通氣利中丸

黃連天花粉丸

黃連爐甘石散

龍腦黃連膏

啗鼻碧雲散

麤仁春雪膏

風熱不制之病

羌活勝風湯

杏仁龍膽草泡散

七情五賊勞役饑飽之病

柴明復生湯

黃連羊肝丸

當歸養榮湯

助陽活血湯 決明益陰丸 加減地黃丸

血爲邪盛凝而不行之病

川芎行經散 消凝大丸子

氣爲怒傷散而不聚之病

千金磁硃丸 滋陰地黃丸 石斛夜光丸

滋陰腎氣丸

血氣不分混而遂結之病

防風散結湯

熱積必潰之病

竹葉瀉經湯 蜜劑解毒丸

陽衰不能抗陰之病

決明夜靈散

陰弱不配陽之病

沖和養胃湯

東垣瀉熱黃連湯

益氣聰明湯

心火乘金水衰反制之病

還陰救苦湯

菊花決明散

神驗錦鳩丸

萬應蠟花散

內急外弛之病

黃芪防風飲子

無比蔓荊子湯

奇經客邪之症

撥雲退翳丸

梔子勝

奇散

磨障靈光膏

消翳復明膏

爲物所傷之病

除風益損湯

傷寒愈後之病

人參補胃湯

強陽搏實陰之病

抑陽酒連散

亡血過多之病

芎歸補血湯

癰疹餘毒之病

羚羊角散

消毒化癰湯

審視瑣函

卷之二 目錄

三

善所

深府爲聖之病

扶苓瀉濕湯

升麻龍膽草飲子

傳氏眼科審視瑤函卷之二

秣陵傅仁宇允科纂輯

廣陵林長生聲震較補

增張文凱廷獻叅閱

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公猷 掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁 顓 全次

目病有三因

陳無擇曰喜怒不節憂思兼併以致臟腑氣不平鬱而生

涎隨氣上厥乘腦之虛浸淫目系陰注於目輕則昏澀

重則障翳眵淚努肉白膜遮睛皆內如數冒風寒不避

暑濕邪中於項乘虛循系以入於腦侵於目而生目病

者。皆外若嗜慾無節。飲食不時。頻食五辛。過啖炙燂。馳

心騁田獵。冒涉烟塵。勞動外情。皆喪明之具。此內外因也

徐彥純曰。人之眼目。備臟腑五行相資。而神明故能視。若

內障。乃瞳神黑小。神光昏昧也。外障。則有翳膜可見矣。

凡見內障。有因於痰火氣鬱。血熱偏陽。偏陰虛脫。榮衛

種種不同。外障有起於內眥。睛上。睛下。睛中。視其翳色

從何經來。惟宜分治。蓋目之為病。肝熱則昏暗。心熱則

煩痛。風濕則癢。血少則澁。腎虛則睛損。甚則陷突。微則

翳暗矣。

診視

經曰左寸脉洪數心火也左關脉弦而洪肝木挾相火

脉微弱乃腎水不升也右寸關脉俱弦洪乃肝木挾相火

勝之金而戕已右尺脉洪數為相火邪火上炎挾肝木

所勝之士也右尺脉洪數為邪而燥目也按六脉

浮緊有力者為寒沉數有力者為熱微細而弱者為虛

洪大而滑者為實夫五臟常欲相順相生如心見緩肝

見洪肺見沉脾見瀦腎見弦此五臟相合相生之理稟

太和之氣其疾何以生焉是為疾者五臟必相尅相反

如心見沉細肝見短瀦腎見遲緩肺見洪大脾見弦長

此五臟相形相尅遞相互變之機其疾再無不作者萬

物生尅一定之理豈止於病目而言哉經謂五臟不和

則六腑不通六腑不通則九竅疲癯九竅疲癯則氣血

壅滯亦令人憎寒發熱惡風自江胸膈痞滿有類傷寒

似瘧但日紅赤而頭不痛項不强身發寒不致戰慄發

熱不致悶亂為異而為外障或頭眩目昏頭痛而目不

紅為內障由人於六淫七情飲食色慾過度運動失宜

豈能一。一中節而無所乖亂臟腑關竅不得宜通而痰

內漬也予特叙痰飲之脉皆弦微沉滑或云左右關脉

審

見

名

所

卷之二

二

匯原

大者或伏而大者皆痰也。眼皮及眼或如灰烟黑者亦痰也。然治法痰因火動降火爲先。火因氣逆順氣爲要。亢則害承廼制者。寒極則生熱熱極則生寒。木極而似金。火極而似水。土極而似木。金極而似火。水極而似土也。左手寸口心與小腸之脉所出。君火也。左手關部肝與膽之脉所出。風木也。左手尺部腎與膀胱之脉所出。寒水也。右手寸口肺與大腸之脉所出。燥金也。右手關部脾與胃之脉所出。濕土也。右手尺部命門與三焦之脉所出。相火也。

六脉者浮沉遲數滑濇也。浮者爲陽在表。爲陽爲虛也。沉者爲陰在裏。爲濕爲實也。沉遲者爲陰寒在臟也。浮數者爲陽熱在腑也。滑者血多氣盛也。濇者氣滯血枯也。

八要者。表裏虛實寒熱邪正也。表者病不在裏也。裏者病不在表也。虛者五虛也。脈細皮寒氣少泄利飲食不入也。漿粥入胃瀉止則生。實者五實也。脈盛皮熱腹脹前後不通。脅悶也。大小便通利而得汗者生。寒者臟腑積寒也。熱者臟腑積熱也。邪者外邪相干也。正者臟腑自病也。

內經謂曰病。赤脈從上下者太陽病。從下上者陽明病。從外走內者少陽病。從內走外者少陰病。太陽病宜溫之。散之。陽明病宜下之。寒之。少陽病宜和之。少陰病宜清之。

保命集云。眼之爲病。在腑則爲表。當除風散熱。在臟則爲裏。當養血安神。暴發者爲表。易治。久病者爲裏。難療。按此論表裏之不同明矣。用以治病。如鼓應桴也。

靈樞顛狂篇云。目眥外決於面者爲銳眥。在內近鼻者爲內眥。上爲外眥。下爲內眥。

凡看目疾者。男子多患左目。女子多患右目。此陰陽氣血不同故也。或有左右無常者。乃邪熱攻迫故也。如男先傷左目。而右目屢發。定不可保。女先傷右目。而左目屢發。亦不能救。必須觀人老少壯弱爲主。少而壯者易治。老而弱者難治。易治者用藥溫和。難治者用藥滋補。

症用藥不可執。一目症雖有多端。然看者先將難易。定用藥。不致有悞。如瞳神凸凹者。不治。青綠白色者。不治。純黑者。不治。睛少光彩者。不治。此老人血衰之症。若翳障如半月之狀。俱難治之。若睛圓不損。不論星多少。翳厚薄。悉皆治之。翳怕光滑。星怕在瞳神。總宜翳膜輕薄。星點細小。若遇翳障未盡。切不可用刀割目。得血而能視。刀割則傷血。亦不可用火灸翳膜。生自肝火。又以火攻之。是以火濟火。豈是良法。惟服藥於先。必兼點藥。則病漸退。根除而不復發也。

按目病有外感。有內傷。外感者。風寒暑濕燥火。此標症也。

患者致目暴發疼痛白睛紅腫眵淚赤爛其勢雖急易治內傷者喜怒憂思悲恐驚此七情也患者致黑珠下陷或起蟹睛翳膜障朦或白珠不紅瞳神大小視物昏花內障不現其勢雖緩難治又有不內不外而飲食不節饑飽勞役所致當理脾胃爲主目病雖多不外風熱虛實之候治亦不離散清補瀉之法然補不可過用參朮以助其火惟用清和滋潤之類瀉不可過用硝黃龍膽以凝其血惟用發散消滯之類藥用當則目自愈今人治目往往非大補則驟用大寒多致受傷治目毋投寒劑固是要法又當省其致病之源以治之如貪酒者

徐徐戒其酒好色者緩緩戒其色暴怒者與言戒其怒
怒不聽則難療也然心生血脾統血肝藏血而得熱則
行得寒則凝凝則生翳生膜目斯患矣不可不慎凡病
目後宜滋腎水何也目以肝爲主肝開竅於目目得血
而能視若滋腎水則水能生木木能生火火能生土土
能生金金能生水生生不已其益無窮若腎水虧耗則
水不能生木木不能生火火不能生土土不能生金金
不能生水肝血虧而火妄熾其害可勝言哉

目不專重診脉說

夫曰有是病卽有是脉者此亦大槩言之其微渺未必皆

可恃乎脉也如目病必視其目爲內障爲外障內障有內障之症外障有外障之症必辯其爲何症所中所傷之淺深果在何輪何廓辯之明而後治之當今閨閣處子暨夫貴介之族但舒手於帷幔之外診其脉卽欲治其病且貴其用藥當而効之速不知卽方脉之專重乎脉者尤望聞問居其先而切脉居於後蓋切而知之僅謂之巧耳况症之重者關乎性命而惟恃巧以中之何輕視乎性命耶必精詳審辯而後治之可也重性命者當必以是言爲然也矧目爲五官之最要者哉假令一瞽目隱身於帷幔之中舒其手於帷幔之外其六脈未嘗不與有目者相同也切