

外
科
卷五

青胡桃皮

參枚

硫黃

或錢半
細研

右件爛搗入醬少許更研令勻先用泔清洗之然後塗於患處

又方 烏賊魚骨用三年陳醋研磨如糊先用生布擦令肉赤即塗其上

又方 五月收赤脚蜈蚣燒灰醋調塗之

又方 用自死蟻娘爲末先用布揩擦患處令熱敷之一宿卽瘥

烏白癩

夫癩疾皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變黑或淫

淫苦痒如蟲行或眼前見物如垂絲言語無定心常驚恐皮肉

之中或如桃李癰瘍赤黑手足頑麻針刺不覺痛脚下痛頑不得踏地凡食之時開口出氣而鳴語亦如是身體生瘡痛痒而時如蟲行或兩肘如繩縛此名烏癩又有黑癩凡二癩之症大同小異故不別錄也

謂皮丸 治烏癩

謂皮

蚺蛇頭

各燒
存性

魁蛤

各壹
枚

蜈蚣

壹條
半

蠶蟲

去頭
足翅

簪糟

焙乾

紅娘子

去頭
足翅

水蛭

糯米
炒熟

蟹螯

去頭
足翅

蜘蛛

焙各
參全

鯫鯉甲

參
片

龍骨

研

川椒

炒

川大黃

黃連

麝香

研

桂心

水銀

各半
分量

石膏

研細

川芒硝

各壹
兩

白礬

枯土

滑石

研水飛

甘遂

與胡麻同
炒以胡麻

研末

兩

附子

貳枚炮
去皮曠

巴豆

決皮膜
心油

雷丸

各拾
伍粒

右爲細末入研令勻煉蜜和丸如小豆大每服壹丸溫水送下空心臨卧各一服未覺每服加壹丸如小便莖中痛卽有蟲下皆死也細觀形狀痛多卽減一丸痛少則加至貳丸以瘥爲度

右方乃攻毒取蟲之峻劑非灼知臟腑有蟲毒及精神可勝攻下者不可輕服仍參薛氏治癘風變症類症治法用之

見雜

病準繩

第五

續治烏癩皮膚變黑生瘡腫痛殺蟲雄黃藥塗之

雄黃 水飛

金星石

合劑來日銀星石

紫石英

白石英

太陰玄精石

馬牙硝

硫磺

白礬

各壹

烏白癩

卷

兩

益出

右爲細末入蕤合中用白土泥固濟候乾用炭火伍斤煅通
亦卽止以土蓋罨藥合候來日取出於濕地上紙襯益蓋出
火毒三伏時再研如粉取楓樹膠煮和調每日用塗之以差
卽止

硫黃散

治烏癩瘡久不瘥

硫黃

雄黃

雌黃

金星石

銀星石

握雪石

水浮石

寒水石

蜜陀僧

馬牙硝

不灰木

槐白皮

蟬蛻

亂髮灰

蜂窠灰

蝎牛子

牡蠣

麝香

已上各

壹錢

白礬

伍錢

丹用白土泥半斤以半兩以半兩垂設并如尼另入鹽粉或錢半用生

清油肆兩調勺每於患處遍塗之立効

大黑神膏 治烏癩及諸癩遍身生瘡及多膿血

川烏頭

苦蕎

川升麻

防已

去皮

黃檗

藜蘆

黃連

白礬

細研

雄黃

雌黃

胡粉

各半
兩研

杏仁

各拾
肆粒

松脂

亂髮

各如雞
子大

右剉如大豆粒用豬脂貳升并藥同煎以亂髮消盡爲度綿
濾去粗後入雄黃雌黃胡粉白礬攪勻收入甕器中每用塗

之藥勿令入口眼

治烏癩殺蟲

雌黃

不拘
多少

右研如粉用醋和雞子黃攪勻塗於瘡上乾卽

再塗

蜂房釀酒 治烏癩

露蜂房伍兩 苦參肆丘

右件細剉用水參斗煮取壹斗貳升去粗浸麴肆斤半煑糯
米參斗入麴蘖搜拌如常醞法酒熟壓去糟每溫一小盞食
前服之

夫白癩病者其語聲嘶啞目視不明四肢頑疼身體大熱
心中懊惱手腳緩縱背膂拘急內如針刺或生癰疹而起往往
正白在皮肉裏鼻有息肉自生白珠當於瞳子視無所見名白
癩也

白虎丸散 治癩病語聲嘶啞者

白花蛇

酒浸

晚蠶蛾

足翅去頭

天麻

羌活

防風

各去蘆

蔓荆子

威靈仙

槐子

白鮮皮

枳殼

去穰炒各一兩

甘草

炙半兩

鯫鯉甲丸

治白癩

鯫鯉甲

參片

蝮蛇半條

魁蛤半枚

生用

水蛭

生用

蜘蛛生用

蟹螯

去頭足翅

䗪蟲

去足翅各一兩

鱗螬

生用參箇

蜈蚣壹條

龍骨

半兩研

石膏

壹兩細研水飛

白礬

枯桂心

滑石

川芒硝

硝石

水銀

與硝石點楮汁

研令
星盡

川大黃

黃連

桂心

兩各半

附子

炮去皮臍取一枚

雷丸

拾枚

巴豆

拾貳粒去皮心膜油

川椒

貳錢半

桂心

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服貳丸空心臨卧溫水送下日進二服

天麻煎 治白癩

天麻 天蓼木

右件剉如大豆粒用水叁斗入銀鍋或石鍋中熬至壹斗貳升濾去粗却於慢火上熬如稀餳每服半匙食前用荆芥薄荷酒調下

又方 治白癩

馬鞭草不以多少爲細末每服壹錢食前用荆芥薄荷湯調下

苦參酒 治周身白點如脂如榆莢搔之白屑落或痒或痛色白斬展世呼白蘞

苦參 伍斤

露蜂房 伍兩

蝦皮 壹具

右剉碎用水參斗煮取壹斗去粗浸細廻伍斤炊黍米參半
拌如常醞法酒熟壓去糟每於食前溫飲一小盞

落治白癩

蟹螯 拾肆枚
大蠍蛇 豈條乾者
首尾全

右件用酒柒升入甕瓶中用糠火煨酒及壹升濾去粗收甕
合中每用薄塗於白癩上

癰疹

孫真人論曰素問云風邪客於肌中則肌虛真氣發散又被寒
搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則爲痺也所以有風痺
瘡痺皆由於此又有赤疹者忽然起如蚊蟲咬煩痒極者重抓

疹起瘡之逐手起又有自疹者發冷亦有赤疹蓋赤疹者發熱

夫風癰疹者由邪氣客於皮膚復遇風寒相搏則爲癰疹若

赤疹者由冷濕搏於肌中風熱結成赤疹也遇熱則極若冷則

瘡也白疹者由風氣搏於肌中風冷結爲白疹也遇冷則極或

風中亦極得晴明則瘡着厚煖衣亦瘡也其脈浮而洪浮則爲

風洪則爲氣風氣相搏則成癰疹致身體爲痒也 丹溪云疹

屬熱與瘡在肺清肺火降瘡或解散出汗亦有可下者 痒在

表者消毒飲子防風通聖散在裏者大柴胡湯四順飲子虛者

補中益氣湯皆同傷寒施治也 朱院君三十餘久患癰疹身

痒而紫色可與防風通聖散加牛蒡子爲極細末每貳錢水盞

半入蠶汁令陳煎食前熱飲之

或問斑疹何如曰方論皆謂緣肌中有濕若涼熱之氣所折熱
結不散則成赤疹若因風邪所折風熱相搏則成白疹赤疹得
熱則劇得冷則減蓋熱氣鬱於內故惡熱宜冷白疹得陰雨則
甚得晴則消蓋熱氣散釋於外故惡冷宜熱熱搏於血分其邪
因并發於表則赤若風濕搏於氣分則氣液不行因邪并發於
表則白夫如是然後與治法相應邪熱者故惡熱而喜涼邪濕
者故惡雨而喜晴矣方論中又有風瘡癧者卽內經所謂汗出
見濕乃生瘻瘍又曰勞汗當風寒薄爲鬱乃瘻瘍卽癰疹屬也
皰瘡癰類也此皆謂外邪鬱肌肉玄府之熱者矣然則與內經
言少陽少陰而君相二火客熱之勝爲丹疹外發者方論中則
無有也故人氣君相二火鬱發而變者宜乎未之及耳若此條

是人氣所變之一者也故二火鬱發出血氣之表與外邪所鬱無異更有小兒發痘瘡之外必有出疹二次亦是君相二火發出未盡之胎毒也

初虞世治皮膚風熱遍身生癰疹牛蒡子浮萍等分以薄荷湯調下貳錢日二服

衍義有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連腦脛臍腹及隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末壹兩皂角貳兩水壹升揉瀝取汁銀石器熬成膏和苦參爲丸如桐子大食後溫水服貳拾丸次日便愈

千金方治法白疹宜煮礬石汁拭之或煮蘿蔔和少酒以浴之

良姚氏以或煮石南十枝之一或水煎惟承十枝之余一月而

治丹方法俗呼爲風屎亦名風尸盛者石南湯主之

石南湯

神巧方亦名石南根飲子

治風癰疹瘻之則作瘡風尸身痒卒風面

目腫起

石南葉

神巧用根乾薑炮

黃芩

細辛

去苗

人參

去蘆各壹兩

桂心

麻黃

去管

當歸

芍藥

各壹兩半

甘草

炙貳兩

乾地黃

柒錢半

食茱萸

壹兩貳錢

右爲咬且每服肆大錢水壹大盞好酒貳合同煎至捌分去粗熱服不拘時候衣蓋令出汗

加味羌活飲 治風寒暑濕外搏肌膚發爲癰疹增寒發熱遍身瘙痒隨臟氣虛實或赤或白心迷悶亂口苦咽乾

羌活

前胡

並去蘆各壹兩

人參

桔梗

並去蘆

甘草

炙

枳殼

去穰
炒

川芎

天麻

茯苓

去皮各半兩

薄荷

蟬蛻

去頭各參錢

羚羊角散

治風癰瘍遍身痒痛心智滿悶

羚羊角屑

白鮮皮

白蒺藜

防風

去蘆

麻黃

去節

甘草

炙

羌活

去蘆各壹兩

枳殼

炒半兩

人參

去蘆

杏仁

去皮尖
炒

黃芩

各柒錢

生乾地黃

右爲咬咀每服肆錢水一中盞煎至伍分去粗入酒壹合更

煎一兩沸溫服

樟皮散 治肺臟風毒遍身瘡疥及風癰疹

枳殼

去穰用炭火燒存性

樟皮

燒灰各肆兩

甘草

炙半兩

荆芥穗

杏仁

各貳兩炒去皮尖

右件除杏仁用水壹椀於銀器內熬去水一半已來放令乾
另研令細次用諸藥末同研勻於糞合內收之每服參錢食
後溫酒調下

犀角散 治風癰疹心悶

角屑

川升麻

人參

玄參

沙參

防風

四味各去蘆

白鮮皮

白蒺藜

各半兩

甘草

炙

馬牙硝

各半兩研

牛黃

貳錢半研細

右爲細末入牛黃末同研令勻每服貳錢用竹葉湯調下不
癰疹

拘時

鬼箭羽散 治風癰疹累醫不効

鬼箭羽

白蒺藜

防風去蘆

白斂

甘草炙

白礬桔各
壹兩

右爲細末先用粟米粉伍合粉身了每服貳錢溫熟水調下
不拘時

漏蘆丸 治風癰疹

漏蘆

壹兩

枳殼
炒去穢

苦參各參兩

防風去蘆

川大黃

煅

烏蛇

右爲細末煉蜜和搗三三百下丸如梧桐子大每服參拾丸
用溫熱水送下食後服