

大字
足本

園醫書四十八種

三星書店發行

R2-51

34-2

脈浮病在表宜以汗解用火灸之傷其陰血不能作汗邪無從出反因火勢而加盛火而上炎陽氣俱

下行病從腰以下必重而痺內經云其氣不周命曰痺此因火而累氣故不名氣痺而名火逆也然其病之先發欲

自解者必待其自汗內經云在心為汗心之血液欲化為汗必當先煩乃有汗而解何以知之診其脈浮機先見之故

知汗出而解也此一節言誤灸後之病形並未灸前自愈之脈證也

汗為燒針令其汗則心液虛矣針處被寒核起而赤者心虛於內寒薄於外而心火之色現也

必發奔豚其氣從小腹上衝心者災其核上各一壯助其心火併散其寒專與桂枝加桂湯於原方

更加桂二兩溫少陰之水藏而止其虛奔此一節言外寒束其內火用火鬱發之之義也汪苓友

云此太陽病未發熱之時誤用燒針開發腠理以引寒氣入藏故用此法若內有鬱熱

必見煩躁等證又不在此例矣桂枝加桂湯方桂枝三兩芍藥三兩生薑三兩甘

草二大棗十二枚牡桂二兩右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升按桂即桂枝也本方共五

兩已照數加入二兩矣今坊刻各本有加牡桂二兩相傳已久始錄存參

火逆之證頗類胃實病象醫者誤認為裏實證而下之不愈因復燒針是下既奪其裏陰燒針復逼煩躁者以

桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之此一節為火逆煩躁者立交通心腎之方也桂枝甘草

龍骨牡蠣湯方桂枝一兩甘草二兩牡蠣二兩龍骨二兩右為末以水五升煮取

二升半去滓溫服八合日三服即此是法

太陽傷寒者若在經脈當用針刺若在表在肌加溫針傷其經脈則經脈必驚也即內經所謂起

居如驚神氣
乃浮是也

張令韶云自此以上十一節應言火攻之害今人於傷寒病動輒便灸草

管人命可勝悼哉受業薛步雲按火劫發汗今人少用此法而荆防羌獨薑桂芫芷

蒼橘之類服後溫覆逼汗皆犯火劫之禁讀仲景書宜活看不可死板

張仲景傷寒論原文淺註卷三

辨太陽病脈證篇

太陽病當惡寒發熱今吐傷中氣津自汗出證亦微不外不惡寒發熱脾胃之氣闕上之脈

微細虛數者此非以醫者吐之過也一二日吐之者則胃傷而脾未傷故脾能運而腹

中饑納而不能口不能食三四日吐之者脾傷而胃未傷脾傷則不喜糜粥傷仍

喜柔欲食冷食朝為陽胃為陽土朝食暮為陰脾為陰土暮吐然者以醫誤吐之所致也

潤故欲食冷食胃陽未傷故能朝食暮為陰脾為陰土暮吐然者以醫誤吐之所致也

前傷胃而不傷脾後傷脾而此為小逆此一節言病由誤吐一時氣逆使然後人擬用

大小半夏湯然却不知仲師無方之妙(述)此章凡四節皆言吐之失宜而變證有不同也

太陽病吐而不當吐之但太陽病原當惡寒今從反不惡寒不欲近衣者此為吐之傷上焦心

無所附而內煩也此一節言吐之不特傷中焦脾胃之氣亦能傷上焦心主之氣也

病人脈至其息六七數冷之證不同如數果為熱熱當消穀而引食而反作吐者此非熱以

過發其汗令陽氣外微胸中故膈中氣亦虛脈乃數也數為之外來客熱本熱無熱不能

消穀以胃中虛冷故吐也上二節之吐言以吐致吐此節之吐言不以吐而致吐也

病證在疑似不可定之太陽病既過經不解當辨其病留於何經之分十有餘日或留於

則心下溫溫欲吐而胸中痛主也或留於胸中為陽明之所大便反澀而腹微滿以大便與

之所謂也胃絡上通於心脾鬱鬱微煩無疑以上諸證或虛或實不先此十日之時自若得其病

脈又上膈注心脾胃不和故鬱鬱微煩無疑以上諸證或虛或實不先此十日之時自若得其病

極吐極下其意適者此胃可與調胃承氣湯微和若不爾者證則不可與若但欲嘔而心下

證溫溫胸中痛微煩證但微澀而無腹此且非柴胡證況敢遽認為承氣證乎然則承以其

嘔即吐之溫故知欲此時極吐下也此一節言病證在疑似之間而得其欲吐之情為主兼參欲下以定治法甚矣問證之不可不講也

太陽病六日已過七日主氣之期表證仍在脈微而沉是邪不在表而在裏矣太

反不結胸是病不在上其人發狂者邪熱內盛逼亂以熱在下焦小腹當鞭滿然小便與

腹蓄而不行小便自利者知不關膀胱之氣分而用藥以下其血乃愈所以然者以太陽之表

皆作鞭滿若小便自利者知不關膀胱之氣分而用藥以下其血乃愈所以然者以太陽之表

隨經而瘀熱在少腹裏故也以抵當湯主之此與桃核承氣證不同彼輕而此重彼為

熱結膀胱乃太陽肌腠之邪從背脊而下結於膀胱此為瘀熱在裏乃太陽膚表之邪

從胸中而下結於少腹也抵當湯方水蛭三十箇蟅蟲三十箇桃仁二十箇大黃三兩

酒浸上四味剉如麻豆以水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服

血之與水以小便之利與太陽病於中土故身黃脈沉結少腹鞭小便不利者乃脾氣不

不利分之請再申其說太陽病於中土故身黃脈沉結少腹鞭小便不利者乃脾氣不

否則不可姑試也

此一節申明上文小便自利之義也

喻嘉言云此條乃法中之法也見血

證為重病抵當為重藥後人辨證不清不當用而誤用與夫當用而不用成敗在於反掌故重申其義也

內經云今夫熱病者皆傷寒之類也

傷寒有熱歸於少腹故

少腹滿應小便不利今反利者

熱歸血海

為有血

也但血結陰位卒難蕩滌

當緩下之

然又恐藥力太微病根深固難不可更留餘藥宜抵當

丸此一節變湯為丸分兩極輕連澤而服又法外之法也

抵當丸方

水蛭

二十箇

蟲熱去翅

桃仁二十箇

酒浸

上四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合

服之晬時當下血若不下者更服時也

雖然辨蓄血者既以小便利為斷矣然不詳審其主證而并辨其兼證恐專執小便利之

一說概認為血證亦非辨證之法內經云飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸

於肺通調水道太陽病小便利者以其飲水之多夫飲水多而小便利則水氣下洩應必

下輸膀胱故

太陰病小便利者以其飲水之多夫飲水多而小便利則水氣下洩應必

心下悸也

是以水制

小便少者

氣不

必苦裏急也

證然哉

張錢塘云上節以小便利不利

而辨其血之有無此又以小便之多少而驗其水之有無并以接前三節之意以見不

可概認為血證其章法之精密如此

問曰吾聞太陽病竟有不能出入內外結胸少陰主樞竟不能樞轉

結有正有邪太陽之正氣與邪邪按之則痛

陽主皮毛故寸脈浮

結於胸中故

關脈沉此

名曰結胸也

張錢塘云此章論結胸藏結痞氣之證直至病脇素有痞方止其中有經

氣共結於胸膈有邪之正氣與邪邪按之則痛

陽主皮毛故寸脈浮

結於胸中故

關脈沉此

名曰結胸也

張錢塘云此章論結胸藏結痞氣之證直至病脇素有痞方止其中有經

名曰結胸也

張錢塘云此章論結胸藏結痞氣之證直至病脇素有痞方止其中有經

氣之分陰陽之異生死之殊學者所當細心體會也

何謂藏結答曰

胸雖不結陰邪如結胸之狀而內則發於少陰不於胸胃故飲食如故下

於藏時時下利寸脈浮氣浮於外也神闕脈小細為少陰之藏沉緊為少陰之藏名曰

藏結古為心之舌上白胎滑者陰寒甚於下而君難治

藏結之狀既明而藏結之證不可不講藏結發於少陰少陰上火藏結無陽證少陰主不

下水本熱標寒必得君火陽熱之化則無病今不得其熱化則為藏結無陽證少陰主不

見往來寒熱以出也陽動而陰靜故樞其人反靜舌上胎滑者感不得火衰微而陰寒氣不

可攻也此承上文而言藏結之證也少陰上火而下水其氣交會於陽明中土故脈

現於關沉與結胸無異而小細緊為臟陰虛寒結證所獨也按程郊倩云浮為傷寒

表脈沉為邪入於裏脈上節單言沉沉而有力也此節兼沉小細緊而言脈之分別如此

今試言結胸之因并病發於太陽宜從汗解而反下之則熱邪乘入有結於胸膈因作結胸

病發於少陰當救其裏而反下之今不結於藏而結於心下矣因而作痞痞症發於陰原無

早論也其症治另所以成結胸者以下之太早故也試再由其因而更詳其狀結胸者氣

詳於後而陽證之所以成結胸者以下之太早故也試再由其因而更詳其狀結胸者氣

於內達不外行於經項亦拘緊強有如柔痙之反張狀下之氣令一通則輸自和宜大陷

胸丸方張錢塘云此言結胸藏結之所因而於藏結之中復又推言痞結以見痞之同

發於陰而不與藏結同者藏結結於下而痞結結於上也結於下者感下焦陰寒之氣

結於上者感上焦君火之化也大陷胸丸方大黃半斤葶藶半升芒硝半升杏仁

半升去皮 上四味搗篩二味。內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末

一錢七。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下更服。取下為效。禁如藥法

然亦有不可下。結胸證。寸脈當浮。關其脈竟浮而大者。浮為在外。大為正虛。邪結於

下。誤下之。裏氣一泄。正氣無所。則而渙散死。此言結胸證。乃太陽之正氣。合邪氣而結於

內。若脈見浮大。是邪實固結於內。正虛反格於外也。張錢塘云。正者主也。客者邪也。

正邪並結者。客留而主人仍在。故可下之。邪結於中。而正反格於外者。主人去而客留。

故不可下也。

然又有不因誤。結胸證。內外則項強如柔。瘧狀。悉具。而且病發於太陽。竟

下而定其危者。結胸證。內則按之痛。諸證。悉具。動少陰之氣化而為煩躁者。陽病入陰。

亦死。此一節。從上節危脈之外。而補言危證也。

太陽之風。病其脈浮而動數。越風性浮。浮則為風。風為陽。數則為熱。陰陽相

虛。數則為虛。病太陽之頭痛。得標陽之發熱。凡傷風必自汗。汗少則惡風。汗出多亦必惡

微盜汗出。而反惡寒者。乃中風稽久之證。雖不表邪未嘗解也。醫反下之。表邪乘虛動數

脈變遲。邪氣膈在內。拒而痛。胃中而被下。空虛客氣。無所顧。動膈。膈上為心。肺主呼吸氣之

呼之。今為客氣動膈。則短氣。上下水。火之煩躁。煩躁之心中懊憹。此皆陽之氣隨邪內陷。

心下因鞫。則為結胸。以大陷胸湯主之。若不結胸。而陷於太陰。濕土之分。但頭汗出。津液

達餘處無汗。刺頸而還。若小便不利。濕熱因無去路。鬱身必發黃也。此一節言中風誤

下而成結胸也。大陷胸湯方。大黃六兩去皮芒硝一升甘遂一錢右三味以水六升先

煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服。

結胸亦有不下而成者傷寒六日為一經七日又當來復於太結於胸則傷寒之熱實又證重矣脈因下而沉者傷寒六日為一經七日又當來復於太結於胸則傷寒之熱實又證重矣脈沉而且緊為在裏實則心下痛按之如石之鞭者非他藥所必攻以太陷胸湯主之此一節

言傷寒不因下而亦成結胸也。

太陽傷寒十餘日熱結在裏蓋胸中為太陽之裏轉復作往來寒熱者乃太陽藉樞轉之機仍欲外出可與大

柴胡湯迎其機以導之但結胸而無大熱者此為寒太陽水之氣不行於結在胸脇也俱無

汗但頭上微汗出者水逆於胸而不大陷胸湯主之令水氣洩於下而正氣運於上則樞

刺而大陷胸湯為洩邪之峻藥雖不能轉樞然邪去而轉樞亦何難之有張錢塘云此言太陽不能從樞以外出以致水逆

於胸而成結胸也太陽寒水之氣內出於胸膈外達於皮膚從樞以外出則有往來寒熱

之象不能從樞以出而結於胸膈有形之間則無形寒水之氣遂結而為有形之水矣

太陽病重發汗而復下之亡其津液津液亡於下故不大便起計有五六日又值陽明主氣之舌上

燥而渴於陽明旺日晡時小有潮熱是兼見陽明之燥證然從心下至少腹鞭滿而痛不可近者陽明

又不如此危惡承氣湯大陷胸湯主之此一節言汗下亡其津液而成燥結胸之證也

張錢塘云內經謂二陽為維謂陽明統維於胸腹之前也夫太陽由胸膈而出入是胸

膈為太陽出入之門戶心下至少腹又陽明之所綱維兩經交相貫通故病太陽兼有

陽明潮熱之證也

然結胸證又有小結胸病止從胸而正在心下不比大結胸之高在心間按之則痛不比大小之分也
胸之痛不脈浮而滑者熱而經氣仍欲外達之象以
可接也

又分出小結胸證也 小陷胸湯方 黃連一兩 半夏半升 括萸實一箇 上三味以

水六升先煮括萸取三升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服

小結胸之病雖曰止在於太陽病過二日而三日正當少陽主氣之期而不能得少

卧起而但欲起病氣不轉心下必至結其脈微弱者此太陽本有寒分也何以言之太陽本

本治亦反其本今病還是反下之若利止而即上必作小結胸利未止者當四日氣之期

復下之則氣隨下陰脾家之腐穢遂從此發作而協太陽熱下利也此一節言小結胸而

復推上下之經氣相通也

經氣不獨上下相通而內太陽病不可下若誤下之其邪陷入變

外相通可因脈而知其證太陽病不可下若誤下之其邪陷入變

不作結胸者胸中必有邪鬱言此為欲解而未也若脈浮者太陽病下之太早故必結

胸也脈緊者傷寒脈紫此因下而必咽痛脈弦者是邪陷於中必兩脇拘急脈細數者細

陰數主熱是陽邪陷入頭痛未止脈沉緊者沉屬裏緊主寒太陽必欲嘔脈沉滑者沉屬

少陰為兩火相炎故於協熱利脈浮滑者浮主風滑主熱風性必下血上節言上下經氣

為水太陽濕之邪故於協熱利脈浮滑者浮主風滑主熱風性必下血上節言上下經氣

之相通此節言內外經氣之相通也

內因之水結而不散則為結胸之證而病在太陽表應以汗解之者反以冷水噴之若病於外因之水入於皮膚亦有小結胸之患而病在太陽表應以汗解之者反以冷水噴之若病於身通灌之其在表熱被冷水却不得去水之前彌更熱而益煩汗孔閉而肉上如結粒粟起熱却於意欲飲水其外寒制反不作渴者宜服文蛤散水氣若不差者與五苓散助脾土仍從皮膚而散之如內寒實結胸無之肌表熱證者與三物小陷胸湯治之法至若白實於外陽熱却於內而為寒實結胸無之肌表熱證者與三物小陷胸湯治之法至若散從治之法亦可服此一節於小結胸外又補出寒實結胸證也文蛤散方文

蛤五兩

右一味為散以沸湯和一錢匕服湯用五合

白散方

桔梗三分

巴豆一分

去皮心熬

貝母三分

黑研如脂

右二味為散內巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢匕

贏者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯身冷

皮粟不解欲引衣自覆者若水以噀之洗之益令熱却不得出當汗而不汗則煩假令

汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

既有結胸之證亦太陽與少陽併病二陽之經脈交會頭項強痛而行於頭受邪則目

或旋暈眩頭如覆胃痞病在太陽則結胸病在少陽則脇下痞結胸痞下痞

鞭者當刺大椎第一間以泄邪太少併病肺俞化行而邪自不留復刺肝俞以瀉少陽之邪

表裏慎不可發汗以竭其經脈之發其汗則熱而譫語相火熾脈弦若五六日譫語不

止六日值厥陰主氣之期恐少陽之火當刺之期門以奪其氣此一節言太陽少陽併病

涉於經脈而如結胸宜刺以瀉其氣也併者猶秦併六國其勢大也按圖經云大椎

一穴在第一椎上陷中。手足三陽督脈之會。可刺入五分。留三呼。瀉五吸。肺俞二穴在第三
寸五分。中間脊骨一寸。連脊骨算實兩旁相去各一寸。下做此。足太陽脈氣所發。可刺入三分。留七呼。得氣即瀉。肥人可

刺入五分。肝俞二穴在第九椎下。兩傍相去各一寸五分。宜照上可刺入三分。留六

呼。期門二穴。見上章

病在經脈而如結。婦人中風發熱惡寒。當表邪方經水適來。蓋經水乃衝任厥陰之所主。者不獨男子也。結。婦人。中風。發熱惡寒。當表邪方經水適來。而衝任厥陰之血又皆取資於陽。得病之過。七日至八日。正值陽明主氣之期。病邪外熱除而脈遲身涼。已離陰證。惟胸脇之胸脇下滿。如結胸之狀。而且熱與血搏。謔語者。此為熱入血室也。治者。要而當刺期門。隨其實而瀉之。何以謂之實也。此節合下一節。皆言婦人熱入血室。病在經脈。狀如

結胸者。正可以互證而明也。

經水未來。因病而適來者。既明其義。婦人中風七八日。身業已熱。除矣。而經水已來。因病而適斷者。何如。婦人中風七八日。身業已熱。除而復續。得寒熱發作有時。其

經水已來。通斷者。果何故哉。蓋以經水斷於內。則寒熱此亦為熱入血室。其血所阻。則必

結。不在表而在裏。陰之經脈內未入藏外。故使如瘧之狀。發作有時。以小柴胡湯主之。達經

結。仍藉少陽之樞以轉之。此一節。承上文而言中風熱入血室。其經水已來而適斷。當

知異中之同。同中之異。各施其鍼藥之妙也。

熱入血室。不獨中風。婦人傷寒。寒鬱發熱。當其經水適來。過多不止。則血室空虛。而熱邪有之。而傷寒亦然。婦人傷寒。寒鬱發熱。當其經水適來。過多不止。則血室空虛。而熱邪氣暮為陰。而主血。今晝日明了。主血之陰。受邪故。暮則謔語。如見鬼狀者。醫者當於其經水適來而定其證。曰。此為

熱入血室非陽明胃實所致也無以下犯其胃氣及上二焦之一曰胃脘之陽不可以吐傷
傷之惟俟其經水盡則血室必自愈慎不可妄治此一節言婦人傷寒之入於血室也
之血復生於胃府水穀之精

郭白雲云前證設不差服小柴胡湯柯韻伯云仍刺期門

再由此而推傷寒六至日已過七日又值太陽發熱病在太陽微惡寒病在太陽之本氣病
言乎諸結

結於經脈之支支節疼痛經氣鬱而微嘔絡不結於經脈之正心下支結外證未去者寒熱
猶在柴胡桂枝湯主之取其解外又達太陽此一節言太陽之氣化而結於經脈之支

別也柴胡桂枝湯方柴胡四兩桂枝黃芩人參各半甘草一兩半夏二合芍

藥二兩大棗六枚生薑半切右九味以水七升煮取三升去滓溫服

支結之外傷寒過五日而六日為厥陰主氣之期經云已發汗而復下之則逆其少陽之
又有微結

胸脇滿不似結胸證微結氣行不得小便不利火氣治之故渴無樞轉外出而不嘔熱結

而不在下故但頭汗被蒸出而少陽欲樞轉往來寒熱心煩者少陽與厥陰為表裏厥陰內

太陽之病六日而涉厥陰若此此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之此湯達表轉樞解

和緩八此一節言太陽病值厥陰主氣之期而為微結也柴胡桂枝乾薑湯方柴胡

半斤桂枝三兩乾薑二兩括萎根四兩黃芩三兩牡蠣二兩甘草二兩右七味以水

一斗二升煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

微結中又有陽微結之不知傷寒證太陽五日為少陰主六日為厥陰主氣之期太陽之氣上

同於陰結者不可不知傷寒證太陽五日為少陰主六日為厥陰主氣之期太陽之氣上

故頭汗出太陽之本微惡寒外行於四肢故手足冷此皆太陽在心下滿口不欲食大

便鞭此皆太陽傳裏之證也太脈細者何以陽而見陰則陽轉微此為陽微結故見必有表

惡寒手足冷復有裏欲食大便不也則同類之可疑者不少獨脈細為在裏即脈沉亦

為在裏也雖然隨證審脈既不可以板拘而病證互汗出一定其結可為陽微假令陰之純

陰結不得復有外證悉入在裏而陰筋之證少腹此證猶為半在裏半在外也脈雖沉緊究

不得為少陰藏結病所以然者三陰之經絡陰證不得有頭汗今頭汗出故知為太陽非

少陰結也藏也可與小柴胡湯以助邪散矣設而裏解不了了者胃氣不得屎而解此陽微

陰而要不同於陰結者如此此可此一節言陽微結之似陰雖見裏脈而究與少陰之

純陰結有辨也

小柴胡證大陷胸證既各不傷寒至五日為主氣之期六日為厥陰主氣之期大抵五六日之

同而痞證更須分別太陽傷寒至五日為主氣之期六日為厥陰主氣之期大抵五六日之

聞嘔而發熱者欲從樞外出之柴胡湯證悉具用柴胡而以他藥下之下陷所具之柴

胡證仍在者可復與柴胡湯此雖已下之却不為逆服藥之後正氣與邪氣相必蒸蒸而

振蒸蒸者三焦出氣之象却發熱汗出而解少陽樞轉氣若之心下滿而鞭痛者此為結

胸也宜大陷胸湯主之但滿而不痛者乃病發於陰誤此為痞痞證感少陰之熱柴胡不

中與之宜半夏瀉心湯此一節復以小柴胡證大陷胸證夾起痞證言大陷胸不可與

即柴胡亦不可與也特出半夏瀉心湯一方以引起下文諸瀉心湯之義半夏瀉心湯

方。半夏半升 黃芩 乾薑 甘草炙 人參已上各三兩 黃連一兩 大棗十二枚 右七味以

水一斗。煮取六升。去滓。再者。取三升。溫服一升。日三服。

結胸痞症。由於誤下所致。太陽少陽併病。宜從少陽之樞轉。醫而反下之。逆其樞。成小結。

胸。心下鞭。下焦不關。而下利不止。上焦不納。而水漿不下。樞逆於中。則中焦其人心煩。此

劇證也。此一節。言太陽少陽併病。誤下之劇證也。受業薛步雲云。誤下後。太少標

本水火之氣。不能交會於中土。火氣不歸於中土。獨亢於上。則水漿不下。其人心煩。水氣不交

於中土。獨盛於下。則下利不止。此不可用陷胸湯。即小柴胡。亦未甚妥。半夏瀉心湯。庶幾近之。

知并病之不可以誤下也。亦如陰證。脈浮。而在陰。證浮中見緊者。可以定其為少陰之表。

更不可以誤下乎。傷寒病在表。則脈浮。而在陰。證浮中見緊者。可以定其為少陰之表。

之一二日。麻黃附子甘草湯。微發其汗。是以醫者不知微發其汗。而復下之。其緊初見於浮。反入於裏。沉緊

病發於陰。則作痞。痞之所由來也。但痞與結。此以按之自濡。彼為有形。但無形。氣痞耳。此一

而誤下之。則作痞。胸異彼以按之自濡。此以按之自濡。彼為有形。但無形。氣痞耳。此一

節。申言痞證之因。痞證間有風激水氣。而太陽中風。水氣動其寒水之氣。下利。於上則嘔逆。然風邪在表。解者乃

可裏攻之。若其人溢內水。滲。熱熱汗出。水有潮汐。發作有時。水搏則過額水。頭痛。於胸脇則

心下痞。而鞭滿。又引脇下。而痛。水部在中。阻其升降。乾嘔。上下不能。短氣。證之未和。惟此汗

出不惡寒。一證。另為者。即於不惡寒中。知表證。此表解裏未和也。以十棗湯主之。此一節。於痞證外論及太陽中風。激動其寒水之氣。而為痞也。熱。音。熱。汗出。如。十棗湯方。

芫花熱甘遂

大戟

大棗

十枚

右三味等分各別搗為散以水一升半先煮大棗

肥者十枚取八合去滓內藥末強人服一錢匕羸人服半錢溫服之平旦服若下少病

不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

痞證間有汗下虛其陰陽太陽病在肌腠者宜桂枝湯以解肌醫者誤以

惡寒比前較甚若再用桂枝湯因復下之更傷太陰之心下痞表裏俱虛陰與陽

氣並竭並竭則不交而為痞矣且夫陰陽之為義大矣哉自其淺言之則氣陽也血陰也

同於有形之陰血獨行於經脈之中也陰血止無陽則陰獨其理雖與醫者復加燒鍼以

謂之陰陰氣謂之為陰亦可謂之為陽此證無陽則陰獨不可以不明倘復加燒鍼以

助其陽因攻胸為煩土敗而呈木面色青黃脾傷而失其膚動而者難治今面色不青

微黃是土不失也手足溫者猶見土氣灌漑易愈此一節言汗下傷陰陽之氣而成痞者

不可更用燒鍼也今閩粵江浙醫輩不敢用麻黃湯而代以九味羌活湯香蘇飲加

荆防芎芷炮薑之類視麻黃湯更烈

痞發於陰竅感少陰君心下不通痞以按之却而不濡此病在無形其脈却不同誤下

上浮者少陰君火亢盛之象此大黃黃連瀉心湯主之瀉少陰亢盛之火而此一節

言痞感少陰君火之氣而成出其正治之方也此外各瀉心法皆因其兼證而為加減

也大黃黃連瀉心湯方大黃二兩黃連一兩右二味以麻沸湯二升漬之須臾

絞去滓分溫再服

痞為少陰本熱火亢而有復呈心下痞為少陰證而復惡寒乃得太陽本寒之氣而且汗出者為太陽本寒為病者亦須分別
附子瀉心湯主之蓋以太陽少陰標本相合水火相濟本氣中自有難以自守之象以

附子瀉心湯方 大黃二兩 黃連二兩 黃芩二兩 附子一枚破別煮取汁 右四味切三味以麻

沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫再服

水火不交其作痞固也而上氣不本寒也傷寒中風但見惡寒之本病不見發熱之標病能轉運者亦因而作痞太陽之汗之宜慎而下更非所宜醫者不知其病止在本汗後以承氣下也故心下痞與瀉心湯欲泄其痞竟不解所以然者汗傷中焦之汁下傷中液則其人渴而口中燥煩脾虛不能下行而小便或短赤或不利者以五苓散主之

上節言水火不交而成痞此言土不灌漑而亦成痞也

脾不和者既因以成痞傷寒汗出外邪解之後是胃中不和而內結故為心下痞鞭不和氣矣而胃不和者亦然

逆而上乾噎蓋胃之所司者水穀而胃氣和則穀消食臭水不化而脇下有水氣腹中雷鳴故為乾噎而水化矣茲則穀不消而作腐故為

鳴下利者水穀不消糟粕未成而遽下逆其勢則生薑瀉心湯主之上節言脾不轉輸

而成痞此節合下節皆言胃不和而亦成痞也 生薑瀉心湯方 生薑四兩 甘草三兩

人參三兩 乾薑一兩 黃芩三兩 半夏半斤 黃連一兩 大棗十二枚 右八味以水一斗煮

取六升去滓再煮取二升溫服一升日三服

然而胃不和中又有誤傷寒或中風不應醫反下之虛其腸胃則水寒在下之虛證太陽病或傷寒或中風下者醫反下之虛其腸胃則水寒在下而不得上交故其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴火熱在上而不下濟故其人心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安此上下水火不

陽寒論卷三 太陽篇

與醫者不見其心下痞謂之邪熱病不盡復誤下之則下者益下其痞益甚此非熱結但誤下

以致胃中虛客氣虛上逆故使下鞭也以甘草瀉心湯主之此交上下者調此一節承

上節胃不和而言胃中虛之證也甘草瀉心湯方甘草四兩黃芩三兩乾薑三兩

半夏洗大棗十二枚黃連一兩右六味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服

痞即下焦不中二焦之為病傷寒服之攻下湯藥下後則下焦不故下利不止上焦之氣上

痞鞭下之聖火熱而湯所以導心服瀉心湯已則上中之氣亦和矣復以他藥下之則下焦之

不能利不止醫又認為中焦虛寒以理中湯與之利益甚蓋理中者溫補脾胃理中焦此利中焦

而在下焦以當赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者其法在分當利其小便此一節言下焦

不和以致痞發千古所未發赤石脂禹餘糧湯方赤石脂一斤禹餘糧一斤已上

二味以水六升煮取二升去滓分三服

在下後致痞言之詳矣而發汗傷寒吐下後又發其汗則奪其經脈之血液故虛煩心主脈甚

微八日之期而從明主氣九日而值少陽主氣之期心下痞鞭而脇下亦痛甚至陰虛氣上衝於

咽喉血不其形眩冒經脈動惕者以吐下之後而汗之則經脈久而不為我用而或痿

此一節雖吐下與汗並言却重在誤汗一邊

汗吐下後病已解而尚有痞噫傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者此中氣

也氣上逆旋覆代赭石湯主之此節言治病後之餘邪宜於補養中寓散滿鎮逆之法