



丹溪心法附餘卷之十八

積門

積聚痞塊 八十三

丹溪心法

○痞塊在中為痰敗 在右為食 一云痰積在左為血塊 氣不能作塊成聚塊乃有形之物也 痰與食積死血而成也 用醋煮海石醋煮三稜蓬朮桃仁紅花五靈脂香附之類為丸石醺白朮湯吞下 瓦罐子能消血塊次消痰 石醺一物有痰積有塊可用洗滌垢膚又能消食積 治塊當降火消食積食積即痰也 行死血塊去須大補○凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不去當用消積藥使之融化則除根矣 凡婦人有塊多是血塊

戴云積聚癥瘕有積聚成塊不能移動者是癥或有或無或上或下或左或右者是瘕

○積聚癥瘕朱先生醫台州潭補家用蜀葵根煎湯去滓再入人參白朮青皮陳皮甘草梢牛膝煎成湯入細研桃仁玄明粉各少許熱飲之二服當見塊下如病重者須補接之後加減再行入方

消塊丸 即千金方硝石大黃丸止可磨塊不令人困須量度虛實

硝石六兩人參三兩甘草三兩大黃八兩

右為末以三年苦酒三升又云三斗置甕器中以竹片作準每入一升作一刻柱竪甕中先納大黃不住手攪使微沸盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬使可丸則取丸如雞子中黃大每一丸米飲下如不能大丸作小丸如梧子大每三十丸服後當下如雞肝如米泔赤黑等色下後避風冷啖軟粥將息之苦酒即米醋也

三聖膏 未化石灰半片為末瓦器中炒令淡紅色提出火候熱稍減次下大黃末一兩就爐外炒候熱減下桂心末半兩畧炒入米醋熬攢成黑膏厚紙攏貼患處

○痞塊在皮裏膜外須用補氣藥香附開之兼二陳湯加補氣藥先須斷厚味

又方 琥珀膏 大黃 樸硝各一兩

右為末大蒜搗膏和貼

又方 治茶癬 石膏 黃芩 升麻

右為末沙糖水調服

又方 一人愛喫茶

白朮 軟石膏 片芩 牛膽星 薄荷員藥大者白芍

右為末沙糖調作膏食後津液化下

又方 治脇下有塊

龍會丸二錢半起料姜黃五錢桃仁五錢

右為末蜜丸服

又方 龍會丸和鵝糞大能消食積或入保和丸治塊看在何部分

治血塊丸 瓦罐子能消血塊

海粉醋煮三棱 蒜木醋煮紅花 五靈脂 香附 石減

右為丸白朮湯吞下

又方 治婦人血塊如盤有孕難服峻利

香附醋煮四兩 桃仁去皮尖白朮各一兩海粉醋煮二兩

右為末神麩糊丸

又方 治婦人食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜眩暈身熱時作時止男子亦可服

黃連一兩

半用益智炒去益智不用茱萸山梔炒川芎三棱

神麩 桃仁

去皮尖各一兩香

附童便浸一兩 蘿蔔子炒一兩半 山查一兩 義术 酢煮一兩

右為末蒸餅丸服

又方用青皮半兩白芥子一兩半炒

保和丸 治一切食積

山查六兩神麩二兩半夏

茯苓各二兩陳皮 連翹

蘿蔔子各一兩

右為末炒餅子如梧子大每服七八十九食遠白湯下

又方 山查四兩白朮四兩神麩二兩

右為末蒸餅丸如梧子大每服七十九白湯下

又方 山查三兩白朮二兩陳皮 茯苓 半夏各一兩連翹 黃芩 神麩 蘿蔔子各半兩

右為末蒸餅丸如梧子大每服五十九食後姜湯下

阿魏丸 治肉積 諸阿魏丸脾虛者須以補脾藥作湯使下之切不可獨用虛虛之禍疾如反掌

連翹一兩 山查二兩 黃連一兩三錢 阿魏二兩醋煮作糊

右為末醋煮阿魏作糊丸服三十九白湯下

小阿魏丸 山查三兩石鹽 半夏一兩皂角水浸透研

右為末粥糊丸每服三十九白湯下

又方 治飽食停滯者胃壯宜此脾虛勿服

山查 蘿蔔子 神麩 麥芽 陳皮 青皮 香附各二兩 阿魏一兩 醋浸軟另研

右為末炊餅丸

又阿魏丸 去諸積聚

山查 南星(水浸半夏水浸半角) 麥芽炒 神曲炒 黃連各一兩 連翹 阿魏 醋浸瓜蔞 貝母各半兩  
風化硝 石醣 蘿蔔子蒸 胡黃連一兩半如無以宣連代

右為末姜汁浸蒸餅丸

佐脾丸 山查三兩半夏 枇苓略一連翹 陳皮 蘿蔔子各半兩

右為末粥丸服

小溫中丸

青皮一兩 杏附(醋煮者)四兩便浸童便浸 蒼朮二兩半夏二兩 白术二兩 陳皮一兩 苦參半黃連一兩 姜針砂 醋炒二兩

右為末麴糊為丸

又方

針砂(醋煮者)三兩 香附(童便浸)四兩 蒼朮二兩半夏二兩 神曲炒二兩 黃連一兩 姜汁炒山梔 厚模姜汁半夏一兩 台芎半兩 蒼朮二兩

一方加人參炒白术一兩半有苦參用白术苦參不用黃連

枳實丸

白术二兩 枳實半夏 神曲麥芽各一錢 黃連一錢 陳皮各五錢 木香一錢 山查一兩

右為末荷葉蒸飯為丸如梧子大每服一百丸食後生姜湯下

大溫中丸

又名大消痞丸

黃連炒黃芩六錢 姜黃 白术一兩 人參 陳皮 澤瀉二錢 炙甘草 砂仁 乾生姜 炒

麴二錢 枳實炒半兩 半夏四錢 川樸三錢 姜製猪苓一錢半

右為末炊餅丸

附諸賢論

或問人有積塊疝氣心腹痛等證者雖多服久服附子姜桂等熱藥而不發藥毒不生他病然本病日深者何也王節齋曰諸積諸痛喜溫而惡寒熱藥與病情相合積久成鬱而火邪深矣鬱熱既深則見寒愈逆見熱愈喜兩熱相從故不生他病所謂亢則害承迺制火極而似水者也然真氣被食陰血乾枯病日深痼而不可為矣世人不識但見投熱不熱悞認為沉寒痼冷而益投之至死不悟悲夫然則治之當如何曰當用從治法內經曰熱因寒用寒因熱用伏其所主先是也

附脉理

脉訣舉要曰宿痞脉滑為有痰積弦伏亦痞濇則氣少肝積肥氣弦細青色心為伏梁沉芤色赤脾積痞氣浮大而長其色脾土中央之黃肺積息貴浮毛色白奔豚屬急而異五臟為積六腑為聚積在本位聚無定處浮牢小而沉實或結或伏為聚為積實強者生沉小者死生死之別病同異脉理提綱目鬱脉沉濇積脉弦堅

附諸方

肥氣丸三因方治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜蟹狀久不愈發咳逆嘔其脉弦而細

當歸頭

蒼术

各一兩半青皮炒

一錢

三棱

鐵孕粉

各三兩與三棱

羌活

一錢

同入醋煮

一伏時

久蛇含石

燬

洋

五錢

右為末醋煮米糊丸如菉豆大每服四十九當歸浸酒下

伏梁丸三因方治心積起於脾上至心大如臂久不已病煩心身體脛股皆腫環臍而痛其脉沉芤

枳殼去穰炒

茯苓

厚樸

人參

白朮

半夏

三稜

煨各等分

右為末麪糊丸如梧子大米飲下二十九作散酒調亦可

痞氣丸三因方治脾積在胃脘腹大如盤久不愈病四肢不收黃疸飲食不為肌膚心痛徹背背痛

徹心其脉浮大而長

附子半兩炮赤石脂燶醋淬川椒炒出汗乾姜桂心半兩大烏頭二錢半炮去皮臍

右為末蜜丸如梧子大朱砂為衣每服十九米飲下

息賁湯三因方治肺積在右脇下大如覆杯久不愈病酒酒寒熱湯逆喘咳發肺壅其脉浮而毛

半夏湯沈七次吳茱萸湯沈桂心人參甘草炙桑白皮炙草薢各一兩半

右剉每服四錢水鍾半姜七片棗二枚煎食前服

奔豚湯三因方治腎積發於小腹上至心如奔豚走之狀上下無時久不愈病喘逆骨痺少氣沉而滑

甘李根皮焙乾葛各一錢半川芎當歸半夏湯洗泡七分白芍藥甘草炙黃芩各二兩

右剉每服四錢水鍾半煎七分服

○已上數方治五積之劑

勝紅丸簡易方治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水大人酒積婦人脾血積氣小兒食積並

陳皮 蒜术二味同青皮 三稜 乾姜炮良姜各一兩附子炒去皮二兩

右為末醋糊丸如梧子大每服二十九姜湯下

木香通氣丸聖惠方治痃癖氣滯心腹痞滿嘔逆咳嗽順氣消痰進飲食消痞

人參 木香各一兩半玄胡索一兩陳皮 黑牽牛各六枚榔丁香各半三稜炮廣茂炮各三兩

半夏製茴香炒木通 神曲 大蘖各二兩青皮一兩

右為末水糊丸如小豆大每服三四十九生姜湯下食後日二服

導氣枳殼丸宣明方治氣結不散心胸痞痛氣逆上攻喘急咳嗽

枳殼去核炒木通 青皮去白陳皮去白桑白皮炒蘿蔔子 白牽牛炒黑牽牛炒蒜术炮茴香

炒荆三棱 煅各半兩

右為細末生姜汁打麪糊為丸如梧桐子大每服五十九橘皮湯送下  
消滯丸 治酒食所傷心腹痞悶刺痛積滯不消

黑、黃牛二兩 香附子炒一兩 五靈脂一兩

右為細末醋糊為丸如梧子大每服五十丸食後生姜湯送下

荆蓬煎丸 拔粹方破痃癖消癰塊積聚胸膈痞悶通利三焦升降陰陽

蓬术二兩  
冬三夏浸三棱二兩  
冬三夏浸二味用巴豆三十八箇銀器內炒乾黃色不用巴豆

木香 枳殼 青皮 茴香 桃榔各一兩

右為細末麪糊為丸如桐子大每服三十九食速生姜湯下

烏梅丸 治酒積消食化痰

烏梅一斤半 夏半斤 生姜一斤

右件石白搗細末新瓦兩片夾定火上焙三日三夜為度次下

神曲 麥芽 陳皮 青皮 茂术 丁皮 大腹子 枳殼各四兩

右共為細末酒糊為丸每服四五十丸姜湯下

木香三棱丸 宣明方治一切氣閉胃膈痞滯榮衛不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛無間新久

青木香 破故紙 茴香炒黑、黃牛 甘遂 芫花 大戟 荆三棱 蓬茂术 川練子

葫蘆巴 巴戟去心  
六錢各一錢 陳米將巴豆同陳米  
三分半  
三合  
一處炒  
黑砂仁  
二錢

右十五味用好醋半升除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿入鍋煮盡為度碾為細末醋糊丸如  
菉豆大每服五七丸食後湯水送下

寶鑑破積導飲丸 治內有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

楨榔

陳皮去白廣木香 青皮去白枳殼

枳實去核廣茂炮

三棱炮半夏湯泡神曲

炒大麥芽

炒乾生姜 茯苓去皮甘草炙澤瀉各五錢

荳牛頭末二錢

三分六錢巴豆膜油取霜

右為細末入巴豆霜勻生姜汁打糊為丸梧子大每服三十九溫生姜湯送下食前

○已上數方辛溫消導之劑

開結枳實丸 御藥宣導凝滯消化痰飲升降滯氣通行三焦蕩滌脾胃去結潤燥流暢大小腸專主中痞痰涎惡心嘔噦醉飽膈實宿物停積兩脇膨悶咽嗌不利上氣喘咳等疾

枳實去核

白朮 半夏湯泡天南星 白礬枯苦蓼莖

隔紙大黃 青皮去白各木香三錢黑

半兩木香另研半兩

牽牛頭末一兩皂角去皮子各一兩

右為末生姜汁煮麪糊為丸如梧子大每服四十九溫生姜湯送下 如單腹脹上喘涎多四肢腫滿食後生姜湯下 如婦人乾血氣膈實腫滿或產後有傷面目浮腫小便不利生姜葱白湯下酒痘溫酒下

沉香降氣丸 瑞竹治胸膈痞滿升降水火調順陰陽和中益氣推陳致新羹進飲食

沉香

木香 藥澄茄 枳殼去核砂仁

白豆蔻仁 青皮 陳皮 廣术 枳實炮炒黃

連 半夏姜製白茯苓去皮一兩蘿蔔子另研半兩

香附子炒去毛二兩

右為細末生姜自然汁浸蒸餅為丸如梧子大每服七十丸臨臥煎橘皮湯下姜湯亦可忌生冷

三棱

六兩醋炒青皮 陳皮 羿术

炮炒枳殼炒枳實炒蘿蔔子炒香附子各一兩

黃連 神曲炒麥芽

炒蟹甲醋炙乾漆

為度桃仁 砂仁 破砂 歸尾 木香 甘草炙各一兩

柏榔六兩山楂四兩

右為末醋糊丸每服三五十丸白湯下

一方 治腹中癥塊及諸般積塊脾胃怯弱飲食不消腹脹面黃四肢酸疼無力

麸麪四斤炒黃色蒼术米泔水浸皂礬一斤以好醋一碗煮乾蓋地上一宿取出

右同為末酒糊丸梧子大每服三十丸加至五十丸空心米湯或酒任下一日三服  
積氣丹聖惠方治新久一切沉積氣塊癰瘕積聚面黃肌瘦沉困無力口吐酸水

枳榔二箇芫花三稜黃連牛膝商陸根廣茂各一硃砂一錢肉豆蔻青皮陳皮石菖蒲巴豆生木香各二錢半大戟大黃甘遂白牽牛乾姜青磁石乾漆各一錢右為末醋糊丸如梧桐子大每服十九粒臨臥燒棗子湯下若是有積者肚內作聲病退每夜十九○廣按此方用陳皮青皮木香枳榔之類所以治無形之氣積用牛膝乾漆三稜莪术之類所以治有形之血積用大戟芫花甘遂牽牛商陸磁石硇砂之類所以治水穀魚肉之積也餘用乾姜巴豆以治新積之寒用大黃黃連以治久積之熱可謂周而且備矣然此晒眩之劑中病當已而不可服之太過也歟

○已上數方辛平消導之劑

宣毒丸 大黃炮二錢青皮陳皮蒼术各一兩當歸去頭一兩黑牽牛四兩

右為末煮蘿蔔丸如梧子大每服五十九溫水臨臥下米粥補之

妙功丸 治飲食不節起居失常七情所感勤勞不一以致氣凝血滯於榮衛之中或冒風寒濕氣凝結於經絡之間臟腑之內或為癰瘕或為積聚癥塊此藥功效不可具述

大黃四兩黃連一錢金硝一錢粉二錢硇石錢二分粉霜半錢或川芎二兩黑牽牛末八兩滑石

四兩白豆蔻沉香木香各半兩蓬术枳榔黃芩各一兩

右件除粉霜輕粉硇砂另研白豆蔻另研和勻水丸或稀糊丸如梧子大量虛實加減

木香和中丸 聖惠方治消腸胃中積聚癰瘕痞塊宣暢三焦開利胃膈主治氣逆上攻心胸脇肋脹滿痞痛四肢六脉拘急身體困倦潤大便利小便和脾氣進飲食

木香去腐沉香 桀柳 枳殼去穰蓬莪术去皮青皮去穰陳皮去白當歸酒浸黃芩去腐木通去皮黃連去須白豆蔻 三稜去皮牙皂連子醋炙郁李仁去皮各大黃蒸四兩縮砂二兩黃柏去粗皮三兩香附去毛三兩牽牛末二兩或四兩

右為末水丸如梧子大每服一錢半加至三錢生姜湯下或茶酒亦得不拘時候  
木香枳殼丸 御藥治一切酒食所傷胃膈痞悶脇肋脹滿心腹疼痛飲食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼去穰炒茯苓去皮白术厚朴生姜製半夏湯生粗皮七次人參去頭芦木香青橘皮陳橘皮各湯燒乾荆三棱炮艾木煨香枳榔神曲炒麥芽炒各一乾生姜半枳實用炒半兩牽牛微炒大黃五錢

右為細末生姜汁為丸加麪糊如梧子大每服七十丸食後姜湯下

○廣按凡人有積病則氣滯而餒此方用藥攻補無施真真得古人養正積自除之理有疾病而涉虛者用此最當

木香枳榔丸 端竹治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨脹大小便結滯不快

木香商枳殼去穰青皮去白陳皮去白枳榔廣茂黃連各二黃柏去粗皮香附子略炒

大黃各三兩黑牽牛半斤去頭末四兩

右為細末酒糊丸梧子大每服五十丸食後溫生姜湯下

全真丸 端效方治三焦氣壅結痞心胸大便不通傷寒下證已服承氣不利服此有立安穩而通

川大黃商枳殼炒枳榔黑牽牛半生半熟各半兩

右為細末滴水為丸如梧子大每服五十九或七十九米飲下

解毒板榔丸 治男子婦人嘔逆酸水痰涎不利大便膿血口苦煩燥涕唾稠粘噉血崩腹脹氣

滿手足痿弱四肢無力酒疸食黃口舌生瘡寒熱往來瘡疾腸風痔瘻癰疽血積諸惡瘡疔治之皆

板榔 黃連 青皮 陳皮 木香 沉香 巴戟去心酒浸當歸 廣術 枳殼 香附子

炒甘草炙大黃各二錢半黃柏七錢半牽牛末一兩

右為細末滴水為丸如梧子大每服七十九溫生姜湯下

取積丹聖惠方 用好大黃不以多少為末用好釀醋發膏子為丸如梧子大每服一百丸量虛實大小體吃晚飯用好墨研濃好酒送下次日見膿

○已上數方辛涼消導之劑

七轉靈應丹 治一切山嵐瘴氣蠱毒不問新舊諸積諸氣及婦人血瘕血閉小兒肚大面黃疳積及一切心痛諸般蠱積凡人面上白斑君紅能食心嘈顏色不常臉上有蟹爪路者便有虫也此丹四時宜服不損真氣無病之人春秋各服一服打下虫積終歲無病惟孕娠不宜服之

蕪荑

五錢取

牽牛

五兩取頭

板榔

五兩取淨

大黃

五兩取淨

木香

五錢取淨

雷丸

四兩取淨

錫灰

一兩

煨取

淨末三錢

右各取淨藥末一處拌勻葱白湯露一宿為丸如黍米大每服四錢病深年遠者加至五分用葱白湯露一宿早晨空心冷下取出病根日晚用溫粥補之忌生冷硬物葷腥等物三十日若失聲音加沉香琥珀各五錢又方以茵陳皂角各四兩煎膏為丸或入使君子鶴虱各五錢為末更好八仙妙應丹 治男子婦人小兒外感內傷以致水穀停滯腸胃生蠱成積惡心嘔吐若酸糲雜滯痢黃疸水腫鼓脹膈噎翻胃及婦人癥瘕積聚心腹疼痛小兒疳症面黃肌瘦肚大腳細一切蠭並治

雷丸一兩錫灰半兩白蕪荑一兩木香一兩不錦文大黃一兩  
梔柳二兩半心者使君子一兩黑丑四兩不見火

右八味為細末葱白一斤煮沸露一宿為丸如粟米大每服四錢病重年深體實者加至五錢葱白湯送下或木香湯下十五歲以上者可服三歲七歲者每一服作三服早辰空心冷下務在房內坐桶不要見風出外通泄或見積如絮動不斷或如爛魚腸肚或如雞旦黃色或如米泔水色稠粘不斷或如馬尾虫或血蠶虫或胡蚕虫或蝦蟆樣子一切等物一服即出有虫即取下虫有積即取下積有氣即消了氣必效之藥加以硇砂甘遂尤妙如虛老之人用此推蕩後服四君子湯數帖尤好

木香三棱散 瑞竹治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑牽牛半生半炒

大腹子二錢

梔柳

雷丸

錫灰

三棱

蓬木

煙木香

二錢

大黃

三錢

右為末每服五錢用沙糖水調服先將燒肉一片口中細嚼吐出然後服藥

一方加阿魏一錢

蕪荑仁三錢

萬應丸 下諸虫

梔榔

五錢

大黃

八錢

黑牽牛

半生半炒

大腹子

二錢

梔柳

雷丸

錫灰

三棱

蓬木

煙木香

二錢

大黃

三錢

苦練根皮

一斤

皂角

十定把不蛀者

右先將皂角苦練根皮二味用水一大碗熬成膏子一處搜和前藥三味碾細末為衣先用沉香衣後用雷丸木香衣每服三丸四更時分用沙糖水送下

辰寸白虫 柴梔榔十箇向陽石榴皮七十片

右水煎露一宿以下虫為度

治吐虫有積 用黑錫皮梔榔末米飲調下

一方 治茶積 用花椒為末麪糊丸如梧子大每服十九茶湯送下


一方 治酒積面黑色腹脹不消

用甘遂一錢為末以猪槽頭肉一兩細切搗爛和末作一丸紙裹火煨令香熟取出臨卧細嚼酒嚥取出病根

○已上數方追虫取積之劑

龍會丸見膈痛

廣按積聚痞塊之症諸書所載皆以內為喜怒憂思悲恐驚七情所致此言良有以也但云五臟傳寇成積不無求之太過乎蓋人之氣血榮衛一身上下周流無時少息一旦七情感動五志之大火性炎上有升無降以致氣液水穀不能順序稽留而為積也必矣丹溪曰氣不成塊成聚塊乃有形之物痰與食積死血而成也在中為痰飲在右為食積在左為血塊誠然言也何以明之夫左關膽肝之位肝膽藏血液右關脾胃之位藏飲食所以左邊有積則為塊右邊有積則為食積而其中間則為水穀出入之道路五志之火薰蒸水穀而為痰飲所以中間有積而為痰飲也其理昭矣治法調其氣而破其血消其食而豁其痰是已如木香枳榔去氣積三棱莪术去血積麥芽神曲去酒積香附子枳殼去食積牽牛甘遂去水積山楂阿魏去肉積海粉礞石去痰積雄黃白礬去涎積乾姜巴豆去寒積黃連大黃去熱積各從其類也大抵積之初固為寒而積之久則為熱矣予今分辛溫辛平辛涼三例正欲人知新久之義爾抑嘗論之醫為病所困首惟陰虛之難補久積之難除玉山自倒陰虛之謂也養虎遺患久積之謂也嗚呼人之罹此二者須節慾以養性內觀以養神澹泊自如從容自得然後委之於醫不然雖張劉李諸子復生亦不能為我保也



丹溪心法附餘卷之十九

虛損門

發熱 八十四 附胃中煩熱 虛熱 虛煩不眠

丹溪心法

陰虛發熱証難治 戴云凡脉數而無力者便是陰虛也 四物湯加炒黃柏黃芩龜板兼氣虛  
加人參黃芩黃芩白朮 四物湯加炒柏是降火補陰之妙劑甚者必加龜板 噻酒人發熱難治  
不飲酒人因酒發熱者亦難治 一男子年二十三歲因酒發熱用青黛瓜姜仁入姜汁每日數  
匙入口中三日而愈 陽虛發熱補中益氣湯 手足心熱屬熱鬱用火鬱湯 傷寒寒熱當用表  
散 發熱柴胡惡寒蒼朮虛人用蒼朮恐燥 發熱惡風人壯氣實者宜先解表 發熱惡寒解表宜  
入方 蒼朮半兩片芩三錢 甘草一錢半

右為末湯浸炊餅丸服

治手心發熱 山梔 香附 或加蒼朮 白芷 半夏生用 川芎

右為末神麪糊丸服

治大病後陰虛氣鬱夜熱

酒芍藥一兩五錢五分 香附一兩 蒼朮半兩 炒片芩二錢 甘草一錢半

右為末炊餅丸

溫痰發熱

炒片芩 炒黃連半兩香附二兩半蒼朮二兩

右為末用瓜葉根丸

退勞熱食積痰

上甲 下甲 側柏 瓜蒌子 半夏 黃連 黃芩 炒柏

右為末炊餅為丸

胸中煩熱湏用梔子仁 有實熱而煩燥者亦用梔子仁 有虛熱而煩燥者宜參芪麥門冬白

茯苓竹茹白芍藥

若脉實數有實熱者

神芍丸

虛熱用黃芪止虛汗亦然又云肌熱及去痰者湏用黃芩肌熱亦用黃芪 如肥白人發熱宜人

參黃芪當歸芍藥浮小麥炒止虛汗同

補中益氣湯治虛中有熱或肌表之熱

治虛煩不得眠

六一散加牛黃

補中益氣湯

火鬱湯

升麻 葛根 柴胡 白芍藥各一兩 防風 甘草各五錢

右剉每瓦錢入連鬚葱白三寸煎稍熱服不拘時

神芍丸

見火類

附諸賢論

王節齋曰世間發熱證類傷寒者數種治各不同外感內傷乃大關鍵張仲景論傷寒傷風此外感也因風寒感於外自表入裏故宜發表以解散之此麻黃桂枝之義也以其感於冬春之時寒冷