

驗方新編卷二目錄

肩部

肩甲縫中積痛

擔肩癰癤

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

脫骨疽

甲疽 又名欺甲

灌甲初起

油灰指甲

指頭麻木痛癢

指頭畏冷

手足指頭羅紋生瘡

指頭生瘡

指甲下生瘡

十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身綠毛

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍

手丫枝痛不可忍

手指觸着衣物痛癢破爛

手指斷落

手被咬傷

手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已

手指手掌皮厚如鐵

掌中紅絲斷之血流不止

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

鵝掌風

手腕生物如豆紅紫疼痛

手臂生瘡腫大如拳

熱毒攻手腫痛欲脫

四肢節脫但有皮連不能舉動

手足作痛
手足生瘡久不收口

小兒手軟

腋部
肩下卽是

腋下腫硬形如鵝蛋
腋下疔瘡

腋下癭瘤
腋下狐臭

乳部

乳頭破裂
乳上濕瘡

乳頭生瘡痛不可忍
乳癰

乳癰多至二三百頭者
乳癰腫及頭面

乳癰日久腫痛不愈
乳癰久不收口

乳巖

男子乳忽壅腫如婦人乳

婦人乳忽縮入

婦人產後兩乳長細垂下

婦人乳內吹氣有聲

婦人乳孔塞痛

婦人乳汁不通

乳汁自流不止

乳多發脹

無子食乳腫痛難消

胸部

胸膈閉結不通

胸滿腹脹

胸前生孔

胸旁生瘡

龜胸

肋部

肋下生瘡久則有聲如嬰兒啼哭

驗方新編卷之二

肩部

擔肩癰癤

此惟擔夫有之

五倍子

燒存性

爲細末加黃丹

用水飛過

醋調敷之甚效

又方

照癰毒各方治之

肩甲縫中積痛

查中風筋骨各方治之

...

...

...

...

...

...

...

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

此症初起痛甚急用頭髮紮住指根取癩蝦蟆一個

目赤腹無

八字文者忌用

破去腸雜

不可破膽膽汁沾指更痛

將瘡頭套住用繩紮好並

將蝦蟆心肝焙枯研末沖酒服以免毒氣攻心約一對時

破口出膿而愈套住之後瘡頭猶如針刺痛更難忍甚至

心中難過遍身發熱或嘔吐惡心不必驚慌急服護心散

見癰毒諸方

或服麻油一盞

菜子油亦可

心自安定蝦蟆能拔極重

惡毒切不可輕易揭去忍耐片時自然破口出膿而愈倘

誤將蝦蟆揭去別藥難醫爲害不小去膿後如發昏暈亦

不必驚慌用高麗參三四錢以砂礮煮濃汁服之自然無事參不宜蒸一時蒸不出汁其色只如淡茶煎則其色濃厚易見功效無力者用好黨參一二兩煎服亦可愈後若再腫痛此毒氣未盡之故再用蝦蟆套上少頃膿盡卽不再發此瘡最爲陰惡此方極屬神效不可輕視

又方 鳳仙花

下半截連根用不用水洗

和甜酒糟搗融敷有人指頭

生瘡腫大如李痛不可忍用此敷之半日腫消痛止較蝦

蟆方尤爲神速

又方

用磁片將瘡刺破查照疔瘡方

內蜘蛛拔毒治之

見癰毒諸疾疔瘡門

止痛消腫最爲神效

又方

蜈蚣

焙枯爲末

猪膽調搽神效

又方 雞蛋一個穿一小孔人信石

壹分

套指頭上熱則

再換立刻止痛如神真仙方也較前各方功效更大

又方

雄黃

枯礬

各等分研末用麻油或醋敷亦極

效驗

又方

白蘿蔔搾孔入雄黃三分蒸半熟套指上

或用真烏梅仁嚼爛敷之均極效驗

又方

如色白者

照後脫骨疽陽和湯各方治之

脫骨疽

此症生手足各指

或云只生手足第四指者是

或生指頭或生指節指

縫初生或白色痛極或如粟米起一黃泡其皮或如煮熟

紅棗黑色不退久則潰爛節節脫落延至手足背腐爛黑

陷痛不可忍古方有截去指頭一法斷不可用宜用頂
大甘草研極細末用香麻油調敷要敷極厚一日一換不
可間斷忌食發物不出十日必愈真神方也再用金銀
花元參各叁兩當歸貳兩甘草壹兩水煎服一連十劑永
無後患藥味不可減少減則不效並忌抓擦爲要

又方大人用陽和湯小兒用小金湯重則用犀黃丸均見

陰疽色紅者照上蛇頭惡毒方治之此林屋山人百發百

中之方也又方甘草嚼融厚敷乾則隨換日夜不斷

數日必愈神效

甲疽

又名嵌甲

凡指甲邊生一赤肉突出時常舉發者甲疽也用狼毒壹

兩黃芪貳兩

醋浸一宿入猪油五兩微火上煎取二兩絞

去渣退火氣敷之日換三次神效此林屋山人方也

又方 乳香 膽礬 研細時時敷之此病須剔去甲不

藥卽愈若已成瘡久不愈者此方甚效

又方 皂礬

五錢火煨候冷研末

先以鹽湯洗瘡拭乾以礬末敷之

舊紬裏定一日一換神效或用枯礬亦可惟敷之微覺疼

痛 又方 陳皮濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手剪

去肉中爪甲外用蛇退燒灰雄黃壹錢爲末乾摻或香油

調敷 又方 輕粉 乳香 沒藥各壹錢 黃丹貳錢 赤石

脂五錢

寒水石

煨參錢

共爲末濕則乾摻乾則油調最妙

又方

甘草嚼融厚敷乾則隨換數日全愈神效

又方

見頭部頭角太陽生瘡方

灌甲初起

用磁鋒於甲上刨去一層並用枯礬末敷之其效如神

油灰指甲

每日取鳳仙花

又名指甲花

連根蒂葉搗敷指甲上用布包好

一日一換月餘乃愈此林屋山人方也

指頭麻木痛癢

取蜒蚰

查藥物備要便知

和銀硃共搗擦之若遲延不治必生蛇

頭蛙節等疔痛苦難受初起多擦几遍決不生矣

指頭畏冷

天氣不寒指尖作冷名曰螺瘡用醋和鹽調勻將指頭泡入自愈

手足指頭羅紋生瘡

生橄欖核

有鹽者煮去鹽味用

切兩段醋磨鷄毛蘸搽二十日後漸

消

指節生瘡

名曰蛙節生黃豆嚼融敷

須先漱口再嚼即愈

指甲下生瘡

名曰蛙甲治與上蛙節同

十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身綠毛

此名血餘症用

赤茯苓

白茯苓

胡黃連

各錢半

煎服

虎口並各手指縱生瘡或腫或爛痛不可忍若不早

治卽爛入手

大指二指間爲虎口又名叉指

生蒲公英搗融敷之數日卽愈

又方 生黃豆嚼融敷

將口漱盡再嚼甚效

又方 通草爲末用鷄蛋清調敷其腫卽消

又方 白芨

參錢研末

蟾酥

壹錢

共和鷄蛋清搽神效

又方 白芷 滑石 黃丹各等分研極細末敷之神效

手叉枝痛不可忍

通草研末生鷄蛋白調敷卽愈

手指縫觸着紙角衣角痛癢破爛

雖癢極難受斷斷不可抓擦務必忍住並忌沾水數日自

好倘一經抓擦則纏綿難愈用白芷黃丹滑石各等

分研極細末敷之神效或用玉真散

見跌打損傷門

敷之亦極效也

手指斷落

方見卷十三跌打損傷門

手被咬傷

方見卷十三人畜蛇蟲咬傷門

手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已內必有

蟲

猪肝切片和桃葉搥融敷之神效或用白油膏

見腿

貼之

更妙

手指手掌皮厚如鐵

苦參酒煎服外用苦參末酒敷極效如神

掌中紅絲斷之血流不止

用燈火燒之自能漸收平愈

手心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

此名穿掌又曰擎疽又曰托盤用生附子切片貼之或用