



應

急

藥

千金葆真散  
華陀愈風散  
婦人乳癟  
癩瘻要訣  
中火入耳內  
吞蟲初起  
牛刀熱瀉  
馬傷磕損  
諸骨梗

保產無憂散  
小兒初服方  
小兒胎熱  
眼生挑針  
日清金貫散  
中湯火初起  
蛇串瘡  
食魚中毒  
吞髮燒喉

加味芎歸湯  
睛風馬牙方  
嬰兒洗浴方  
止鼻血歌  
耳根紅腫歌  
喉痛難忍歌  
火毒攻心飲  
瘧疾奇方  
蛇虫咬傷  
誤吞螞蝗

衣胞不下  
翳風艾葉方  
稀豆方  
火牙疼痛  
耳心貫膿  
悞吞錢物  
惡犬咬傷  
中暑  
蜘蛛咬傷  
蚊咬人

化生湯  
夜啼方  
通脈方  
虫牙痛  
朽耳瘡  
錢卡喉  
大咬傷  
水瀉不止  
發癆方  
解藥毒  
惡虫傷  
竹木入肉

天保米微湯

如意丹

七厘散

點舌丹

諸毒散

治廉瘡

敗毒藥

除瘧散

益元散

金黃散

身中狐臭

吐血仙方

喉蛾散

咳嗽初起

潤肺膏

五淋散

固精丸

壯親丹

血崩方

小兒食洋煙

蟲積肚痛

諸風証

腎囊風

龜頭生瘡

大便不通

鼻中出血

寸金丹

長春丹

長壽酒

小兒口渴

牙疼

刺毒腫

眼中流淚

小便不通

大便不通

耳急

大傷寒

眼病

子入腸

小兒口渴

牙疼

大傷寒

龜病

湯火傷

小兒口渴

耳疼

胎前

重舌

雙蛾

小兒口渴

耳疼

胎前

口瘡

久痢

小兒口渴

耳疼

耳瘡

癰瘍

頭風痛

小兒口渴

耳疼

耳瘡

癰瘍

骨鰓

小兒口渴

耳疼

耳瘡

癰瘍

頭風痛

小兒口渴

耳疼

耳瘡

癰瘍

頭風痛

小兒口渴

耳疼

耳瘡

癰瘍

頭風痛

應驗藥方

千金葆真丸 子嗣一門悉用辛熱壯火之劑若施之氣虛精寒之人固所當然用於火旺精衰者不愈伐其陰乎予歷檢古方種子丸男女所宜常服平穩屢驗者開列於后耑治房勞太過腎氣虛衰精寒不能生子服是方者養精惜氣男女寡慾琴瑟友之自然多子

鹿角膠

六兩蛤粉炒成珠

杜仲

二兩水炒盐

胡蘆巴

一兩

山茱萸

一兩

熟地

二兩

故紙

一兩同胡蘆巴羊腎煮熟去羊腎焙干爲末

雲苓

兩

棗皮

各二兩

五味

五錢

益智

益水炒

遠志肉

甘草水製

川練子

酒煮去核

巴

載酒各

一兩

沉香

五錢

肉蓯蓉

酒洗四兩

枸杞

九製香附

各二  
兩

精流不痛者加魚膠

三兩  
蛤粉炒成珠

練密爲丸

此方不

用桂附壯火助陰純用溫養精血之味獨以沉香益智鼓其氤氳又以練子抑其陽引諸陽藥歸宿下元深得廣嗣之旨

### 神效保產無憂散

此方山陰胡公家傳其數十代無產厄及小產之患蓋有胎卽能安胎欲生卽能催生大凡懷孕之婦不必問以日月如果傷胎氣或腰酸腹痛只要一服卽安者見紅勢欲小產者亦一服卽安再服卽愈若十月滿足或臨盆難危者一服卽下倘遇橫生倒產或六七日不下或兒死腹

中產母命在須臾者亦一服卽下總之孕婦宜七個月服  
起七月服一劑八月服二劑九月服三劑十月亦服三劑  
臨產再服一劑諸事平安余見藥味分兩恐難記憶特編  
歌訣以記之其分兩務要過戥稱足如法炮製不可加減  
倘擅自加減懶於炮製則不應驗

歌訣

安胎芥八六枳殼 芎歸錢五七艾朴  
羌草生芪各五分 貝兔一錢錢二芍

荆芥穗八分 炒枳殼六分

川芎一錢

羌活五分

生箭芪五分 川貝母一錢去心

研末沖服

紫厚朴七分姜炒

五分

免絲子一錢 捣淨酒泡

當歸一錢 酒洗

七分

甘草

五分酒白芍一錢  
二分

生薑三片水二鍾煎八分若婦人有孕至二三月者不論  
有病無病皆可月服三兩劑但宜空心服若將臨盆或胎  
動不安以及勢欲小產者皆宜熱服虛極者加人參五  
分

加味芎歸湯

百試百驗萬叫萬靈真神方也

此方催生第一交骨不開用此方如神

當歸

一兩

川芎

七錢

敗龜板

手大一井醋炙研末

婦人髮

雞子白

蛋大一團瓦上焙存性

水二碗煎一碗服如人行五里卽生

死亦下

小兒衣胞不下不必服藥亦不必驚慌急用粗麻線將臍帶繫  
住又將臍帶雙折再繫一道以物墜住再將臍帶剪斷

過三五日自痿縮乾小而下試之屢效要與產母說明令其放心不必驚恐切不可聽信穩婆用手法取每有因此而傷生者慎之慎之

生化湯 無論有病無病產下卽服此方能治產後兒枕痛及惡露不行腹痛等症逐瘀生新永免一切產危或兩三日

內精神疲倦或腹中作痛再連服二三劑卽愈無不立效

全歸 八錢

川芎 四錢

乾薑 五分

桃仁 十粒去皮  
尖研碎水

一鍾童便一鍾煎服若惡而已行腹

痛已止減去桃仁多服三四劑不妨

華陀愈風散

治產後中風口噤手足抽掣

倒築吐瀉欲死等症

荆芥穗 陰根不用燒乾研末

荆芥穗 每服三錢童便調服口噤則

挑牙灌之斷噤則不研末只將荆芥以童便煎放微溫灌入鼻中卽愈其效如神

小兒下地時先服此藥永無驚風少生瘡疾

連翹

八分

金銀花

二錢

勾藤

一錢

虫退

七個去頭足

赤芍

六分

防風

八分

荆芥

一錢

薄荷

八分

甘草

四分

灯心引

加大黃尤妙

嬰兒臍風馬牙箇驗神方

枯礬

二錢五分

硼砂

五分

硃砂

三分

冰片麝香

各五厘

共爲細末凡嬰兒下地洗過卽用此末摻臍眼上每日換尿布時仍摻上此末摻完一料此兒永無臍風等症

尿布時仍摻上此末摻完一料此兒永無臍風等症

一治臍風用艾葉燒存性與滿臍中以稠絹包定 又方大蒜  
切片貼臍上用艾火炙之卽愈此方兼治撮口風大凡臍  
風肚腹必作青筋一道行至肚却生兩岔行至心不治必  
詳視其青筋兩岔盡頭處各炙灯火三五壯卽愈

通脈湯 治乳少或無乳

生箭芪一兩 當歸五錢 白芷五錢

用七孔猪蹄一對煮湯吹去浮油煎藥一大碗服之覆面  
睡卽有乳或未效再一服無不通矣

新產無乳者不用猪蹄只用水一半酒一半煎服體壯者  
如好紅花三分以消惡露

婦人乳漏 用蒲公英 金銀花 各五錢 甜酒二碗煎一碗熟

服汗出渣炒熱包患處神效如酒少者對水煎服

小兒胎熱身上濕爛 用泥蜂窩土細末摻上即效又方用草

房上青苔一乾未摻之方用蕎米粉擦摻尤效

要見下地候先以肥大川練子七個搗爛砂窩內煎濃透身洗

擦不生瘡疥 平常用此洗之至三五歲者川練子要十餘  
個可免痘瘡 出必稀真有奇效

癩痘神方

立春前一月將

蛋七個用麻布袋盛上用線掛好浸屎

桶內糞取一日

正蛋勿水洗埋土內三日須避人走立春日早用

磁罐煮三枚須糖心令易吃諸食宜少進恐飽不能食總三日內

吃完兒小者一二枚亦可食過三年重者必稀輕者不出

按痘皆父母遺毒今用屎浸消後天之毒用上理培先之氣又當立春回陽之候服之毒消痘稀必然之理也慎勿以穢而忽之

小兒夜啼青黛水研那之又方用五倍子研末口水調填臍中  
麻疹撮要賦

疹出於肺前人言之詳矣亦感天地邪陽火旺之氣而出  
其大概與痘相同且痘屬五經皆見之痘而疹獨居於肺  
何也疹未有不咳者咳肺之鬱火也疹多喉痛喉肺之竅  
也肺火上衝於喉故痛者啞之由也疹多腹痛大腸者

肺之腑也肺火衝突於內故腹痛疹多泄濁大腸者傳送之官也肺火下注故濁疹多喘喘者肺火太盛也疹多瘍者肺火之所蒸也疹症不一肺病獨多故善治疹者惟有清肺爲主諸症以兼治則恩過半矣

### 一發熱症治

疹毒一萌熱卽兆其先其熱與外感相同身熱咳嗽鼻塞聲重涕澀稠粘眼弦如醉惟以嗽爲憑嗽之重者疹亦重嗽之輕者疹亦輕其治法惟清肺涼血兼散風熱不宜用升麻生姜芫荽辛熱等升陽提火蓋火之輕者升之亦可解散火之重者不提而猶上竄一遇升麻生姜川芎芫荽

等必上炎而參陽位頭腫喉漏聲啞氣喘可立而待矣此治其常者也若遇舉惡之症毒火隱伏再服辛熱升提補滯等藥必致氣喘聲啞似出不出悶閉而死清金一貫飲雖非萬病回春之方果若未經誤治已至危絕等症決無有不百發百中者矣

## 清金一貫飲

桔芩大者三錢至五分中者二分半者一小者一錢半者二錢中者一錢半者二分半者一小者七分桔梗大者二分半者一小者七分牛蒡子大者二錢中者一錢半者二分半者一小者五七分荆芥大者二分半者一小者五七分北前胡大者二分半者一小者五七分淮木通大者二分半者一小者五七分白芍藥大者三分中者一小者五七分生甘草大者六分中者四分小者二分

火盛大便閉結加大黃

大者五 孙中者三 孙  
小者一 孙至二 孙

見點血熱加

生地者五分至一兩  
至五分小者三分

中者三  
五乃

大熱火盛口渴加石斛

大者五乃至一兩中者三  
亦至五及小者二乃至三

三日出齊加元參

小者至十五個粗大加大黃蟬退五個

深紅加大黃生地丹皮元參

千紅加大黃紫草牛地丹

皮桃仁紫草乃相  
仁一二乃相

氣喘加桑皮杏仁風寒閉肺加麻黃

一錢三日後疹已無恙獨

燒不退或經日久疹不散盡者

重加生地蟬退元參丹皮

鼻血歌

石柳花瓣可以寒

蘿蔔藕汁可以滴

火煅龍骨可以吹

水煎茅根可以喫

牆頭苔蘚可以塞

車前草汁可以滴

火燒連房可以吹

水調窩煤可以喫

故毡燒灰吹卽止

胎髮燒灰吹更奇

涼水濕脣齶卽止

韭汁京墨灌或吃

火牙疼痛用枝元一枚開一孔將雲鹽填滿火煅存性細末擦患處洗去又擦數次卽愈

虫牙疼痛用黃茄種燒擦之或花椒浸燒酒漱口亦可

火眼初起用黃連人乳同蒸點之服歸尾赤芍川芎京子薄荷

二羌活白芷生地各二分半黃芩菊花元參各一錢  
灯心引

取生挑針鼻尖上燒灯火一狀卽愈

耳根紅腫名耳寸用石灰水半盃桐油半盃合勻調敷患處

卽效

耳心貫叢用紅綾三寸舊色綢亦可燒過加乾石一錢胭脂銀

硃洋片各五分細末先用紙條入耳膿血拭淨吹入卽效

竹耳瘡 用黃連黃芩黃柏大黃名一錢細末加掃粉五分

復研調熟猪油先洗淨拭乾擦之擦頭上肥豬尤效

出入耳內用香油灌耳內卽出

口舌熱痛用莧菜頭燒灰存性加洋片細末擦之一方用黃連

浸水含漱飲之

喉痛飲食不下用扁竹根打碎煎湯含在口內三四次落下卽