

陳修園醫書五十種
三

R2-51

34-4

醫學三字經卷三

閩吳航陳念祖修園著

中風方

小續命湯。金千 中風總方。

麻黃

去節

人參

黃芩

川芎

白芍

炙草

杏仁

防己

桂枝

防風

各

錢

附子

五

加生薑三片。水二杯半。先煎麻黃至二杯。入諸藥煎八分服。

古今錄驗續命湯。治中風風痺。身體不能自收。持口不言。昏冒不知痛處。或拘急

不能轉側。

方出金匱附方

麻黃

桂枝

當歸

人參

石膏

乾薑

甘草

各三錢

川芎

五錢

杏仁

又十五粒

取三分之一

水三杯。煎一杯。溫服。當小汗。薄覆脊。憑几。汗出則愈。不汗更服。無所禁。勿當風。並

治但伏不得臥。欬逆上氣。面目浮腫。

三化湯。治熱風中臟。大便不通。

大黃

羌活

枳殼

各二錢

水二杯。煎八分服。

稀涎散。治中風口噤。並治單蛾雙蛾。

巴豆

六枚每枚分兩片

牙皂

三錢切

明礬

一兩

先將礬化開。却入二味攪勻。待礬枯爲末。每用三分吹喉中。痰盛者燈心湯下五。分。在喉卽吐。在膈卽下。

參附湯。元氣暴脫。以此方急回其陽。可救十中一二。

人參

一兩

附子

水二杯半。煎八分服。此湯治腎氣脫。以人參換白朮。名朮附湯。治脾氣脫。換

黃耆。名耆附湯。治衛氣脫。換當歸。名歸附湯。治營氣脫。

三生飲。治寒風中臟。四肢厥冷。痰涎上湧。

生烏頭

二錢

生南星

三錢

生附子

一錢

木香

五分

生薑

五片

水二杯。煎七分。薛氏用人參一兩。煎湯半杯調服。

防風通聖散。治熱風卒中。外而經絡手足癱瘓。內而臟腑二便閉塞。用此兩解之。

較之。三化湯較安。亦爲類中風實火治法。所用表藥火鬱發之之義也。所用下藥

釜下抽新之義也。

防風 荊芥 連翹 麻黃 薄荷 川芎 當歸 白芍 白朮 山梔 大

黃 芒硝 各五 黃芩 石膏 桔梗 各一 甘草 二錢 滑石 三錢

水二杯。加生薑三片。煎八分服。自利去硝黃。自汗去麻黃。加桂枝。涎嗽加

半夏五味

地黃飲子。治類中風腎虛。火不歸源。舌強不能言。足廢不能行。類中風虛火治

法。

熟地 山茱肉 遠志 巴戟天 石斛 石菖蒲 五味子 肉蓯蓉洗 肉桂

麥冬 附子 茯苓各一錢

加薄荷葉七葉。水二杯。煎八分服。此方法在輕煎。不令諸藥之味盡出。其性厚

重。以鎮諸逆。其氣味輕清。速走諸竅也。

補中益氣湯。治勞役飢飽過度。致傷元氣。氣虛而風中之。此類中風氣中虛證。

更有七氣上逆。亦名氣中。宜越鞠丸之類。

炙者錢二人參 白朮錢一 當歸錢各一 炙草 陳皮各五 升麻 柴胡各三

加生薑三片。大棗二枚。水二杯。煎八分服。

二陳湯。痰飲通劑。

陳皮五錢 半夏 茯苓錢各三 炙草一錢

加生薑三片。水三杯。煎七分服。加白朮一錢。蒼朮二錢。竹瀝四湯匙。生薑汁二

湯匙。名加味二陳湯。治類中風痰中證。亦名濕中。以濕生痰也。加枳實。膽南星。

竹茹名滌痰湯

加味六君子湯 治中風王道之劑

方見隔食

加麥冬三錢為君。附子一錢為使。再調入竹瀝五錢。生薑汁二錢。以行經絡之痰。

久服自愈。

資壽解語湯

治中風脾緩。舌強不語。半身不遂。與地黃飲子同意。但彼重在

腎。此重在脾。

防風 附子

天麻

棗仁

錢各一

羚羊角

肉桂

分各八

羌活

甘草

分各五

水二杯。煎八分。入竹瀝五錢。薑汁二錢。五分服。

喻嘉言治腎氣不榮於舌本。加

枸杞、首烏、生地、菊花、天冬、石菖蒲、元參。

侯氏黑散

錢金

治大風四肢煩重。心中惡寒不足者。外臺治風癰。

菊花

四兩

白朮

防風

兩各一

桔梗

八錢

細辛

茯苓

牡蠣

人參

礬石

當

歸 川芎

乾薑

桂枝

錢各三

黃芩

五錢

右十四味。杵為散。酒服方寸匕。

約有八分餘。每用一錢五分。

日二服。溫酒調服。忌一切魚肉大

蒜。宜常冷食六十日止熱。即下矣。

風引湯

錢金

除熱癰

治大人風引。小兒驚癰。瘈瘲。日數十發。

大黃 乾薑 龍骨 兩各二 桂枝 五錢兩 甘草 牡蠣 各一 寒水石 赤石脂 滑石

紫石英 白石脂 石膏 各三

右十二味研末粗篩以韋布盛之取三指錢約六七 井花水一杯煎七分溫服。按宜

附錄中風俗方殺人以示戒

俗傳中風方。風症以攻痰為大戒。凡人將死之頃。皆痰聲漉漉。不獨中風一症。元

陽無主一身之津血俱化為痰欲攻盡其痰是欲攻盡其津血也故錄此以為戒。

膽南星 寒膩大傷胃氣且能引痰入於心包肝膽以成積殼耗散元氣痰盛得此

癰疾製一二次者力尚輕若九製則為害愈酷 枳殼 暫開少頃旋而中氣

大傷痰 石菖蒲 能開心竅開則痰涎 半夏 此藥雖能降逆開結但與 秦艽 羌活

鈎藤鈎 天麻 羚羊角 防風 以上六味雖風證所忌但無要藥 天竺黃 真者

然亦治火 礞石 雖力弱風不足恃藥 牛黃 雖為風痰之妙藥然與膽南星石菖蒲枳

瀝同以薑汁和之 鐵之能輸布反致寒中敗胃之患等 甘草 雖為元老之才但與諸藥同

何如矣之 已上諸品。或作一方。或分作二三方。患者誤服之。輕者致重。重者即死。即倖免於

死。亦必變為癡呆及偏枯無用之人矣。戒之戒之。

虛癆方

歸脾湯。此方為補養後天第一藥。治食少不眠怔忡。吐血下血。大便或溏或秘。

妄夢健忘。七情所傷。遺精帶濁。及女子不月等證。

炙者三錢人參三錢白朮三錢棗仁炒黑當歸身一錢茯神一錢龍眼肉各二錢木香五分炙

草一錢遠志五分心分

水三杯。煎八分溫服。高鼓峰去木香加白芍一錢五分。甚妙。咳嗽加麥冬二

錢。五味七分。鬱氣加貝母二錢。脾虛發熱加丹皮。梔子。

六味地黃丸。壯水之主。以制陽光。凡一切吐血下血。咳嗽不眠。骨蒸遺精淋濁。屬

於陰虛者。無不統治之。

熟地八兩山萸肉二兩淮山藥各四兩丹皮二兩茯苓三兩澤瀉各三兩

研末。煉蜜丸。如桐子大。晒乾。每服三錢。淡鹽湯送下。一日兩服。加五味子。名都

氣丸。加麥冬。名八仙長壽丸。治咳嗽。本方改兩為錢。水煎服。名六味地黃湯。

八味地黃丸。益火之源。以消陰翳。治腰膝無力。飲食不進。腫脹疝瘕。陽痿遺精帶

濁。屬於元陽虛者。無不統治之。

即六味丸加附子肉桂各一兩。本方去附子。名七味丸。能引火歸源。本方去附

子加五味子。名加減八味丸。治大渴不止。本方加牛膝車前子。名濟生腎氣丸。

腎氣丸俗名金匱。治水腫喘促。本方減兩為錢。水煎服。名八味湯。

小建中湯

仲景

此方為治虛勞第一方。今人不講久矣。凡癆證必有蒸熱。此方有薑

桂以扶心陽。猶太陽一出。則燭火無光。即退熱法也。凡癆證必飲食日少。此方溫脾即進食法也。凡癆證必咳嗽。此方補土以生金。即治嗽法也。凡癆證多屬腎虛。此方補脾以輸精及腎。所謂精生於穀也。今人不能讀仲景書。反敢侮謗聖法。徒知生脈六味八味歸脾補中及欺冬貝母玉竹百合蘇陳替地黃炭之類。互服至死。誠可痛恨。

生白芍

三錢

桂枝

五分

炙甘草

一錢

加生薑

一錢五分

大棗

二枚

水二杯

煎八分

入飴糖

三錢五分

烱服

加黃耆

二錢

錢名黃耆

建中湯

治虛勞

諸不足

飽悶者

去大棗

加茯苓

二錢

氣逆者

加半夏

一錢

錢五分

此方人參

當歸白朮

俱隨宜加

之

金匱炙甘草湯

治肺燥

肺痿咽

痛脈代

等證

生地

四錢

桂枝木

一錢

阿膠

五分

炙甘草

二錢

人參

一錢

麥冬

二錢

棗仁

原方火

分錢五

加生薑

一錢

大棗

二枚

水二杯

酒半杯

煎八分

服

喻嘉言清燥救肺湯

治燥

氣鬱而

成癆

桑葉

經霜者去

人參

一錢

石膏

二錢

杏仁

去皮尖

甘草

二分

麥冬

一錢

枇杷

葉去毛蜜炙黑芝麻一分錢五

水二杯半煎八分熱服。痰多加貝母三錢。或加梨汁半盞。

金匱薯蕷丸。治虛勞諸不足風氣百疾。

薯蕷分三十當歸 桂枝 麴 乾地黄 豆黃卷分十甘草分八人參 阿膠分七

芎藭 芍藥 白朮 麥冬 杏仁 防風分各六柴胡 桔梗 茯苓分各五乾

薑分三白朮分二大棗分百右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大。空腹溫酒服一丸。一百丸為劑。分去二錢半

金匱大黃廔蟲丸。治五勞七傷虛極羸瘦。腹滿不能飲食。食傷憂傷房室傷飢傷勞傷。經絡榮衛傷。內有乾血。肌肉甲錯。目黯黑。緩中補虛。

大黃分十黃芩分二甘草分二桃仁分一杏仁分二芍藥分四乾漆分一乾地黄

右十二味末之煉蜜丸如小豆大。酒服五丸。日三服。

愚按以芫血之品為補血之用。仿於內經四烏鯁骨一蘆茹丸。張路玉以此丸藥

料及鮑魚入絨毛雞腹內。黃酒童便煮爛。汁乾將雞去骨取肉。同諸藥懸火上烘

乾為末。加煉蜜為丸。每服二錢。以黃酒送下。日三服。代廔蟲丸甚安。

乾為末。加煉蜜為丸。每服二錢。以黃酒送下。日三服。代廔蟲丸甚安。

咳嗽諸方

六安煎。岳景治外感咳嗽。

半夏二錢陳皮五錢茯苓二錢甘草二錢杏仁二錢白芥子一錢

加生薑七片水煎服。寒甚加細辛七分。愚每用必去白芥子加五味子乾薑

細辛。

小青龍湯。治一切咳嗽。

方見傷寒。方中隨寒熱虛實加減。惟細辛乾薑五味三藥不去。讀金匱者自知

加減小柴胡湯。治發熱咳嗽。

柴胡四錢半夏二錢黃芩各一錢炙甘草五分乾薑一錢五味子八分

水二杯半煎一杯半。去滓再煎八分溫服。一日二服。

五味子湯。金千治傷燥欬。唾中有血。牽引胸脇痛。皮膚乾枯。

五味子五分桔梗五分甘草五分紫苑茸各一錢續斷一錢竹茹一錢桑根皮一錢生地黃二錢

赤小豆一錢豆之細即赤

右九味。水煎空心服。祕旨加白蜜一匙。

愚按。赤豆易生扁豆五錢。圓圖不研。最能退熱補肺。但有寒熱往來忌之。去續

斷赤豆地黃。加葳蕤門冬乾薑細辛亦妙。

麥門冬湯 金千

治大病後。火熱乘肺。欬唾有血。胸膈脹滿。上氣消瘦。五心煩熱。渴而

便祕。

麥門冬

去二錢

桔梗

桑根皮

半夏

生地黃

紫苑茸

竹茹

各一錢

麻黃

七分

甘草

五分

五味子

研十粒

生薑

一片

右十一味。水煎。空心服。

瘧疾方

小柴胡湯

傷方見

一切瘧病俱治

痢證方

芍藥湯

行血則膿血自愈。調氣則後重自除。三日內俱可服。

白芍

當歸

各一錢

黃連

黃芩

各一錢

桂

四分

檳榔

一錢

木香

六分

甘草

四分

大黃

人不用

厚朴

一錢

枳殼

一錢

青皮

五分

水二杯。煎八分。溫服。

小便不利。加滑石。澤瀉。

滯澀難出。虛者倍歸芍。實者倍

大黃。

紅痢。加川芎。桃仁。

人參敗毒散。

喻嘉言最重此方。令微汗。則陽氣升。而陷者舉矣。此法時醫不講。余

每用此方。加陳倉米四錢。或加黃芩。黃連。屢用屢效。

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

枳殼

茯苓

桔梗

人參

已上各

甘草

分五
水二杯。加生薑三片。煎七八分服。加倉米。名倉廩湯。治噤口痢。

心腹痛及胸痺方

烏梅丸。傷方見治蟲痛。

蘇合香丸。治注痛。

拙著從衆錄有方論。又鬼注不去。宜虎骨鹿茸羚羊角龍骨各三錢。以羊肉湯

煎入麝香少許服。取腥羶之味。引濁陰之氣從陰而泄。此喻嘉言寓意草法也。

香蘇飲。治氣痛。一切感冒俱佳。

香附。二錢紫蘇葉。二錢陳皮。錢各一甘草。錢各一

加生薑五片。水二杯。煎八分服。心痛加元胡索二錢。酒一盞。

七氣湯。亦名四治七情之氣鬱逆。

半夏。厚朴。錢各三茯苓。錢各三紫蘇葉。一錢

加生薑三片。水二杯。煎八分服。

百合湯。治心口痛。諸藥不效。亦屬氣痛。

百合。一兩烏藥。三錢

水三杯。煎八分服。此方余自海壇得來。

失笑散。治一切血滯作痛如神。

五靈脂醋炒蒲黃各一兩

共研末。每服三錢。以醋湯送下。日二服。

桃仁承氣湯。治心腹痛。大便不通。其人如狂。屬死血。

桂枝二錢 姚仁去十七枚 大黃四錢 芒硝七分 甘草十分

水二杯。煎八分。去滓。入硝。一沸。溫服。

丹參飲。治心胸諸痛。神驗。婦人更宜。亦屬血痛。亦可通治諸痛。

丹參一兩 白檀香要真者。極細切片。各一錢。

水二杯。煎八分。服。

妙香散。這方精見

平胃散。治一切飲食停滯。

蒼朮厚朴 陳皮各二錢 甘草一錢

加生薑五片。水二杯。煎八分。服。肉積。加山查。麵積。加麥芽。萊菔子。穀積。加

穀芽。酒積。加葛根。砂仁。

二陳湯。中風見

十棗湯。治水飲作痛。峻劑。不可輕用。

大戟 芫花 炒 甘遂 各等分 研末

用大棗十枚。水二杯。煎七分。去滓。入藥方寸匕。約七分。服。次早當下。未下。再一服。服

後體虛。以稀粥調養。

理中湯。傷方見治冷痛。

吳茱萸湯。景仲治冷痛。通治食穀欲嘔。頭痛如破。煩躁欲死者。及大吐小已之證。

吳茱萸。湯景仲治冷痛。通治食穀欲嘔。頭痛如破。煩躁欲死者。及大吐小已之證。

水二杯。煎八分。溫服。

金鈴子散。治心口痛及脇痛。腹痛如神。

金鈴子。去核元胡索。各二兩

每服三錢。黃酒送下。

厚朴三物湯。金匱治心腹實痛。大便閉者。

厚朴。四錢大黃。二錢枳實。五錢

水二杯。煎八分。溫服。

厚朴七物湯。金匱

即前方加。桂枝。甘草。五錢生薑。二錢大棗。二枚

水二杯。煎八分。服。嘔者。加半夏一錢。寒多者。加生薑一錢五分。

附子粳米湯匱金

治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐

附子製二錢

半夏四錢

炙草一錢

粳米五錢

大棗二枚

水三杯煎八分溫服日夜作三服

大黃附子湯匱金

治脇下偏痛發熱脈緊弦者

大黃錢各三

附子細辛二錢

水二杯煎八分服

當歸生薑羊肉湯匱金

治心腹諸痛虛極諸藥不效者一服如神及脇痛裏急婦人

產後腹中疝痛

當歸七錢五分

生薑一兩二分

羊肉四兩

藥職秤方筋膜用

水五杯煎取二杯溫服一杯一日兩服

若寒多者加生薑五錢

痛多而嘔者

加橘皮五錢白朮二錢五分

括蕒薤白白酒湯匱金

治胸痺喘息欬唾胸背痛寸沉遲關上小緊

括蕒連皮子

薤白生如乾者用六錢

白酒三杯煎八分服

加半夏二錢

名括蕒薤白半夏湯治胸痺不得臥心痛徹背

大建中湯匱金

治胸大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛不

可觸近

川椒炒出汗乾薑四錢人參三錢

水二鍾煎一鍾去滓入膠飴四錢煎取八分溫服如一炊頃可食熱粥半碗

隔食反胃方

左歸飲景岳

即六味湯去丹皮澤瀉加枸杞炙草

啓隔飲恆心治食入即吐

川貝母一錢五分沙參三錢丹參二錢川鬱金五分乾荷蒂三個砂仁殼四分枳

頭糠三錢茯苓五錢石菖蒲四分

水二杯煎一杯服

大半夏湯金匱治胃反

人參二錢半夏俗用明礬製者不可用只用薑水浸三日一日一換搗起蒸熟切片曬乾四錢

長流水入蜜揚二百四十遍取二杯半煎七分服

吳茱萸湯方見心痛

六君子湯此方爲補脾健胃祛痰進食之通劑百病皆以此方收功

人參 白朮炒茯苓 半夏各二錢陳皮 炙草各一錢

加生薑五片大棗二枚水二杯煎八分服治反胃宜加附子一錢丁香藿香砂

仁各一錢。

附子理中湯。治反胃。

即理中湯加附子三錢。治反胃宜加茯苓四錢。甘草減半。

附隔食方法

人鏡經曰。內經云。三陽結謂之隔。蓋足太陽膀胱經水道不行。手太陽小腸經津液枯槁。足陽明胃經燥糞結聚。所以飲食拒而不入。縱入太倉。還出喉嚨。夫腸胃一日一便。乃常度也。今五七日不便。陳物不去。新物不納。宜用三一承氣湯。節次下之後。用脂麻飲啜之。陳腐去而腸胃潔。癥瘕盡而營衛昌。飲食自進矣。

三一承氣湯

大黃 芒硝 甘草 厚朴 枳實 各一錢

水二杯煎八分服。按此方太峻。姑存之以備參考。

氣喘方

蘇子降氣湯。治上盛下虛氣喘等證。

紫蘇子二錢炒 前胡 當歸 半夏 陳皮 厚朴各一錢 沉香 炙草各五分

加生薑三片。大棗二枚。水二杯煎八分服。

葶藶大棗瀉肺湯金匱。治支飲滿而肺氣閉。氣閉則呼吸不能自如。用此苦降以泄。