

R253.2

12-2

金匱要畧淺註

目錄

第一卷

臟腑經絡先後病脉第一

瘧濕暍病脉證第二

第二卷

百合狐惑陰陽毒病脉證第三

瘧病脉證第四

金匱要略卷之五
中風歷節病脉證第五

第三卷

血痺虛勞證治第六

肺痿肺癰欬嗽上氣脉證第七

第四卷

奔豚氣病證治第八

胸痹心痛短氣脉證第九

腹滿寒疝宿食脉證第十

五臟風寒積聚脉證第十一

第五卷

痰飲欬嗽脉證第十二

消渴小便不利淋病脉證第十三

第六卷

水氣脉證第十四

第七卷

黃痺證治第十五

驚悸吐衄下血胸滿瘀血脉證第十六

第八卷

嘔吐噦下利脉證第十七

瘡癰腸癰浸淫脉證第十八

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲脉證第十九

第九卷

婦人妊娠脉證第二十

婦人產後脉證第二十一

婦人雜病脉證第二十二 附婦人陰挺論

第十卷

雜病方第二十三

禽獸蟲魚禁忌第二十四

果實菜穀禁忌第二十五

金匱要畧淺註卷九

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園註

男

元蔚古愚全校字

婦人妊娠病脈證治第二十

師曰婦人

經斷後而

得平

和之脈

陰其後為

陰脈

視關前

小弱

是胎元蝕氣也

其人渴

非上火焦有熱乃

不能食

胃非

家有病乃惡

無寒熱

外無表邪也

名曰

妊娠

凡溫涼補切

婦人妊娠脈

馮之劑皆未
畫善。唯以桂枝湯主之。於法六十日。胎氣成。

當有此證。設有醫者。不知為孕。而治之逆者。

却

一月

先見此

加吐

下者

常明告其一誤。不可

則絕之

有易所謂勿藥

尤在淫云。平脈脈無病也。即內經身有病而

無邪脈之意。陰脈小弱者。初時胎氣未盛。而

陰方受蝕。故陰脈比陽脈小弱。至三四月經

血久畜。陰脈始強。內經所謂手少陰脈動者。

妊子千金所謂三月尺脈數是也。其人渴，妊
子者，內多熱也。一作嘔，亦通。今妊婦二三月，
往往惡阻，不能食，是也。無寒熱者，無邪氣也。
夫脈無故而身有病，而又非寒熱邪氣，則無
可施治。惟宜桂枝湯和調陰陽而已。徐氏云，
桂枝湯外證得之，為解肌和營衛，內證得之，
為化氣調陰陽也。今妊娠初得，上下本無病，
因子室有疑，氣溢上下，故但以芍藥一味固

其陰氣使不得上溢。以桂甘薑棗扶上焦之陽。而和其胃氣。但令上之陽氣充。能禦相侵之陰氣足矣。未嘗治病。正所以治病也。否則以渴為熱。邪而解之。以不能食為脾不健而燥之。豈不謬哉。六十日當有此證者。謂妊娠兩月。正當惡阻之時。設不知而妄治。則病氣反增。正氣反損。而嘔瀉有加矣。絕之。謂禁絕其醫藥也。婁全善云。嘗治一二婦惡阻。病吐。

前醫愈治愈吐。因思仲景絕之之旨。以炒糯
米湯代茶。止藥月餘。漸安。又一本絕之謂
當斷絕其病根。不必泥於安胎之說。而狐疑
致誤也。亦通。

婦人

行經時。經未淨。或遇冷氣。房事。六淫邪氣。冲斷其經。則餘血停滯。凝聚成塊。結於胞中。

名為

宿有癥病。

或不在子宮。則仍行經而中。病如宿有癥病。受孕。經斷。即是孕矣。乃經

斷未及三月。而得漏下不止。胎養則輒動。動若在

臍下。則胎真臍上者。此為每月湊集。癥氣痞阻。欲落矣。今動。

其不於害。其血無所入而下。漏。其實非胎病

胞之為證。必由今之三月。上。有胎與血之異。欲

知其的。證。必由今之三月。上。有胎與血之異。欲

前之三月。統共。以六月為準。若妊娠六月動者。

問而前三月經水。順利。應時。而無前後參差。其

知其前三月經水。順利。應時。而無前後參差。其

胎也。若前之三月。其期經水。下血者。乃後斷三

月。所積血。而非也。然既。有胎。何以又為漏下。而

入。胞。養。胎。而。所以血不止者。其癥不去故也。不

下。走。不。止。所以血不止者。其癥不去故也。不

去。則。胎。終。當下其癥。以桂枝茯苓丸主之。

不安。必。胎。終。當下其癥。以桂枝茯苓丸主之。

此為妊娠宿有癥病。而出其方治也。

此為妊娠宿有癥病。而出其方治也。

此為妊娠宿有癥病。而出其方治也。

此為妊娠宿有癥病。而出其方治也。

桂枝茯苓丸方

桂枝

茯苓

丹皮

桃仁

去皮尖熬

芍藥

各等分

右五味末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服

一丸不知加至三丸

婦人懷妊六七月脈弦發熱有似表證其胎愈脹乃

與身不腹痛背不惡寒而至少腹陣陣作如被

扇所以然者子臟開而冷之氣乘之故也夫臟

入。其陰內。勝則其弦為陰氣。而發熱且當以附為格陽矣。胎脹者熱則消。寒則開也。

子湯溫其臍

此為胎脹少腹如扇者出其方治也。

李氏云子臍即子宮也。臍下三寸為關元左

二寸為胞門。右二寸為子戶。昔人謂命門為

女子繫胞之處。非謂命門即子臍也。金匱明

明指出少腹何荒經者之聚訟紛紛也。

師曰婦人有漏下者。妊娠經來俗謂之激經也。有四五月墜胎謂之半

產。半產後。傷其血海。因續下血都不絕者。有妊娠下

血者。如前之因癥。假令妊娠。無癥而下。腹中痛

者。者固。為胞阻。胞阻者。胞中之氣血不。膠艾湯主之

則而。推而。言之。凡婦人經水淋瀝。及胎產前後。下血

不止者。皆衝任脈虛。陰氣不守也。此方皆可補

之。而固。此為胞阻者。而出其方治也。然此方為經水

不調。胎產前後之總方。

膠艾湯方

乾地黄

六兩

川芎

阿膠

甘草

各二兩

艾葉

當歸

各三兩

芍藥

四兩

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓內膠令消盡溫服一升日三服不差更作

婦人懷孕腹中疝痛當歸芍藥散主之

此為懷妊腹中疝痛者出其方治也

徐忠可云疝痛者綿綿而痛不若寒疝之絞痛血氣之刺痛也乃正氣不足使陰得乘陽

而水氣勝土。脾鬱不伸。鬱而求伸。土氣不調。則痛綿綿矣。故以歸芍養血。苓朮扶脾。澤瀉瀉其有餘之舊水。芍藥暢其欲遂之血氣。不用黃芩。疔痛因虛。則稍挾寒也。然不用熱藥。原非大寒。正氣充。則微寒自去耳。

當歸芍藥散方

當歸

芍藥

各三兩

芍藥

一兩

茯苓

白朮

各四兩

澤瀉

半兩