

醫統正脈全書

二八

傷寒論十卷目錄

卷第一

辨脉法

平脉法

卷第二

傷寒例

辨痊濕喝脉證

辨太陽病脉證并治法上

卷第三

辨太陽病脉證并治法中

卷第四

辨太陽病脉證并治法下

卷第五

辨陽明病脉證并治法

辨少陽病脉證并治法

卷第六

辨太陰病脉證并治法

辨少陰病脉證并治法

辨厥陰病脉證并治法

卷第七

辨霍亂病脉證并治法

辨陰陽易差後病脉證并治法

辨不可發汗病脉證并治法

辨可發汗病脉證并治法

卷第八

辨發汗後病脉證并治法

辨不可吐

辨可吐

卷第九

辨不可下病脉證并治法

辨可下病脉證并治法

卷第十

辨發汗吐下後病脉證并治法

傷寒論藥方目錄

卷一

無方

卷二

方六道

桂枝湯

桂枝二越婢一湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

卷三

方二十七道

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍

乾薑附子湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚樸生薑半夏甘草人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子厚樸湯

梔子乾薑湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

桃核承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

抵當湯

抵當圓

卷四

方一十九道

大陷胃圓

大陷胃湯

小陷胃湯

文蛤散

白散

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

傷寒論
目錄
二
大黃黃連瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭石湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃連湯

桂枝附子湯

甘草附子湯

白虎湯

炙甘草湯

卷五

方十道

大承氣湯

小承氣湯

猪苓湯

蜜煎導方

猪膽汁方

茵陳蒿湯

吳茱萸湯

麻仁圓

梔子蘂皮湯

麻黃連軀赤小豆湯

卷六

方二十道

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花湯

猪膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

真武湯

通脈四逆湯

四逆散

烏梅圓

當歸四逆湯

麻黃升麻湯

乾薑黃芩黃連人參湯

白頭翁湯

卷七

方五道

理中圓

理中湯附

燒裨散

枳實梔子湯

牡蠣澤瀉散

竹葉石膏湯

卷八

無方

卷九

無方

卷十

無方

此下二十五方雖於隨證下有之緣多以加減爲文似未詳備故復載方在末卷

桂枝加葛根湯

桂枝加厚樸杏子湯

桂枝加附子湯

尤附湯方附

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝一麻黃一湯

白虎加人參湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

已上九方證
在第二卷

葛根加半夏湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

柴胡加芒硝湯

桂枝加桂湯

已上六方證
在第三卷

柴胡桂枝湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

已上五方證
在第四卷

桂枝加大黃湯

桂枝加芍藥湯

四逆加吳茱萸生薑湯已上五方證
在第六卷

四逆加人參湯

四逆加豬膽汁湯方已上五方證
在第七卷

已上十卷內計方一百一十二道

此經方劑並按古法錙銖分兩與今不同謂如呶咀者

卽今之剉如麻豆大是也云一升者卽今之大白盞也

云銖者六銖爲一分卽二錢半也二十四銖爲一兩也云三

兩者卽今之一兩云三兩卽今之六錢半也料例大者

只合三分之一足矣

注解傷寒論卷六

江陰朱氏校刊本

漢張仲景述

王叔和撰次

成無已注解

辨太陰病脈證并治法第十

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若

下之必胃下結鞭

太陰為病陽邪轉裏也太陰之脈布胃中邪氣壅而為腹滿上不得降者

嘔吐而食不下下不得上者自利益甚時腹自痛陰寒在內而為腹痛者則為常痛此陽邪干裏雖痛而亦不常痛但時時腹自痛也若下之則陰邪留於胃下為結鞭經曰病發於陰而反下之因作痞

太陰中

風四肢煩疼陽微陰澁而長者為欲愈

太陰脾也主營四末太陰中風

四肢煩疼者風淫末疾也表邪少則微裏向和則澁而長長者陽也陰病見陽脈則生以陰得陽則解故云欲

愈太陰病欲解時從亥至丑上

脾為陰土王於丑亥子向王故為解時太

陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯

經曰浮為在表沉為在裏太陰病脈浮者邪在

經也故當汗解之

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫

之宜服四逆輩

自利而渴者屬少陰為寒在下焦自利不渴者屬太陰為寒在中焦與四逆等

湯以溫其藏

傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當

發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下

利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也

太陰病至七八

日大便鞭者為太陰入府傳於陽明也今至七八日暴煩下利十餘行者脾家實腐穢去也下利煩躁者死此以脾氣和逐邪下泄故雖暴煩本太陽病醫反下之因下利日十餘行而利必自止

爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之

表邪未罷醫下

之邪因乘虛傳於太陰裏氣不和故腹滿時痛與桂枝湯以解表加芍藥以和裏

大實痛者桂

枝加大黃湯主之

大實大滿自可徐下之故加大黃以下大實

太陰為病脈

弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人

胃氣弱易動故也

腹滿痛者太陰病也脈弱其人續自便利則邪雖在裏未成大實欲與大

黃芍藥攻滿痛者宜少與之以胃氣尚弱易為動利也

辨少陰病脈證并治法第十一

少陰之為病脈微細但欲寢也

少陰為病脈微細為邪氣傳裏深也衛氣行於

陽則寤行於陰則寐邪傳少陰則氣行於陰而不行於陽故但欲寐

少陰病欲吐不吐心