

腎囊醫訣卷二

論腎炎症七章

外腎之炎分新舊二種或由附肉或由腎本體由腎本體者或因撞碍而起或因自起間有其炎全在本體間有能傳至附肉及夾膜腎之炎症更恒由他處遞累其炎由溺管而入精管由精管而傳及于附肉此類之炎先時附肉更常有病而傳至于夾膜腎之炎罕有累及之

論新起炎症

新起之炎罕有剖驗因此症鮮致命今將經剖驗者之形狀
略言之夾膜之中明汁多少不定或有硝質雜紅血水使夾
膜相粘其相粘不甚堅固以指託之則開夾膜有血管甚多
密纏如網經不幾天其血管則由夾膜之面而入明汁之內
其腫非由腎體乃由附肉及夾膜若割裂腎肉其色略黑因
血多故也附肉有腫多在尾若經腫二三次則有倍大按之
覺有堅緊其腫乃胞膜包精管所流之明汁色若灰燼精管
腫厚是處血管亦腫脹精管或由溺管至腎時有明汁多流

入于胞膜牽挽腎系蜿蜒之處致其腫大曾有腎炎經二十
六日其炎由墜精而起繼則嘔吐泄瀉而歿剖視其中惟附
肉尾有炎症之狀而已有一處腫其大如豆剖視之其內色
黃此卽精管之明汁及裏精囊之物以顯微鏡視之黃色中
有數物內多油珠亦有炎症結成之輪亦有膿之輪外之精
管及中之胞膜無物流出或精管塞密不能復開或明汁流
入精管後血流入以成肉質

前論夾膜有炎能累及于附肉不能累于腎體附肉有炎隨

卽傳于夾膜腎設有炎罕及于夾膜若腎本體受炎經未久者鮮有腫脹其腫乃漸而不速何也因其單膜堅固不能速開夾膜亦不能起炎此種之炎時或致生膿附肉之炎罕生膿然人不可以附肉之炎爲不累于腎但有者鮮耳

腎炎罕致生膿若致生膿其單膜堅韌膿不易出必亂流于腎內致壞腎肉或蓄聚一所成爲膿瘡此瘡炎退其膿水或流散于週身其焦枯成片者常存于患處剖視之每悞認爲酒墨稿若細察之則可別枯膿成片常在袋內可以取出酒

墨稿無物包裹獨粘依于中處精管之所又有一種與枯膿相似乃舊炎症所流出其色黃而硬流入腎內若要別舊炎症枯膿在袋中易折而碎黃硬之物則無所裹與小精管相粘不能取出其質韌不易折斷腎內若有枯膿其炎不時常欲再作痛亦常存于附肉之間均能起炎生膿務要細心防護不然或由此炎變成膿瘡常聚于附肉之尾胞膜之中精管及向上行之處此處若破壞其膿必由囊下而出腎炎間或能致腎肉潰爛曾有某者身體虛弱久致溺管變窄之患

繼而染腎炎因久痛不止醫者以刀少割有膿少許從割口流出腎中一穴穴外潰爛色黑臭不堪近以顯微鏡視之黑色者乃精管中有氣之泡後其腎由割口而出繼而腹中夾膜生炎而歿剖驗其腎潰爛過半附肉竟無病

腎炎若愈腎體常可復元如舊若炎有大關係者其患多端不能卽止間有于腎之隔膜分出之線變大腎肉精管變狹而小腎肉有數分變成堅硬肉絲中無精管此乃明汁流入精管之隙胞膜之處不能轉迴于身變成堅硬之肉絲其小

精管自爲壅塞或變肉絲或變消亡間有兩腎俱消因大關係炎症所致者前論已言炎症能使腎消亡然而附肉之炎苟不調理至死其病形猶存略似結繩之狀其腫常在附肉之下因明汁常浸漬其間是處乃精管蜿蜒之所時有精管腫脹過大或大至四倍五若腫脹乃由更上之精管或全塞其腫處蓄精甚多間有久致在附肉之尾當中之處有堅韌之灰質若遇附肉有此狀或夾膜常粘此類在腎系之精管亦過厚鮮遇腎有病形

腎致炎有數端或跌磕或踢傷或馳馬被鞍觸礙或兩腿挾
緊所壓或房事未竣而中止更有多端不能盡述

時有由疝腮將愈而腎起炎是炎不甚重然亦宜用法調理

疝腮經

七

八天而起腎炎其炎日重一日至

五

六天則漸輕

其炎恒在腎罕見于附肉附肉若有炎其炎比腎更輕罕見
病形如由墜精而致腎炎則腎系有時畧腫疝腮腎炎多見
于二十歲至四十歲亦曾有尙少者年十四歲又有一四十
五歲者其腎雖有炎症其疝腮之炎亦無稍異腎之炎常在

一邊疔腮之炎多在兩邊但歷見腎因疔腮受炎廿三人炎在右邊者十三人在左邊者六人左右悉有者四人間有腎得炎疔腮則不起或云腎遇疔腮之炎時或能消亡間果有之人多信焉嘗有某者年四十歲先致疔腮症至第四日早晨其腎將腫迨五日則腫甚右邊更大於左至腎炎全止後右腎因先時之炎略重愈久愈消惟存薄袋及夾膜單膜而已又一年廿五歲亦致此症其疔腮將愈時腎卽發炎其炎一邊略重後其炎止視之則消亡迨半後不復大

外腎之炎或因感冒而起者其狀似風濕此類之炎於早晨
略輕午晚則重多見於先時本有風濕之人其起速而愈亦
速炎在夾膜及單膜起時熱甚痛甚不堪按腫不甚大或能
由左而右其得愈之速似將起之速無異狀也若他處之風
濕遷徙不定曾有某者年廿八歲致脊骨風濕痛症愈時右
腎輒腫而痛又一人兩膝亦致風濕而腫腫將消時偶因感
風寒右腎遂發炎症至第五日則傳及于左腎但此症亦僅
有焉

又有一種腎炎由痘而起其炎因何處而發乃由腎內流出明汁似出痘時明汁流入于肺此見極罕或言訛傳

前言腎炎多由他處遞累由本體者鮮耳腎精管與溺道互相合接內之皮插入于溺道或防碍何物則不安由溺道近精管而入使腎不安而起炎由墜精其炎能傳入精溺總管之處抑或溺管變窄管外受病延至精管抑或不合之物入于溺管如砂淋之症抑破通溺管碍及膀胱之蒂或膀胱下精囊受病房事或手淫致膀胱蒂中溺管有病或因割取石

淋傷碍其蒂此數端皆能致膀胱中溺管有病或因割取石
淋傷碍其蒂此數端皆能致炎炎由溺管至精管入腎而發
炎細查其故由墜精而起者更多

墜精之症不論當病之中抑將愈其附肉皆能發炎常于將
愈時流出之膿比前更少其病略止腎則起炎若腎有炎其
膿卽止溺時之痛亦止抑或減輕腎炎若止溺管之痛及流
膿常能復苦如前或曰溺管之炎卽時傳入于腎若是者鮮
矣苟細心問病者及摸索則可知其炎由精管漸漸而入有

某醫者經閱附肉之炎七十三人腎炎發時墜精則稍安又有醫者經閱八十一人中有五十八人腎發炎時膿流則稍減又一醫者閱二十九人中有六人腎發炎膿流無稍減亦無增痛其廿三人變欸不一有發炎時膿稍減者有增多者有全止者其變或值炎將起時或值將愈時或值炎將止時仍然墜精與前稍異中有三人腎炎止墜精復來較前更多有一醫云曾遇腎有重炎其膿出更多亦有他欸墜精得愈腎則發炎炎起墜精則復來炎稍愈墜精亦稍愈炎重膿流

亦增重夫腎炎而墜精止者亦猶吊膏引炎外出之意矣
間有墜精附肉之炎有時非由精管而入乃由附肉本體自
起此欸能傳至他處此炎或非由精管而入如前所云由附
肉而起曾歷一百零四人附肉之炎墜精而起者非由精管
入者三十一人由精管而入者七十三人醫者多謂附肉之
炎多因墜精速愈之故緣服畢澄茄及哥拜把或因射藥故
墜精速愈致有附肉之炎妄謂此藥之害誠非宜也惟是此
藥宜于當病之中試觀不服此藥之人比曾服者其炎更重

苟射藥得宜亦免發炎之患設用藥不得宜或過濃或頻速而射此或能發燒或膿立止是有危險使腎能發炎治墜精若若不得宜延緩至久此更常致附肉有炎有醫者言墜精若愈久則有危能使附肉發炎可知腎炎非由墜精之始

墜精經久或溺道變窄或膀胱蒂之核有病夜間陽常舉而不痿有似慾恣難禁而有遺精之患此類雖遇小故腎輒欲發炎或因按拭或因馳馬或因飲酒或因不以袋帕護炎常因此而起間有人之本性腎易發炎遇墜精時卽發炎雖小

心保護亦難免間有墜精數次腎不見炎細究其故腎之炎非因墜精過重而起每見于瘰癧者斯易致炎或先時墜精不甚重惟難得愈此常變爲舊炎症雖愈亦常復作壯者墜精雖重常可速愈罕有關要以致腎炎抑溺道變狹等症附肉之炎右多于左曾歷一百三十八人在右者七十八左者四十九左右俱有者十一附肉之炎若由溺管舊症傳入者則左右常皆有之

論病形勢