

本草綱目草部目錄第十二卷

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根

亥柔交于剛而成枝幹葉萼屬陽華實屬陰由是草

中有木木中有草得氣之粹者為良得氣之戾者為

毒故有五形焉金木水火土五氣焉香臭臊腥五色焉青黃赤白黑

黑五味焉酸苦甘辛鹹五性焉寒熱溫涼平五用焉升降浮沉

農嘗而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋明賢良醫代

有增益但三品雖存淄澠交混諸條重出涇渭不分

苟不察其精微審其善惡其何以權七方衡十劑而

寄死生耶于是翦繁去複繩繆補遺析族區類振綱

分目除穀菜外凡得草屬之可供醫藥者六百一十

種分爲十類曰山曰芳曰隰曰毒曰蔓曰水曰石曰

苔曰雜曰有名未用

舊本草部上中下三品共四百四十七種今併入三十一種移

二十三種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木部移併一十四種蔓草二十九種菜部移併一十三種果部移併四種外類有名未用共二百四十七種

神農本草經一百六十四種

梁陶弘景註

名醫別錄一百三十種

陶弘景註○七十種有名未用

李氏藥錄一種

魏李當之

吳氏本草一種

魏吳普

唐本草三十四種 唐蘇恭

藥性本草一種 唐甄權

本草拾遺六十八種 唐陳藏器

食療本草二種 唐孟詵

海藥本草四種 唐李珣

四聲本草一種 唐蕭炳

開寶本草三十七種 宋馬志

嘉祐本草一十七種 宋馬志

圖經本草五十四種 宋蘇頌

呂華本草七種 宋人大明

用藥法象一種 元李杲

本草補遺一種 元朱震亨

本草會編一種 明江機

本草綱目八十六種 明李時珍

附註 宋雷斅炮炙論

北齊徐之才藥對

唐楊損之刪繁

唐孫思邈千金

蜀韓保昇重訂

南唐陳士良食性

宋寇宗奭衍義

唐慎微證類

陳承別說

金張元素珍珠囊

元王好古湯液

吳瑞日用

明汪穎食物

王綸集要

陳嘉謨蒙釜

憲王救荒

齊原食鑑

草之二

山草類上三十一種

甘草

本經

黃耆

本經

人參

本經

沙參

本經

薺芩

別錄

桔梗

本經

長松

拾遺

黃精

別錄

菱麤

本經

委蛇附

知母

本經

肉蓯蓉

本經

列當

開寶

瑣陽

補遺

赤箭天麻

本經

木

本經

狗脊

本經

貫衆

本經

巴戟天

本經

巴棘附

遠志

本經

百脉根

唐本

淫羊藿

木經

仙茅

開寶

玄參

木經

地榆

木經

丹參

木經

紫參

本經

王孫

木經

紫草

本經

白頭翁

木經

白及

本經

三七

綱目

右附方舊八十六新二百六十

本草綱目草部第十二卷上

草之一 山草類三十一種

甘草

本經上品

釋名蜜甘

別錄

蜜草

別錄

美草

別錄

路草

別錄

靈通

珠

記事

老

別錄弘景曰此草最為衆藥之主經方少有不

非

君而為君所宗是以能安和草石而解諸毒也

甄權

曰諸藥中甘草為君治七十二種乳石毒解

一千二百般

草木毒調和

泉藥

有功故有國老之號

集解

別錄曰甘草生河西川各積沙山及上郡二

西上郡今不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸遂
中來赤皮斷理看之堅實者是抱手草最准抱手

乃西羌地名亦有炙乾者理多虛疎又有如鯢
魚腸者破刀破不復好青洲聞有面不如又有紫
甘草細而實乏時亦可用蘇頌曰今陝西河東州
郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開
紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺
粗細不定皮赤色上有橫梁梁下皆細根也采得
去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實斷
理者爲佳其輕虛縱理及細嫩者不堪惟貨湯家
用之謹按爾雅云薑大苦郭璞薑似地黃又詩唐
風云采苓采苓首陽之巔是也薑與苓通用首陽
之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先
儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎李時
珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅薑大苦之註
爲甘草者非矣郭璞之註乃黃蘗也其味極苦故
謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺
但葉端微尖而糙濇似有自毛結角如相思角作
一本生至熟時角折子扁如小豆極堅齒嚙不破
今出河東西界寇氏衍義亦取此說而不言大苦

非其也。以理度之。郭說形狀殊不相類。沈說近之。今人惟以大徑寸而結緊斷文者為佳。謂之粉

草。其輕虛細小者皆不及之。鎔積非雪。錄言安南甘草大者如柱。土人以架屋。不識果然否也。

根修治

雷斅曰：凡使須去頭尾尖處。其頭尾吐入每用切長三寸。擘作六七片。入甕器中盛。

用酒浸蒸從巳至午。取出暴乾。剉細用一法。每斤用酥七兩塗炙。酥盡為度。又法：先炮令內外赤黃。

用時珍曰：方書炙甘草皆用長流水蘸濕炙之。至熟刮去赤皮。或用漿水炙熟。未嘗酥炙酒蒸者大

底補中宜炙用。瀉火宜生用。

氣味甘平無毒

寇宗奭曰：生則微涼。味不佳炙則溫。王好古曰：氣薄味厚。升而浮陽。

也。入足太陰厥陰經。時珍曰：通入手足十二經。徐之才曰：木苦參乾漆為之。使惡遠志及大戟草。

花甘遂海藻。權曰：忌猪肉。時珍曰：甘草與藻戟遂

芫四物皆反而胡洽居士治痰癖以十棗湯加甘

草大黃乃是痰在腸上欲令通泄以援去病根
東垣李杲治項下結核消腫潰堅湯加海藻丹溪
朱震亨治勞瘵蓮心飲用芫花一方俱有甘草皆
本胡居士之意也故陶弘景言古方亦有相惡相
反並乃不為害非妙達
精微者不能知此理
主治五臟六腑寒熱邪氣

堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡癰疽解毒久服輕身延

年本經○施音溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止

渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之精安和七

十二種石一千二百種草錄五腹中冷痛治驚癇

除腹脹滿補益五臟腎氣兩傷令人陰不痿主婦

人血滯腰痛凡虛而多熱者加用之甄權安魂定魄

補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利

百脉益精養氣壯筋骨

大生用

瀉火熱熟用散表

寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補脾胃潤肺

李杲

吐肺痿之膿血消五發之瘡疽

好古

解小兒胎毒驚

癰降火止痛

時珍

稍主治生用治胸中積熱去蘆中痛加酒煮玄胡

索苦楝子尤妙

元素

頭主治生用能行足厥陰陽明二經汚濁之血消

腫導毒

震亨

主癰腫宜入吐藥

時珍

發明

震亨曰甘草味甘大緩諸火黃中通理厚德

草氣薄味厚可升可降陰中陽也陽不足者補之以甘甘溫能除大熱故生用則氣平補脾胃不足而大瀉心火炙之則氣溫補三焦元氣而散表寒除邪熱去咽痛緩正氣養陰血凡心火乘脾腹中急痛腹皮急縮者宜信用之其性能緩急而又協和諸藥使之不爭故熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒寒熱相雜者用之得其平好古曰五味之用苦泄辛散酸收鹹斂甘上行而發而本草言甘草下氣何也蓋甘味主中有升降浮沉可上可下可外可內有和有緩有補有泄君中之道盡矣張仲景附子理中湯用甘草恐其僭上也調胃承氣湯用甘草恐其速下也皆緩之之意小柴胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫而用甘草者則有調和之意建中湯用甘草以補中而緩脾急也鳳髓丹用甘草以緩腎急而佐元氣也乃甘補之意又曰甘者令人中滿中滿者勿食甘甘緩而壅氣

非中滿所宜也凡不滿而用炙甘草爲之補若中滿而用生甘草爲之瀉能引諸藥直至滿所甘味入脾歸其所喜此升降浮沉之理也經云以甘補之以甘瀉之以甘緩之是矣時珍曰甘草外赤中黃色兼坤離味濃氣薄資全土德協和羣品有元老之功普治百邪得王道之化贊帝力而人不知歛神功而已不與可謂藥中之良相也然中滿嘔吐酒客之病不喜其甘而大戟荒花甘遂海藻與之相反是亦迂緩不可以救昏瞶而君子嘗見嫉於宵人之意與○**〔領曰〕**按孫思邈千金方論云甘草解百藥毒如湯沃雪有中烏頭巴豆毒甘草入腹卽定驗如反掌方稱大豆汁解百藥毒予每試之不效加入甘草爲甘豆湯其驗乃奇也又葛洪肘後備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解蠱毒藥並是常用之物畏人得其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥久與親狎乃得其詳凡飲食時先取炙熟甘草一寸嚼之藥汁若中毒隨卽吐出仍以炙甘草三兩生薑四兩木六升煮二升日三

服或用都淋藤黃藤二物酒煎溫常服則毒隨大小洩出又常帶甘草數寸隨身備急若經含甘草而食物不吐者非毒物也三百頭牛藥即土常山也三百兩銀藥即馬兜鈴藤也詳見各條

附方 舊十五傷寒心悸 脉結代者甘草二兩水三升煮一牛服七合日一服

傷寒類要 傷寒咽痛 少陰證甘草湯主之用甘草二兩蜜水炙水二升煮一升半服五合

日二服 張仲景傷寒論 肺熱喉痛 有痰熱者甘草炒二兩枯梗米泔浸一夜一兩每服

五錢水一鍾半入阿膠 肺痿多涎 肺痿吐涎汗頭半片煎服 錢乙直訣 眩小便數而不

欬者肺中冷也甘草乾薑湯溫之甘草炙四兩乾薑炮二兩水三升煮一升五合分服 張仲景金

匱要 肺痿久嗽 涕唾多骨節煩悶寒熱以甘草三兩炙搗為末每日取小便三合調

之 甘草末一錢服 小兒熱嗽 甘草二兩猪膽汁浸五宿炙研末蜜丸綠豆大

廣利方

食後薄荷湯下十九

名涼膈丸

聖惠方

初生解毒

小兒初生未可

草一指節長炙碎以水二合煮取一合以綿染點

兒口中可為一蜺殼當吐出胸中惡汁此後待兒

饑渴更與之令兒智慧無初生便閉甘草枳殼煨

病出痘稀少王璆選方

蓋煎服小兒撮口發噤用生甘草二錢半水一

全幼心鑑以乳汁點兒口嬰兒目澀月內目閉不開或腫羞

中金匱玉函

用甘草一截以豬膽汁炙為末每小兒遺尿大甘

用米泔調少許灌之幼幼新書

煎湯夜夜服之小兒尿血甘草一兩二錢水六合

危氏得效方

盡姚和

衆至寶方小兒羸瘦甘草三兩炙焦為末蜜丸綠

金匱大人羸瘦甘草三兩炙每旦以小兒頭三赤

玉函

外臺秘要

赤

白痢下

崔宣州衍所傳方用甘草三升炙劈破以淡漿水蘸水一升半煎取八合服之立效

○梅師方用甘草一兩炙肉豆蔻七個煨剉以水三升煎一升分服

舌腫塞口

不治

甘草煎濃湯熱嗽

太陰口瘡

甘草二寸白礬

保命

集

發背癰疽

崔元亮海上集驗方云李北海言此方乃神授極奇秘用甘草三大兩生

烏節末大麥麴九兩和勻取好酥少許入內下沸

水搜如餅狀方圓大於瘡一分熱傳腫上以細片

及故紙隔令通風冷則換之已成者膿水自出未

成者腫便內消仍當喫黃芪粥為妙○又一法甘

草一大兩水炙搗碎木一大升浸之器上橫一小

刀子露一宿平明以物攪令沫出沫服之但是

瘡腫發背皆其諸般癰疽甘草三兩微炙切以酒

煮蘇頌圖經一斗同浸瓶口用黑鈴

一片溶成汁投酒中取出如此九度令一切癰疽

病者飲酒至醉寢後即愈也

經驗方一切癰疽

到用無灰好酒二升盞煎至一盞溫服次日再服	早至午令冰盡為度勞開視之中心水潤乃止細	一盞河水井水不用以文武火慢慢薰水炙之自	愈也用橫文甘草一兩四寸截斷以溪澗長流水	下懸癰生於穀道前後初發如松子大漸如蓮子	痘瘡煩渴草能通血脈發瘡痘也血指方陰	小癰癰二錢連進數服痛熱皆止外利精要方	能疎導下惡乳癰初起灸甘草二錢新水煎服	者亦解之或微利無妨名癰疽秘塞生甘草二錢	國老膏外科精要方	可具述用大橫文粉草二斤槌碎河水浸一宿桑	諸發預期服之能消腫逐毒使毒不內攻功效
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------	---------------------------