

氣斯

滑可

中

樓

証指南醫案

阻梗 腹脹而小瀉食入脘痛

壯火氣滯痰聚日擁清陽
莫以豆蔻沉香却津可也

川黃連

杏仁

桔梗 舌絳不多此高年陽氣結於上陰液衰於下為關格之漸當開痞通陽議治

胃陽虛

朱三未老形衰納穀最少久有參

薑汁

半夏

枳實汁

竹瀝

湯補肺為宜

人參

附子瀉心湯為上熱下寒主治

白六少食頗安過飽食不肯食二便艱少是陽不轉旋上結陰枯於下便難極難調治勿用腥油羶味脈

中似乎快爽顯然陽微又妙香丸仍服每五日服大半夏湯

熟半夏

薑汁

淡豆豉一兩洗淨煎

淡豆豉

薑汁

人參

茯苓

附子

生白芍

呂忙勞倦飢飽皆傷胃是大便乾澹並不渴飲痰氣凝遏阻陽久延關格最怕

半夏

薑汁

半夏

薑汁

杏仁

枳殼

馮六有年陽微酒濕厚胸飲冷再傷胃陽洞泄復加嘔吐不受湯飲食物上不得入下不得出此為關格難治

辛通佐以養胃用大

半夏

川連

淡乾薑

又胃屬腑陽以通為能納穀陰液漸涸腸失潤大便難

人日衰愈投泄氣斯也

半夏

薑汁少許

杏仁

茯苓 此症大忌燥熱

以竹瀝薑汁辛滑可治之疴然此病乃積勞傷陽年歲未老精神已竭古稱噎膈反胃都因陰枯而陽結也

顧四脈濡緩無力中全氣日索交早咽燥晝日溺少五液告涸難任剛燥陽藥是病諒非醫藥能愈

之例 吳茱 連薑汁

又辛熱開濁吐按之則澹形瘦氣逆上不納食下不通便老年積勞內傷陽結不行致脘閉陰枯腑乏津營

尤脈緩右關弦右關格為難治

人參

枳實

川連

生乾薑

半夏

茯苓

增補 噎膈反胃

上海章福記書局校印

錫山華南田岫雲同較

可撐持秋季驟加驚憂厥陽陡升莫制遂廢食不便消渴不已如心熱嘔吐涎沫五味中喜
小枯槁殆盡難任燥藥通關胃屬陽土宜涼宜潤肝為剛臟宜柔宜和酸甘兩濟其陰
人參 鮮生地 阿膠 麥冬汁 生白芍

梨汁 柿霜 玉竹 天冬 麥冬 甜杏仁 川貝 生白芍 三角胡麻
得數日大便通爽然後脫中納食無阻此胃汁漸枯已少胃氣下行之旨噎症萌矣病
陽燄燥灼津所致故餌藥未能全功議用丹溪法 此潤腸之妙方若
其噎燥亦無效
柏子仁汁 甜杏仁汁 黑芝麻汁 杜蘇子汁 松子仁漿 水浸布紙絞汁

自袁平日服餌桂附生薑三十年病食噎不下膈吐出此在上焦之氣不化津液不
當按經云味過辛熱肝腸有餘肺津胃液皆奪為上燥做嘉言清燥法不治
鮮生地 甜水梨 桑葉 石膏 生甘草
是屬液虧先宜理氣後用潤劑

枇杷葉 枳實 竹瀝 不治
食下欲噎病在肺胃高年姑以清劑清降

鬱金 瓜蒌皮 山梔 淡香豉
上升此老年悒鬱所致必使膈腸濁泄僅可延年議兩通陽明厥陰之法

茯苓 橘紅 竹瀝 薑汁

治以苦辛寒 小川連 半夏 香豉 枳實 茯苓 薑汁
大便不爽治手太陰 鮮枇杷葉 紫苑 蘇子 杏仁 鬱金 桃仁

屬壅塞之象當怡情善調

錢 秫米錢 枳實一錢 薑汁三小匙

阻腹 楊四脈弦而小滿食入脘痛格拒必吐清涎然後再納視色蒼眼筋紅黃昔肥今瘦云是鬱怒之傷少火皆變

壯火氣滯痰聚日擁清陽莫展腕管窄隘不能食物噎膈漸至矣法當苦以降之辛以通之佐以利痰清膈莫以豆蔻沉香椒津可也 不治

胃陽 朱三末老形衰納穀最少久有心下勿痛吞進湯飲不安近來常吐清水是胃陽日薄噎膈須降議用大半夏湯補肺為宜 人參 半夏 茯苓 白香粳米 薑汁 河水煎

白六少食頗安過飽食不肯下間有冷膩涎沫湧吐而出此有年胃陽久餒最多噎膈反胃之慮飲以熱酒腕中似乎快爽顯然陽微欲結所幸二便仍通濁尚下泄猶可望安

熟半夏二兩 薑汁炒 茯苓二兩 生益智仁二兩 丁香皮五錢 新會皮一兩 淡乾薑一兩 右藥淨末分量用香

淡豆豉一兩 洗淨煎汁法九淡薑湯服三錢 呂忙勞倦飢飽皆傷胃陽年及花甲最慮噎膈反胃此虧飯酒肉重濁之物與病不合

半夏 薑汁 香豉 土瓜萆皮 杏仁 橘紅

渴六有年陽微酒濕厚味釀痰阻氣遂令胃失下行為順之旨腕窄不能納物二便如昔病在上中議以苦降辛通佐以養胃用大半夏湯 不治 半夏 人參 茯苓 薑汁 川連 枳實

又胃屬腑陽以通為補見症腕中窒塞納食不易過膈膚淺見識以白豆蔻木香沉香麝其獲速功不知老人日衰愈投泄氣斯中和再無復振之理故雲岐子九法後賢立辨其非夏季宜用外臺茯苓飲加菖蒲佐

以竹瀝薑汁辛滑可矣 顧四脈濡緩無力中年胸膈時痛繼以早食晚吐此屬反胃乃胃中無陽濁陰腐壅議微仲景陽明辛熱宣通

之例 吳茱 半夏 藜蘆 淡乾薑 茯苓

又辛熱開濁吐減行走勞力即吐痰水食物陽氣傷也用吳茱理中湯 尤脈緩右關弦知飢惡食食入即吐肢浮便澀溺少不渴飲此胃陽衰微開合之機已廢老年噎膈反胃乃

宜方多者有噎
為此極痰膈

血腕陽
痰痺瘰

凝陰陽
滯濁虛

大症也 不治

人參

茯苓

淡附子

淡乾薑

炒粳米

薑汁

又通胃陽法服。腑病原無所補。祇以老年積勞傷陽之質。所服之劑。開肺即是泄氣。今連苦寒劫陽。薑汁與

乾薑附子並用。三焦之陽皆通。耳若枳朴仍是泄氣。與前義悖矣。

人參

茯苓

淡附子

淡乾薑

劉五脈左小弦右濡濇。五旬又四陰陽日衰。勞煩奔走。陽愈傷致清氣欲竭。食入腕痛。痰涎湧逆。皆噎膈反胃

見症。其飲酒愈甚。由正氣先餒。非酒能致病。

川連

枳實汁

茯苓

半夏

廣皮白

黑山梔

薑汁

竹瀝

包六胸腕痞悶。噎逆三四日。必嘔吐粘膩。或黃綠水液。此屬反胃。六旬有年。是亦重病。

川連

半夏

枳實

鬱金

竹茹

薑汁

陸脈沉微。陽氣大傷。陰濁僭踞。旦食不能暮食。周身掣痛。背脹。病狀著難愈之症。

人參

附子

乾薑

茯苓

澤瀉

姚二腑陽不通降。濁壅為反胃。累遭病反。老年難以恢復。自能潛心安養。望其悠久而已。藥不能愈。是病矣。

人參

附子

乾薑

公丁香

薑汁和丸

某積勞有年。陽氣漸衰。濁凝痰阻。腕中常痛。怕成噎膈。便塞之症。

桃仁

紅花

延胡

川棟子

半夏

橘紅

鬱金汁

瓜蒌皮

李兩關脈緩濇。食入氣阻。吐涎稍通。前已吐過痰濁膠粘。此皆久積勞倦。陽氣不主旋運。為噎膈反胃之症。

此病最多反覆。必須身心安逸。方可却病。徒藥無益耳。

半夏

薑汁

桃仁

韭白汁

香豉

瓜蒌皮

鬱金

某胃痛得瘀血去而減。兩三年宿病復起。食進痞悶。怕其清陽結而成膈。大意思氣佐通。仍兼血絡為治。

人參

半夏

茯苓

新會皮

木香

生益智

當歸

桃仁

水法丸服三錢

張三早食暮吐。大便不爽。病在中下。初因勞傷胃痛。痰瘀有形之阻。

半夏

枳實

製大黃

桃仁

韭白汁

經云三陽結謂之膈。又云一陽發病其傳為膈。仲景云朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰反胃。丹溪謂噎膈反胃名雖不同病出一體。多因氣血兩虛而成。然歷觀噎膈反胃之因實有不同。大抵飲食之際氣忽阻塞飲食原可下咽如有物梗塞之狀者名曰噎心下格拒飢不能食或食到喉間不能下咽者名曰膈食下良久復出或隔宿吐出者名曰反胃。夫噎膈一症多因喜怒悲憂恐五志過極或縱情嗜慾或恣意酒食以致陽氣內結陰血內枯而成。治宜調養心脾以舒結氣填精益血以滋枯燥。夫反胃乃胃中無陽不能容受食物命門火衰不能薰蒸脾土以致飲食入胃不能運化而為朝食暮吐暮食朝吐治宜益火之源以消陰翳補土通陽以溫脾胃。故先生於噎膈反胃各為立法以治之。其陽結於上陰虧於下而為噎膈者用通陽開痞通補胃膈以及進退黃連附子瀉心諸法。上熱下寒為治其肝陰胃汁枯槁及煩勞陽亢肺胃津液枯而成噎膈者用酸甘濟陰及潤燥清燥為主。其液虧氣滯及陽衰血瘀而成噎膈者用理氣逐瘀兼通血絡為主。其胃陽虛而為噎膈反胃及憂鬱痰阻而成者用通補胃膈辛熱開濁以及苦降辛通佐以利痰清膈為主。其肝鬱氣逆而為噎膈者兩通厥陰陽明為治其酒熱鬱傷肺胃氣不降而為噎膈者用輕劑清降及苦辛寒開肺為主而先生於噎膈反胃治法可謂無遺蘊矣。張景岳云治噎膈大法當以脾腎為主其理甚通當宗之。又有飲膈熱膈及憂氣患食寒之膈其主治各載本門茲不復贅。鄒治九

是證每因血枯氣衰致此。凡香燥消食之藥久在禁內案中雖有一二倣用辛熱而亦必諦審其為陽微濁踞者其餘或苦辛泄滯而兼潤養或酸甘化液而直滋清或鬱悶於氣分而推揚穀氣或勞傷於血分而宣通瘀濁總以調化機關和潤血脈為主。陽氣結於上陰氣衰於下二語實為證之確切論也。姚亦陶○果係膈症百無一生不必言治若反胃則古案中多用人參其意以為不食胃虛不可不用參以補其精氣不知噎膈之症必有瘀血頑痰逆氣阻膈胃氣其已成者百無一治其未成者用消痰去痰降氣之藥或可望其通利若用人參雖或一時精氣稍旺而病根益深是永無愈期矣

症為何忘所者是冷俗呃噫病此亥噯亦之人出口飽而飽
一并如最之病逆名逆即也非切庚云方有人胃氣食是

胃肝
犯

不脾虛胃鬱肺
和胃陽脾

(噯噯)

王二初用辛通見效。多服不應。想雨濕泛潮。都是濁陰上加。致胃陽更困。做仲景胃中虛。客氣上逆。噯氣不除。

例。

人參

旋覆花

代赭石

半夏

茯苓

乾薑

此正也。但仲景以治呃逆。若噯則有別。

人參

某

味淡。嘔惡。噯氣。胃虛。渴逆。

白旋覆花

釘頭代赭

半夏

薑汁

人參

茯苓

汪三

壯年飲酒聚溼。脾陽受傷已久。積勞飢飽。亦令傷陽。遂食入反出。噯氣不爽。隔拒在子中焦。總以溫通鎮逆為例。

逆為例。

白旋覆花

釘頭代赭

茯苓

半夏

淡附子

淡乾薑

徐

噯氣不爽。食後甚。

杏仁

半夏

橘紅

厚朴

鬱金

桔梗

陳

多噯。胸膈不爽。胃陽弱。宜薄味。

生白朮

茯苓

新會皮

半夏

益智仁

厚朴

生薑

某

噯氣腹微痛。脾胃未和。

人參

焦白芍

茯苓

炙甘草

內經止有噯字。而無噯字。故經云。五氣所病。心為噯。又云。寒氣客於胃。厥逆從下上散復出於胃。故為噯。夫噯噯一症。或傷寒病後。及大病後多有此症。蓋以汗吐下後。大邪雖改。胃氣弱而不和三焦。因以失職。故清無所歸而不升。濁無所納而不降。是以邪氣留連。噯酸作飽。胸膈不爽。而為心下痞鞭。噯氣不除。乃胃陽虛而為陰所格。阻陽足則充周流動。不足則膠固格阻矣。仲景立旋覆代赭湯。用人參甘草養正補虛。薑棗以和脾養胃。所以安定中州者至矣。更以旋覆花之左旋轉於上。使陰中隔阻之陽升而上達。又用代赭石之重鎮墜於下。使鬱陽留滯之陰降而下達。然後參甘大棗。可施其補虛之功。而生薑半夏。可奏其開痞之效。而前賢治噯噯一症。無出仲景右矣。故先生於胃氣客氣上逆。及胃陽虛脾胃不和。肺氣不降。而為噯噯者。每宗仲景法。加減出入。或加杏仁桔梗以開肺。智仁朴朮以散滿。甘草白芍以和胃。靡不應手取愈。可謂得仲景心法矣。鄒時乘

(嘔吐)

高四

咽阻吞酸痞脹。食入嘔吐。此肝陽犯胃。用苦辛泄降。

吳

川連

川棟子

杏仁

茯苓

半夏

厚朴

錢三脈細右堅大向有氣衝長夏土旺嘔吐不納食頭脹腕痺無非厥陽上冒議用苦辛降逆酸苦泄熱不加
噴怒胃和可愈 川連 半夏 薑汁 川棟子皮 烏梅 廣皮白

金四脈細小而弦風水乘土當春勢張食入不覺嘔吐得小便通少緩治以通陽
炮附子 人參 半夏 吳萸 淡乾薑 茯苓

又脈右弦濇陽微陰凝食入則吐胃痛脹甚半月前用藥得效後反大便秘解不通腑臟不利濁乃上攻先
用玉壺丹七分 四服

將三脈沈食入嘔吐忘冷滯食物 吳萸 半夏 薑汁 茯苓 公丁香柄 廣皮白
顧脈濡弱左脇下久有聚氣納食釀積於胃脘之中兩三日嘔噎吞酸積物上湧吐出此皆悌怒動肝肝木

犯胃胃中陽傷不能傳及小腸遂變化失司每七八日始一更衣為胃氣不主下行故也法當溫胃陽制肝
逆宿病久纏恐多反覆 此等成方反胃之症何可純用辛熱

淡附子 淡乾薑 薑汁 生白芍 淡吳萸 白粳米
朱胃中不和食入嘔吐怒動而病必先治肝溫膽合左金為宜去甘草茯苓加薑汁

某氣自左升腹中脹滿嘔吐涎沫黃水暴咳不已是肝氣逆乘過胃犯肺當制肝和胃 安蛇丸
某嘔黑綠苦水顯濁下焦濁邪犯胃 人參 川椒 烏梅 茯苓 紫石英 桑螺蛸

沈食過逾時漾漾湧涎欲吐診脈濡濇以胃虛肝乘宗仲景旋覆代赭法
旋覆花 代赭石 人參 半夏 茯苓 廣皮

王四肝病犯胃嘔逆口吐清涎頭暈乳房痛肢麻痺 人參 兩 茯苓 兩 桂枝木 七錢
川棟子 一兩 川連 鹽水 炒 烏梅 半兩 當歸 半兩 生白芍 半兩

某冷濕傷胃肝木上侮衝氣欲嘔腹痛 淡吳萸 厚朴 草蔻 藿香梗 木瓜 茯苓
毛姬因驚肝氣上犯衝逆嘔吐涎陽升至巔為頭痛脈右弱左弦當從厥陰陽明治

人參 川連 茯苓 川棟 川椒 烏梅 乾薑 生白芍

某 脈弦虛食已漾漾欲吐咽阻中痞有痰 人參 吳萸 茯苓 半夏 麩皮 薑汁

陸 鼻明湯水下咽嘔吐右脈小欲歇明是勞傷肝乘胃反 小半夏湯加檀香泥沙白粳米

顏 乾嘔腸痛因惱怒而病是厥陰侵侮陽明脈虛不食當與通補 大半夏湯加薑汁桂枝南棗

某 肥膩滯胃肝木始得再乘土位致氣逆上湧嘔出久病至節反劇最屬不宜總是調攝未盡善奈何

暫與降逆平肝安胃一法 降香 蘇子 旋覆花 茯苓 半夏 麩皮 韭汁

范 脇痛入脘嘔吐黃濁水液因驚肝肝風振起犯胃平昔液衰難用剛燥議養胃汁以熄風方

人參 此是飲症 炒半夏 炒麥冬 茯苓 廣皮白 炒香白粳米

又 六味去萸換芍加麥冬阿膠秋石 氏 動氣肝逆痰性凝寒滯胃卒然大痛嘔涎乃逆滯上攻也治肝厥以通例

炒黑川椒 烏梅肉 生乾薑 川桂枝木 人參 白芍

某 積勞傷陽先已脘痛引背昨頻吐微眩脈弱汗出胃中已虛肝木來乘防有呃忒吐蛔倣仲景食入則嘔

者吳茱萸湯主之

吳萸 半夏 茯苓 薑汁 粳米

王 早上水飲米粥至晚吐出不化知濁陰酉戌升逆瘕形痛而漸大丸藥吐出不化胃陽之極矣兩進平肝

理氣不效法當辛熱開濁不治之症 吳萸 熟附二 良薑 川棟子 茯苓 草果

某 肝風犯胃嘔逆眩暈苦降酸泄和陽佐微辛以通胃

川連 黃芩 烏梅 白芍 半夏 薑汁

李 厥吐腹痛氣衝安胃丸

王 胃虛少穀肝來乘尅嘔吐不能受納蓋臟厥象也

人參 川連 附子 黃芩 乾薑 枳實

此乃症中病老之能
知此之留痰症

張氏 勉強攻胎氣血受傷而為寒熱經脈之氣而為身痛乃奇經衝任受病而陽維脈不用事也內經以陽維

為病苦寒熱維者一身之剛維也既非外感寒熱柴葛三陽豆豉世無是病又苓梔枳朴之屬辛散繼以苦

寒未能中病胃口屢傷致湯飲皆噦出無餘大便不通已經半月其吐出形色青綠涎沫顯然肝風大動將

胃口翻空而腸中污水得風翔如浪決東西蕩漾矣熄風鎮胃固是定理但危篤若此明理以邀天眷耳

淮小麥粒 火麻仁 錢一 阿膠 錢一 生地 錢一 秋石 拌人參 錢一 南棗 肉 錢一 方不切病宜專治吐

陳氏 未病先有耳鳴眩暈恰值二氣之交是冬藏根蒂未固春升之氣泄越無以制伏更屬產後精氣未復又

自乳耗血血去液虧真陰日損陽氣不交於陰變化內風上巔犯竅衝逆肆橫胃掀吐食攻腸為瀉襲走脈

絡肌肉皆腫譬如諸門戶盡撤遂致暴風飄漾之狀醫家辛散苦降重墜不但病未曾理致陽更泄陰愈涸

煩則震動即厥由二氣不能自主之義閱王先生安胃一法最為卓識所參拙見按以兩脈右手濡弱虛象

昭然左脈空大按之不實亦非肝氣肝火有餘皆因氣味過辛散越致二氣造偏茲以病因大旨兼以經義

酌方 人參 茯苓 半夏 白芍 煨薑 炒粳米

周 痛從少腹上衝為嘔為脹是厥陰穢濁致患

又 韭白根 淡吳萸 小茴香 桂枝木 兩頭尖 茯苓 小茴香

徐 六氣衝偏左厥逆欲嘔嘔盡方適伏飲在於肝絡辛以通之

吳萸 炮 分 半夏 錢三 茯苓 塊 錢三 淡乾薑 錢一 代赭石 錢三 旋覆花 錢二

某 脈搏肢冷嘔逆下痢白積生冷水寒鬱生陽氣上塞心大痛乃厥陰濁邪上攻

吳萸 丁香 藿香 川棟子 木香 廣皮 茯苓

褚 二清涎上湧食物吐出乃飽飢傷及胃中之陽禁鮮葷冷滑經年可安

半夏 厚朴 生益智 薑汁 生白木 茯苓

宋 四陽微不運水穀悍氣壅滯致食入即嘔周身牽掣不和乃陽明之脉不用事也久延恐致腫脹

苓薑朮桂湯加厚朴椒目

陸^廿食已即吐病在胃也用辛以通陽苦以清降
半夏 川連 厚朴 茯苓 薑汁

曹^四早食頗受晚食必胃痛嘔吐陽氣日微濁陰聚則有形夜痛至曉陰邪用事乃劇

半夏 薑汁 淡乾薑 秦椒 厚朴 茯苓

王診脉右濡左弦舌白不飢瘀血上吐下瀉胃陽大傷藥餌下咽則瀉前醫用大半夏湯不應詢知所吐皆

係酸水痰沫議以理陽方法 此飲症也 人參 茯苓 川椒 乾薑

潘^十食後吐出水液及不化米粒二便自通並不渴飲五年不愈宜理胃陽用仲景法

熟附子 半夏 薑汁 白粳米

又泄瀉陰翳水飲以安胃陽服四日腹脹吐水已減知陽腑之陽非通不闔再宗仲景法

真武湯加人參

范脉虛無神聞穀乾嘔汗出振寒此胃陽大虛不必因寒熱而攻邪

人參 茯苓 炒半夏 薑汁 烏梅 陳皮

又脈微細小胃陽大衰以理中兼攝其下

人參 茯苓 乾薑 煨益智仁 廣皮 生白芍

金參藥不受皆濁陰在上阻塞氣機幾無法矣勉與白通湯加人尿猪膽汁急進以通陽泄濁

附子 生淡薑 葱白 五寸 人尿 猪膽汁

沈^九吹笛震動元海病治宜填實下焦但噎食吐出又便澹不實中無砥柱陰藥下未受益中再受傷矣

做補益中宮仍佐鎮逆之法 人參 焦朮 炒焦半夏 茯苓 旋覆花 代赭石

吳寒熱邪氣擾中胃陽大傷酸濁上湧吐出脘痛如刺無非陽衰陰濁上潛致胃氣不得下行高年下元衰

憊必得釜底煖蒸中宮得以流通擬用仲景附子瀉心湯通陽之中原可泄熱開導煎藥按用之法

人參 半錢 熟附子 半錢 淡乾薑 錢 三味另煎汁 川連 分 炒半夏 半錢 枳實 錢 茯苓 錢 後四味

凡病必有邪此乃胃中積水寒飲入即拒入當扶陽驅寒開胃補後中其氣亦必飲藥之乃竟用參補住寒

虛中陽

用水一盞滾水一杯煎三十沸和入前三味藥汁服

人參

附子

乾薑

先煎一杯入薑汁四分

川連

黃芩

半夏

枳實 滾水煎和入前藥服

孫叶食物隨入即吐並不渴飲當年以苦辛得效三載不發今心下常痛如辣大便六七日始通議通膈上用

生薑瀉心湯

生薑汁

川連

黃芩

熟半夏

枳實

人參

同煎

又問或不吐食物腹中腰脅似乎氣墜自夏長起心痛頭重至今未減思夏熱必兼濕在裡水穀之濕與外

來之熱相洽結聚餘邪矣當緩攻之議用控涎丹五分間日一服

某五診脉左弦右弱食粥脘中有聲氣衝湧吐此肝木乘胃生陽已薄皆情懷不適所致大半夏湯

某中焦火衰食下不運作酸吐出炒黃乾薑

川椒

半夏

茯苓

塊錢

炒飴糖

黃氏靈樞經云中氣不足澁便為變是崩淋泄瀉皆脾胃欲敗之現症今湯水下嚥少頃傾囊湧出豈非胃陽

無有失司納物乎奈何業醫者中懷疑惑但圖疲藥待其自安怕遭毀謗耳此症一投柔藥濁升填塞必致

脹滿仲景與陽明滿實致慎攻下者恐以太陰之脹誤治耳今舌微紅微渴皆是津液不肯升揚脾弱不主

散精四布世豈有面色如白紙尚不以陽氣為首重也耶

人參

熟於朮

炙甘草

炮薑

茯苓

砂仁

南棗

張嘔吐脹悶虛中氣滯

人參

茯苓

砂仁

南棗

某氏脉微肢冷嘔吐清水食下不化帶下眷髀痠爽陽氣素虛產後奇脉不固急扶其陽用附子理中湯

附子

人參

生白朮

炮薑

炙甘草

又暖胃陽以劫水濕帶下自緩

照前方

加葫蘆芭

又脈象稍和已得理中之效議用營養法

蔡姬凡論病先論體質形色脉象以病乃外加於身也夫肌肉微白屬氣虛外以豐溢裡真大怯益陽虛之體

胃陽

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

飲宜此治法無邪而症此是絕症不治此治有議極確立往相此知難之難人艱此治一不
止熱如人維行之非犯往方而明時論老矣必亦之胃傷津熱中傷

食伏不

氣吸陽
濁受虛

叔邪胃嘔
津熱中傷

上脉虛肝
逆氣衝腎

內熱結邪

內暑結微

為多濕多痰肌疎汗淋唇舌俱白乾嘔胸痞煩渴引飲由于脾胃之陽傷纖邪得僭踞於中留蓄不解正衰
邪熾試以脉之短澇無神論之陽衰邪伏顯然況寒涼不能攻熱清邪便是傷及胃陽之藥今香不納穀大
便漸稀若不急和胃氣無成法可導所謂肥人之病慮虛其陽參擬一初仍候明眼採擇 人參

半夏

生於朮

枳實

茯苓

生薑

吳

三壯年形偉脉小濡惡聞穢氣食入嘔噦緣陽氣微弱陰類聚口鼻受汚濁異氣先入募原募原是胃
絡分布以上逆而為嘔吐此病理標者用芳香辟穢扶正氣治本以溫上通陽

藿香

草果

公丁香

茯苓

厚朴

砂仁殼

廣皮

華撥

又

寒鬱化熱營衛氣室遂發瘡癰食入即吐胃中熱灼當忌進腥油先用加味溫膽湯
鮮竹茹半錢 半夏半錢 金石斛三錢 茯苓半錢 廣皮半錢 枳實一錢 薑汁調一匙

吳

兩番探吐腕痛立止氣固宣暢胃津未能無損風木來乘外冷裡熱診脉右大並不搏指當少少進穀以
養胃多噫多下泄氣調和中焦為宜 炒竹茹 半夏 川斛 橘紅 墨山梔 香豉

曹

四少腹屬肝肝厥必犯陽明胃脘故作痛嘔二年來病人已不知因何起病醫徒見病圖治想肝腎必自內
傷為病久則奇經諸脉交傷經謂衝脉動而諸脉交動也議溫通柔潤劑從下焦虛損主治

傷

淡從蓉乾錢半 茯苓三錢 當歸錢二 杞子錢二 炒沙苑半錢 肉桂心五分 後加鹿角霜

何

寒熱嘔吐胸中格拒喜煖飲怕涼平昔胃陽最虛熱邪內積體虛和實最防瘧厥
人參 黃芩 炒半夏 薑汁 川連 枳實

某

舌赤濁嘔不寐不飢陽邪上擾治以苦辛進瀉心湯 淡黃芩 川連 炒半夏 枳實 薑汁

某

鬱熱阻飢痺嘔有年最慮噎膈 半夏 金斛 薑汁 茯苓 杏仁 廣皮白 薑汁
毛氏 舊有胃痛脘痺嘔吐之病秋前舉發已得小安近痛嘔復來身體熾熱宿病未能而暑熱穢氣上竅侵入
三焦混淆恐內閉變現瘧厥 川連 淡黃芩 半夏 薑汁 黑山梔 枳實汁

某舌黃不渴飲久嗽欲嘔吐前用金匱麥門冬湯養胃小效自述背寒口吐清痰暑濕客邪未盡虛體當輔

正醒脾却暑人參 茯苓 廣皮 半夏 薑汁

郭五知飢能納忽有氣衝涎沫上湧腕中格拒不堪容物內經謂肝病吐涎沫丹溪云上升之氣自肝而出水火上陵柔金受剋咳喘日加治以養金制木使土宮無戕賊之患滋水制火令金臟得清化之權此皆老年積勞致傷豈攻病可效

蘇子 麥冬 枇杷葉 杏仁 北沙參 桑葉 丹皮 降香 竹瀝

曹五四勞倦嗔怒嘔吐身熱得汗熱解而氣急不寐不飢仍是氣分未清先以上焦主治以肺主一身氣化也

杏仁 鬱金 山梔 香豉 橘紅 瓜蒌皮

嘔吐症內經與金匱論之詳矣乃後人但以胃火胃寒痰食氣滯立論不思胃司納食主乎通降其所以

不降而上逆嘔吐者皆由於肝氣衝逆阻胃之降而然也故靈樞經脈篇云足厥陰肝所生病者胸滿嘔

逆況五形之生剋木動則必犯土胃病治肝不過隔一之治此理淺近易明人乃不能察而好奇之輩反

誇隔二隔三之治豈不見笑於大方也哉試觀安胃丸理中安蚘丸所用椒梅及胃虛客氣上逆之旋覆

代赭此皆胃藥乎抑肝藥乎於此可省悟矣今觀先生之治法以泄肝安胃為綱領用藥以苦辛為主以

酸佐之如肝犯胃而胃陽不衰有火者泄肝則用苓連棟之苦寒如胃陽衰者稍減苦寒用苦辛酸熱此

其大旨也若肝陰胃汁皆虛肝風擾胃嘔吐者則以柔劑滋液養胃熄風鎮逆若胃陽虛濁陰上逆者用

辛熱通之微佐苦降若但中陽虛而肝木不甚亢者專理胃陽或稍佐椒梅若因嘔傷寒鬱化熱劫灼胃

津則用溫胆湯加減若久嘔延及肝腎皆虛衝氣上逆者用溫通柔潤之補下焦主治若熱邪內結則用

瀉心法若肝火衝逆傷肺則養用金制木滋水制火總之治胃之法全在溫通虛則必用人參藥味皆屬

和平至於治肝之法藥味錯雜或寒熱互用或苦辛酸鹹並投蓋因厥陰有相火內寄治法不得不然耳

但觀仲景烏梅丸法概可知矣案輯六十有餘大半皆由肝邪為患非先生之卓識安能暢發此理乎哉

華岫雲

此亦痰飲症也

肝胃之藥。參錯成方。又用人參及薑附者七八。皆與反胃蓄飲相反。則嘔吐一症。此老全未夢見也。患諸病者亦大。不幸矣。

不卒矣。因求治於余。余曰。蓄飲也。世無知者。為製一方。其病立已。其人因受業於余。即此可徵矣。

吐蛇

厥陰吐蛇。寒熱乾嘔。心胸格拒。舌黑。渴不欲飲。極重之症。

王 烏梅肉半錢 桂枝木錢 炒黑川椒四錢 白芍錢一 小川連三錢 黃芩錢一 生淡乾薑錢一 席 脈石歌。舌白渴飲。腕中痞熱。多嘔逆。稠痰。曾吐蛔虫。此伏暑濕。皆傷氣分。邪自裡發。神欲昏冒。濕邪不運。

自利粘痰。議進瀉心法。半夏瀉心湯

又 凡蛇蟲上下出者。皆屬厥陰。乘犯陽明。內風入胃。嘔吐痰涎。濁沫。如仲景厥陰篇中。先厥後熱。同例。試論

寒熱後。全無汗解。謂至陰伏邪既深。焉能隔越諸經。以達陽分。閱醫藥方。初用治肺胃。後用溫膽。茯苓飲。但

和胃治痰。與深伏厥陰之邪未達。前進瀉心湯。苦可去濕。辛以通痞。仍在上中。服後胸中稍舒。逾時稍寐。寐

醒。嘔吐濁痰。有黃黑之形。大凡色帶青黑。必係胃底腸中逆湧而出。老年衝脈既衰。所謂衝脈動。則諸脉皆

逆。自述嘔吐之時。周身牽引。直至足心。其陰陽踰離。不得自固。斷斷然矣。仲景於半夏半裏之邪。必用柴苓。

今上下格拒。當以桂枝黃連湯為法。參以厥陰引經。為通理之使。俾衝得緩。繼進通補陽明。此為治厥陰章

旨也。

淡乾薑 桂枝 川椒 烏梅 川連 細辛 茯苓 此病宜用鎮安法

又 肝鬱不舒。理進苦辛。佐以酸味者。恐其過剛也。做食穀則嘔例。

人參 茯苓 半夏 川連 烏梅

又 瘧來得汗。陰分之邪已透。陽經第痰嘔雖未減。青線形色亦不至。最屬可喜。舌心白苔未淨。舌邊漸紅。而

神倦困憊。清邪佐以輔正。一定成法。人參 半夏 茯苓 枳實汁 乾薑 川連

又 食入欲嘔。心中溫溫。液液痰沫。味鹹。脊背上下約束。引痛。腎虛水液上泛。為涎。督脉不司。議用真武。撤其

水寒之逆二服後接服

人參 半夏

桂枝

茯苓

煨薑

南棗

又別後寒熱三次較之前發減半但身動言語氣衝湧痰吐逆四肢常冷寒熱汗出時四肢反熱此陽虛胃

虛陰濁上乘以致清氣無以轉舒議以胃中虛客氣上逆為噦氣嘔吐者可與旋覆代赭湯仍佐通陽以制

飲逆加白芍附子

又鎮逆方雖小效究是強制之法凡痰飲都是濁陰所化陽氣不振熱必再熾仲景謂飲邪當以溫藥和之

前方却胃水以醒陽亦是此意議用理中湯減甘草之守仍加薑附以通陽并入草藥以醒脾

二服後接用

人參

半夏

生白朮

附子

生白芍

乾薑

王脈沈弦腹痛嘔吐鼻煤舌降面帶青晦色夏秋伏暑發熱非冬月乃悞表禁食胃氣受傷至肝木上干胃

土蛭蟲上出遂成重病常有厥逆之慮擬進泄肝和胃得痛止嘔緩冀有轉機

川椒

川連

烏梅

乾薑

人參

茯苓

生白芍

川棟子

程大病後胃氣極傷肝木乘土蛔欲透膈腕脇陣痛是土衰木剋古人以狐惑蟲厥都以胃虛少穀為訓

安胃丸

人參川椒烏梅湯化送二錢

周一兩脇痛尤甚於左嘔吐蛔蟲年前好食生米此飢飽加以怒勞胃土不和肝木來犯試觀幼穉有食米麥

泥炭者皆裹滯久駭初從溼熱鬱蒸而得宜和陽宣腑辛竅通絡溼去熱走腑絡自和

川連

乾薑

桂枝

金鈴子

延胡

蘆薈

白芍

枳實

烏梅丸服三錢

李身不壯熱二便頗通已非風寒停滯之病因驚動肝厥氣下泛蛔蟲上攻觸痛嘔吐清涎仲景云蛔蟲厥

都從驚恐得之

人參安胃丸

又古人云上井吐蛭下降狐惑皆胃虛少穀肝臟厥氣上干耳既知胃中虛客氣上衝逆犯斯鎮逆安胃方

是遵古治法

人參

代赭石

烏梅肉

川椒

川棟子

茯苓

又人參

茯苓

妙當歸

炒白芍

桂心

炙草

煨薑

南棗

又忽然痛再發診脈微細恰值立夏之際正氣不相接續有復厥之慮

人參 桂枝木 川棟子 炒川椒 生白芍 烏梅肉 川連 細辛

葉七熱氣上閉耳聾身熱神識不清當清心營肺衛

竹葉心 飛滑石 連翹 川貝 石菖蒲根 生萊豆皮

又暑濕熱內蒸吐蛔口渴耳聾 川連 水炒 半夏 枳實 廣白皮 菖蒲 杏仁

又身熱三候不解胸痞入暮譫語耳聾吐蛔此熱結厥陰症勢最險

川連 黃芩 乾薑 枳實 半夏 薑汁 茯苓 菖蒲

吐蛔本屬肝胃症因逆陰之邪上逆蛔不能安故從上而出也今所輯方案皆因客邪病而致吐蛔者雖

有瀉心湯桂枝黃連湯安胃丸等然皆不離予仲景之烏梅丸法以苦辛酸寒熱並用為治當與嘔吐門

同參至於幼穉有吐蛔瀉蛔及諸蟲之病治標則有殺蟲之方治本則溫補脾胃或佐清疳熱前人各有

成法不必重贅 華玉堂

所列諸案大半皆嘔逆症並非疳病其治吐蛔之方亦惟烏梅丸一方加減並無精思

不食 不食亦是症諸病皆有之條何得另立一門

張脈虛緩不食不飢形寒浮腫 人參 生益智 廣皮 半夏 茯苓 生白芍 煨薑

楊氏胃傷惡食絡虛風動浮腫先與荷米煎 人參 新會皮 檀香泥 炒粳米 炒荷葉蒂

潘不飢不食假寐驚跳心營熱入胃汁全虧調攝十日可愈 此症當治驚跳與不食

鮮生地 麥冬 知母 竹葉心 火麻仁 銀花

王熱損胃汁不欲食穀

麥冬 密炒知母 地骨皮 川貝母 竹葉心 嘉定花粉 生甘草 甜梨皮

陸二時病後脉強而勁知飢不納胃氣未和當靜處調養

鮮省頭草 鮮蓮子 荷苓 大麥仁 川斛 炒知母

鄭三脈濡無力唇赤舌乾微眩不飢不飽此天煖氣泄而煩勞再傷陽氣夫衛外之陽內應乎胃胃既逆則不