

溫病條辨

卷上
中焦篇

寒濕

濕溫

瘧痢

疸痺附

救中湯方 苦辛通法

蜀椒

三錢炒出汗

淡乾薑

四錢

厚朴

三錢

檳榔

二錢

廣皮

二錢

水五杯。煮取二杯。分二次服。兼轉筋者。加桂枝三

錢。防已五錢。薏仁三錢。厥者。加附子二錢。

九痛丸方

治九種心痛。苦辛甘熱法。

附子

三兩

生狼牙

一兩

人參

一兩

乾薑

一兩

吳茱萸

一兩

巴豆

一兩。去皮心。熬碾如膏。

蜜丸。梧子大。酒下。強人。初服三丸。日三服。弱者二丸。○兼治卒中惡。腹脹痛。口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。並冷衝上氣。落馬墜車血病等證。皆主之。忌口如常法。

〔方論〕內經有五臟胃腑心痛。並痰蟲食積。卽爲九痛也。心痛之因。非風卽寒。故以乾薑附子驅寒壯陽。吳茱萸能降肝臟濁陰下行。生狼牙善驅浮風。以巴豆驅逐痰蟲陳滯之積。人參養正驅邪。因其藥品氣血皆入補瀉攻伐皆備。故治

中惡腹脹痛等證

附錄外臺走馬湯治中惡心痛腹脹大便不通。
苦辛熱法。沈目南注云。中惡之證。俗謂絞腸烏
痧。卽穢臭惡毒之氣。直從口鼻入於心胸腸胃
臟腑。壅塞正氣不行。故心痛腹脹大便不通。是
爲實證。非似六淫侵入而有表裏清濁之分。故
用巴豆極熱大毒峻猛之劑。急攻其邪。佐杏仁
以利肺與大腸之氣。使邪從後陰一掃盡除。則
病得愈。若緩須臾。正氣不通。營衛陰陽機息。則

死。是取通則不痛之義也。

巴豆

二枚去心皮熬

杏仁

二枚

右二味。以綿纏槌令碎。熱湯二合。撿取白汁飲之。當下。老小強弱量之。通治飛尸鬼擊病。

按醫方集解中。治霍亂用陰陽水一法。有協和陰陽。使不相爭之義。又治乾霍亂用鹽湯探吐一法。蓋閉塞至極之證。除針灸之外。莫如吐法。通陽最速。夫嘔。厥陰氣也。寒痛。太陽寒水氣也。否。冬象也。冬令太陽寒水。得厥陰氣至。風能上。

升則一陽開泄萬象皆有生機矣。至針法治病最速。取禍亦不緩。當於甲乙經中求之。非善針者不可令針也。

汪按玉龍經乾霍亂取委中。今世俗多用熱水急拍腿灣紅筋高起卽刺之。出血愈。又按此證亦有不由觸穢受寒。但因鬱怒而發者。其宜急攻下氣與觸穢受寒同。

徵按沙證向無方論。人多忽之。然其病起於倉卒。或不識其證。或不得其治。戕人甚速。總因其

人濁陰素重。清陽不振。偶感濁陰之氣。由口鼻
直行中道。邪正交爭。營衛逆亂。近世治之者。率
有三法。不知起自何人。一則刮之前。按所云是
也。一則燂之。以大燈草。或紙撚蘸麻油。照看其
頭面額角。及胸前腹上肩膊等處。凡皮膚間隱
隱有紅點發出。或如蚊迹。或累累墳起。疎密不
同。層次難定。一經照出。輕輕灼而燂之。爆響有
聲。則病者似覺輕鬆。一則刺之。其法以針
按穴刺出血。凡十處。名曰放沙。此皆針灸遺意。

但不見古書。故不悉載。又有試法。與以生黃豆
嚼之。不腥者沙。覺有豆腥氣者非沙。與試疥同。
患此者俗忌生薑麻油之類。余歷驗多年。知其
言亦不謬。曾見有少女服生薑而斃。有少男子
服乾薑一夜而死。餘俱隨覺隨解之耳。前二方
中俱有乾薑。似與俗說相悖。然乾薑與檳榔巴
豆並用。正使邪有出路。既有出路。則乾薑不爲
患矣。但後之人不用此方則已。用此方而妄減
其制。必反誤事。不可不知。至若羗活麻黃。則在

所大禁。余尚有二方。附記於後。以備裁採。

立生丹

治傷暑霍亂沙證瘧痢泄瀉心痛胃痛腹痛吞吐酸水及一切陰寒之證。結胸

小兒寒瘧

母丁香

一兩二錢

沈香

四錢

茅蒼朮

一兩二錢

明雄黃

一兩二錢

右爲細末。用蟾酥八錢。銅鍋內加火酒一小杯。

化開。入前藥末。丸菉豆大。每服二丸。小兒一丸。

溫水送下。又下死胎如神。凡被蝎蜂螫者。調塗

立効。惟孕婦忌之。

此方妙在剛燥葯中加芳香透絡蟾乃土之精
上應月魄。物之濁而靈者其酥入絡以毒攻毒
而方又有所監制故應手取効耳

獨勝散

治絞腸沙痛急。指甲唇俱青。危在頃刻。

馬糞

年久彌佳

不拘分兩。瓦上焙乾爲末。老酒沖服二三錢。不
知再作服。

此方妙在以濁攻濁。馬性剛善走。在卦爲乾。糞
乃濁陰所結。其象圓。其性通。故能摩蕩濁陰之

邪仍出下竅。憶昔年濟南方。訛菴蒞在九江。臨行。一女子忽患沙證。就地滾嚎。聲嘶欲絕。訛菴云。偶因擇日不謹。悞犯紅沙。或應此乎。余急授此方。求馬糞不得。卽用驢糞。並非陳者。亦隨手奏功。

濕溫 瘧痢疸痺附

⑤濕熱上焦未清。裏虛內陷。神識如蒙。舌滑脉緩。人參瀉心湯加白芍主之。

濕在上焦。若中陽不虛者。必始終在上焦。斷不

內陷。或因中陽本虛。或因誤傷於藥。其勢必致
內陷。濕之中人也。首如裹。目如蒙。熱能令人昏。
故神識如蒙。此與熱邪直入包絡。譫語神昏有
間。裏虛。故用人參以護裏陽。白芍以護真陰。濕
陷於裏。故用乾薑枳實之辛通。濕中兼熱。故用
黃芩黃連之苦降。此邪已內陷。其勢不能還表。
法用通降從裏治也。

人參瀉心湯方

苦辛寒兼甘法

人參二錢

乾薑二錢

黃連一錢五分

黃芩

一錢五分

枳實

一錢

生白芍

二錢

水五杯煮取二杯分二次服渣再煮一杯服

⑤濕熱受自口鼻由募原直走中道不飢不食機竅不靈三香湯主之

此邪從上焦來還使上焦去法也

三香湯方

微苦微辛微寒兼芳香法

桔萋皮

三錢

桔梗

三錢

黑山梔

二錢

枳殼

二錢

鬱金

二錢

香豉

二錢

降香末

三錢

水五杯煮取二杯分二次溫服

方論按此證由上焦而來其機尚淺故用蔓皮
桔梗枳殼微苦微辛開上山梔輕浮微苦清熱
香豉鬱金降香化中上之穢濁而開鬱上條以
下焦爲邪之出路故用重此條以上焦爲邪之
出路故用輕以下三焦均受者則用分消彼此
互參可以知葉氏之因證製方心靈手巧處矣
惜散見於案中而人多不察茲特爲拈出以概
其餘

⑤吸受穢濕三焦分布熱蒸頭脹身痛嘔逆小便不通神識昏迷舌白渴不多飲先宜芳香通神利竅安宮牛黃丸繼用淡滲分消濁濕茯苓皮湯

按此證表裏經絡臟腑三焦俱爲濕熱所困最畏內閉外脫故急以牛黃丸宣竅清熱而護神明但牛黃丸不能利濕分消故繼以茯苓皮湯

安宮牛黃丸

方法見重焦篇第二十四頁

茯苓皮湯

淡滲兼微辛微涼法

茯苓皮 五錢

生薏仁 五錢

猪苓 三錢

大腹皮 三錢

白通草 三錢

淡竹葉 二錢

水八杯。煮取三杯。分三次服。

⑤陽明濕溫。氣壅爲噦者。新製橘皮竹茹湯主之。

按金匱橘皮竹茹湯。乃胃虛受邪之治。今治濕

熱壅遏胃氣致噦。不宜用參甘峻補。故改用柿

蒂。按柿成於秋。得陽明燥金之主氣。且其形多

方。他果未之有也。故治肺胃之病。有獨勝。肺之

屬金。胃之柿蒂。乃柿之歸束處。凡花皆散。凡子

氣運屬金。柿蒂乃柿之歸束處。凡花皆散。凡子
皆降。凡降先收。從生而散而收而降。皆一蒂爲

前輩有言本
草解藥性不
能得此知察
理之精求之

五色五味之
凡辨藥須實
就物理體會
乃有妙悟不
可泥定本草
本論指出處
可以隅反

之也。治逆呃之能事畢矣。

再按草木一身。蘆與
蒂。為升降之門戶。載

生氣上升者蘆也。受陰精歸藏者
蒂也。格物者不可不於此會心焉。

新製橘皮竹茹湯

苦辛通降法

橘皮

三錢

竹茹

三錢

柿蒂

七枚

薑汁

三茶
匙沖

水五杯。煮取二杯。分二次溫服。不知再作服。有痰

火者。加竹瀝。枯蘗。霜。有瘀血者。加桃仁。

⑤三焦濕鬱。升降失司。脘連腹脹。大便不爽。一加

減正氣散主之。