

傷寒指掌二

傷寒指掌卷之二目錄

三陰總辨

太陰經症

太陰總要述古

太陰本病述古

腹

滿 腹痛

發黃

吐利

太陰新法

少陰經症

少陰總要述古

少陰本病述古

但

欲寐

口燥咽乾

咽痛

吐

吐利

下利

少陰新法

厥陰經症

厥陰總要述古

厥陰本病述古

氣

上衡心

吐衄

厥下利

少腹滿

囊縮

救逆述古

悞下利

悞汗例

救逆新法

瘧後諸病述古

瘧後諸病新法

瘧後浮腫

瘧後昏沉

汗出頭

疼解後額熱

解後腹熱

瘧後耳聾

瘧後

語蹇

瘧後不寐

解後咳嗽

解後盜汗

瘧

後妄言

瘧後吐涎沫

解後下血

瘧後願毒

瘧後酒復

瘧後食復

瘧後勞復

氣虛勞

復¹³ 陰虛勞復¹⁴ 瘥後色復¹⁵ 陰陽易¹⁶ 瘥後調¹⁷
理 瘥後禁忌

傷寒指掌卷之二

三陰總辨

撰傷寒書者每於三陰或熱或寒之故都模糊過去即有傳經直中之分亦非仲景本旨此處不明何以臨症用陳鄙見實諸高明

一三陰有陽經注入之邪有本經自感之邪注入之邪則傳變不一陽主動也自感之邪則在本經陰主靜也

一三陰世都以傳經直中分兩門傳經悉指為熱直

中悉指為寒此說似是而實有未盡者夫傳經即邪
從三陽經傳入直中即本經自受之風寒也蓋邪之
傳三入陰熱症因多而寒症亦間有本經中寒固無
熱症而中風亦能發熱未可以此分寒熱了之其症
細述於左

一邪從陽經注入三陰則或為熱症或為寒症如邪
入太陽先作鬱熱以次傳入陰經則為熱症或邪在
太陽不及鬱熱即入少陰而現大陰形證則為寒症或
太陽之邪即入少陰而仍帶太陽標病則為先寒後

大承氣湯

芒硝 枳實

大黃 厚朴

小承氣湯

枳實

大黃

調胃承氣湯

枳實 大黃

甘草

熱之症或太陽之邪不傳明陽少陽便入三陰隨其人之質體虛實藏腑寒熱則從陰化為寒症從陽化為熱症或風寒之邪從三陽入陰經則無不熱為症凡三陰篇內所稱轉屬陽明而用承氣等湯皆陽經傳入之熱症也

一三陰自受之邪各有中風中寒之症三陰中風則能發熱以風屬陽邪故也三陰中寒則不能發熱以寒屬陰邪故也即以少陰有反熱之症亦必帶太陽標病而然後人但知傳入三陰為傷寒不知三陰自

桂枝湯

桂枝 芍藥

甘草 姜 炙

理中湯

人參 白朮

甘肅 干姜

四逆湯

附子 干姜

甘草

感亦傷寒也故於本經中風發熱便誤為傳經標病
以本藏中寒無熱即指為直中陰症詎知桂枝湯為
表之裏藥固能兼治三陰自感之風邪而理中四逆
等湯本治三陰自感之寒邪也耶蓋風寒六氣之傷
人或入於陰原無一定但值何經之虛而治之不得
專以太陽為受邪之始也故三陰固有陽經注入之
症亦有本經自感之症均屬傷寒不必零立名目也
茲於三陰經中無直中之條非畧也正不敢蛇足耳
一三陰自受之邪論中有可磨指而見者如太陰病

少陰中風脈陽微

陰浮者太陽中風

陽浮而陰弱可

對看互參之

麻黃附子湯

即三味

四逆湯

見前

當歸四逆湯

當歸 桂枝

芍藥 細辛

甘草 通草

大冬 加吳茱萸

生姜

脈浮者可發汗宜桂枝湯此太陽中風也如太陽病

腹滿而吐自利益甚時腹自痛此太陽中寒之症也

如少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈此即少陰中風

欲愈之脈也至於少陰中寒宜汗者麻黃附子細辛

湯當溫者附子四逆等湯是也如厥陰中風脈微浮

為欲愈此即厥陰中風欲愈之脈也厥陰中寒即以

當歸四逆加吳茱萸湯是也關少陰厥陰篇內止

有中風欲愈之脈並無未愈之証治者必有關文也

一三陰篇內惟少陰有大承氣急下三症而太陽厥

陽篇內惟少陰有大承氣急下三症而太陽厥

三陰總辨

三

陰篇內並無承氣之條奈何後人反稱邪在厥陰三
承氣選用夫承氣本陽明胃弱少陰用氣承者蓋因
腎水一虧胃土燥實病已轉屬陽明故急下以存津
液仲景述厥陰病云下之不利止此厥陰忌下之明
戒也焉有邪在厥陰反用承氣之理聖訓具在是非
自見

太陰經症

太陰總要述古

理中湯 桂枝湯 五苓散 四逆湯 四逆散
枝加人參湯 枝加大黃湯 三物白散 桂枝加芍藥湯 桂枝

太陰本病述古

腹滿 腹痛 發黃 吐利

太陰濕土所主仲景以腹滿而吐食不下時腹自痛
自利不渴等症為太陰病乃濕土自病非陽經注入
之症也其脈必沈而細無論外受邪內傷生冷總以

太陰經症

理中湯

參 朮 甘 芍

桂枝湯

桂枝 芍

甘草

溫中散寒為主理中湯主之

若太陽陰中風其脈尺寸俱浮其症四肢煩疼者可發汗宜桂枝湯其脈陽微陰濇而長者為欲愈也

太陰腹滿而痛自利不渴者因于寒咽乾而渴者因

于熱因于寒濕土自病宜理中溫之因于熱病必關

于陽明或暴煩下利或發黃便艱此脾家熱即屬胃

家之熱為轉屬陽明之症宜從陽明治

傷寒脈浮而緩身不發熱手足自溫者太陰也太陰身當發黃若小便自利者不能發黃蓋黃濕傷于肌

五苓散

茯苓 澤瀉

白朮 桂枝

甘草

四逆湯

附子 干姜

甘草

肉不能外越皮膚故發黃若小便利則濕氣下輸膀胱便不發黃設小水不利當用五苓散利之然寒濕傷于太陰之表可從小便而出若濕熱傷于太陰之裏又當從大便而出故至七八日暴煩下利雖十餘日行不必治之以脾家實所積腐穢行盡自止矣蓋不須溫亦不須下也

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者以欲自利也自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之四逆輩

四逆湯

附子 干姜

甘草 加參

小陷胸湯

連 半夏

枳實

桂枝加大黃湯

桂枝 白芍

甘草 芍藥

更加白芍

桂枝加大黃湯

惡寒脈微而利復四逆加人參湯主之

下利十餘行脈反實者死此脾氣虛而邪氣盛故也

太陰腹滿時痛誤下之胸下結鞅而成寒實結胸無

熱症者與三白小陷胸湯病在膈上者必吐膈下者

必利如不利進熱粥一盃利過不止進冷粥一盃

小陷胸湯印

三物白散

若太陽誤下續得自利脈弱腹滿而痛此太陽之熱

邪陷于太陰之裏也腹滿時痛而虛宜桂枝加芍藥

湯腹滿大痛為實宜桂枝加大黃湯然脈弱則胃氣

桂枝芍藥湯
甘草生薑湯

二陳湯

茯苓半夏

甘州陳皮

厚朴

茵陳蒿湯

茵陳生軍

生地

亦弱故云設當用大黃芍藥宜減之

腹滿

腹屬陰屬裏故陽明裏症為腹滿三陰俱有腹滿
太陽汗後腹滿脾胃不和也二陳湯加厚朴和之陽
明潮熱腹滿燥矢也下之身黃小水不利腹滿濕熱
也茵陳蒿湯太陰腹滿有虛寒如腹滿時痛食不
下吐利交作是也理中湯加厚朴有實熱如腹滿大
痛咽乾便秘或發黃或暴下赤黃此脾家實熱為轉
屬陽明宜承氣加減

合泰準繩

金鑒
太陰經

腹痛

理中湯

參朮甘

小建中湯

芍藥 饒糖

桂枝 芍藥

其 生薑

芍藥 還湯

芍藥 桂枝

芍藥 芍藥

邪氣入裏與正氣相搏則腹痛故太陽無腹痛少陽
 有脇痛而無腹痛陽明裏症有腹痛三陰有俱腹痛
 當分部位中脘痛屬脾脈沈遲者內寒理中湯陽脈
 瀼陰脈弦小建中湯 少腹痛屬厥陰界分四肢逆
 冷小便清白是冷結膀胱宜當四逆加吳茱萸生
 姜湯溫之 如不厥冷小便自利者是血蓄膀胱宜
 桃仁承氣湯 小便不利者是水蓄膀胱五苓散大
 小便俱不利者是水熱蓄積八正散若大實小腹滿

甘草通草

加枳實

生薑

桃仁氣湯

桃仁朴硝

甘草桂枝

大黃

八正湯

連連前扁蓄

大黃滑石草梢

瞿麥梔子枳殼

黃芩芍藥

黃芩白芍

甘草

痛或繞痛臍畔痛不大便脈實者承氣湯發熱口

渴脈弦洪而腹痛屬脾熱芍藥黃芩湯腹痛欲吐

利煩躁飽悶者防痧毒當刺委中少商等穴金泰準

按腹痛有虛實按之痛甚屬實按之痛減屬虛有寒

熱自下逆攻而上者火也自上奔迫于下者寒也

又傷寒腹痛以凉水試之其痛稍可者熱也轉甚者

寒也

發黃

傷寒發黃惟陽明太陰兩經有之陽明病應遍身

太陰經症