

通俗傷寒論

通俗傷寒論目錄

張序

王序

杜序

曹序

何後序

何前序

卷之一

第一編 傷寒總論

第一章 傷寒要訣

第一節 六經形層

第二節 六經氣化

第三節 六經關鍵

第五節 六經病證

第七節 六經舌苔

第九節 六經用藥法

第十一節 三焦用藥法

第十三節 六經總訣

第四節 六經部分

第六節 六經脉象

第八節 六經治法

第十節 六淫用藥法

第十二節 用藥配製法

卷之二

第二章 六經方藥

第一節 發汗劑

第三節 攻下劑

第五節 滋補劑

第二節 和解劑

第四節 溫熱劑

第六節 清涼劑

卷之三

第二編 病理診斷

第三章 表裏寒熱

第一節 表寒證

第二節 裏寒證

第三節 表裏皆寒證

第四節 表熱證

第五節 裏熱證

第六節 表裏皆熱證

第七節 表寒裏熱證

第八節 表熱裏寒證

第九節 裏真熱表假寒證

第十節 裏真寒表假熱證

第四章 氣血虛實

第一節 氣虛證

第二節 氣實證

第三節 血虛證

第四節 血實證

第五節 氣血皆虛證

第六節 氣血皆實證

第七節 氣虛血實證

第八節 氣實血虛證

第九節 氣真虛血假實證

第十節 血真實氣假虛證

第五章 傷寒診法

第一節 觀兩目

第二節 看口齒

第三節 看舌苔

第四節 按胸腹

第五節 問口渴

第六節 詢二便

第七節 查舊方

第八節 察新久

第六章 傷寒脉舌

甲 切脉舉要

第一節 診法

第二節 部分

第三節 脉象

第四節 鈎立

卷之四

乙 辨舌舉要

第一節 觀舌形

第二節 察苔色

第三節 辨舌質

第四節 心法提要

丙 六經舌苔歌

第一節 太陽經舌苔歌

第二節 少陽經舌苔歌

第三節 陽明經舌苔歌

第四節 太陰經舌苔歌

第五節 少陰經舌苔歌

第六節 厥陰經舌苔歌

丁 吳坤安察舌辨證歌附劉吉人辨舌法

卷之五

第三編 證治各論

第七章 傷寒本經

第一節 小傷寒

第二節 大傷寒

第三節 兩感傷寒

第四節 伏氣傷寒

第五節 陰證傷寒

卷之六

第八章 傷寒兼證上

第一節 傷寒兼風

第二節 傷寒兼濕

第三節 傷寒兼痧

第四節 傷寒兼瘧 風寒瘧

暑濕瘧 痰瘧 食瘧 陰虛瘧 勞瘧 鬱瘧 胎瘧 疫瘧

第五節 傷寒兼疫

第六節 風溫傷寒

第七節 風濕傷寒

第八節 濕溫傷寒

第九節 春溫傷寒

第十節 熱證傷寒

第十一節 暑濕傷寒

第十二節 伏暑傷寒

卷之七

第八章 傷寒兼證下

第十三節 秋燥傷寒

第十五節 大頭傷寒

第十七節 赤膈傷寒

第十九節 發狂傷寒

第二一節 脫脚傷寒

第十四節 冬溫傷寒

第十六節 黃耳傷寒

第十八節 發斑傷寒

第二十節 漏底傷寒

卷之八

第九章 傷寒夾證上

第一節 夾食傷寒

第三節 夾飲傷寒

第五節 夾血傷寒

第二節 夾痰傷寒

第四節 夾氣傷寒

第六節 夾陰傷寒

卷之九

第九章 傷寒夾證中

第七節 夾疝傷寒

第九節 夾痛傷寒

第八節 夾痞傷寒

第十節 夾脹傷寒

卷之十

第九章 傷寒夾證下

第十一節 夾瀉傷寒

第十三節 夾疝傷寒

第十五節 夾蟲傷寒

第十七節 夾癆傷寒

第十九節 妊娠傷寒

第十二節 夾痢傷寒

第十四節 夾濁傷寒

第十六節 夾虛傷寒

第十八節 臨經傷寒

第二十節 產後傷寒

卷之十一

第十章 傷寒壞證

第一節 傷寒轉瘕

第二節 傷寒轉厥

第三節 傷寒轉閉

第四節 傷寒轉脫

卷之十二

第十一章 傷寒復證

第一節 傷寒勞復

第二節 傷寒食復

第三節 傷寒房復

第四節 傷寒感復

第五節 傷寒怒復

第四編 調理諸法

第十二章 瘥後調理法

第一節 藥物調理法

第二節 食物調理法

第三節 氣候調理法

第四節 情慾調理法

第五節 起居調理法

附何後跋

附歷代傷寒書目考一卷

通俗傷寒論目錄終

通俗傷寒論卷之十

浙紹陶里村俞根初先生遺著

山陰長樂鄉何秀山選按

孫廉臣校勘曾孫幼廉筱廉同校

鄞縣曹赤電炳章參訂

第九章 傷寒夾證下

第十一節 夾瀉傷寒 一名傷寒夾泄瀉

(因)素有脾虛泄瀉。或肝邪侮脾作瀉。或寒邪先中太陰。而爲泄瀉。或先傷食物。欲瀉不暢。再感風寒。而犯太陽證者。

(證)頭痛身熱。胸悶或不悶。溲短大便泄瀉。舌苔白爲中寒泄瀉。舌黃而厚。胸滿腹疔痛。頭痛身熱。口粘而穢。爲宿食化瀉。若舌淡紅。

苔青白色。脘悶腹滿。鳴响作痛而泄瀉。得瀉則腹滿痛鳴响皆瘥。爲肝邪侮脾化瀉。再新受外感。亦頭痛發熱。

(脈) 左脉濡數。右脉沉弱。爲寒瀉。若左弦堅或絃勁。右軟弱或沉緩。肝強脾弱。爲肝邪侮脾。

(治) 中寒感邪。用葱豉胃苓湯(卽胃苓湯去甘草加葱豉)夾食化瀉。身熱用查麴平胃散。加豆豉、藿香、薄荷、豬苓、茯苓、澤瀉之類。肝邪侮脾。腹鳴痛瀉。用扶土抑木煎(炒白芍六錢、炒白朮三錢、煨防風錢半、新會皮一錢、炒黃芩二錢、煨葛根一錢)加豆豉焦梔之類。

秀按俞氏所分泄瀉爲三種。乃先因泄瀉。後受風寒感邪。而病頭痛身熱。與傷寒自病之下利不同。所謂傷寒下利者。不因攻下。自然溇瀉也。要在辨寒熱而治之。庶幾無差。大抵陽熱之利。渴欲飲水。溺色赤。發熱後重。糞色必焦。

黃。或爲腸垢。所下皆熱臭。臍下必熱。得涼藥則止。得熱藥愈增。陰寒之利。口不渴。小便色白。肢或厥冷。脉沉遲無力。必洞下清穀。或爲鷲溇。糞色或白。或淡黃。臍下多寒。三陽證下利身熱。太陰下利手足溫。少陰厥陰下利身涼無熱。此其大概耳。太陽陽明合病下利。葛根湯。太陽少陽合病下利。黃芩湯。陽明少陽合病下利。小柴胡湯加葛根芍藥。合病發熱自利。則爲表邪。不可例以爲裏證也。溫熱病發熱而渴。小便赤色。大便自利。五苓散去桂加黃芩。熱內盛而利不止。黃連解毒湯。躁悶狂亂者。三黃石膏湯。或大柴胡湯。自利不渴。屬太陰。以其藏有寒故也。當溫之。宜服四逆輩。以太陰藏寒。或用理中湯。若寒甚逆冷。脉沉細者。理中湯加附子。若腹滿小便不利者。五苓散合理中湯主之。若嘔者。加半夏。生薑自利而渴。屬少陰。虛故引水自救。白通湯主之。以通其陽而消其陰。與白通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔煩者。白通加豬胆汁湯主之。借豬胆汁嚮導之力。以引陽藥深入。服湯後。脉暴出者死。正氣因發。

泄而脫也。脉微續者生。陽氣漸復也。少陰病。腹痛。小便不利。四肢沉重疼痛。自下利者。此爲有水氣。其人或咳。或小便利。或下利。或嘔者。眞武湯主之。以運脾滲水爲務。少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥冷。脉微欲絕。身反不惡寒。其人面色赤。通脉四逆湯主之。少陰病。吐利。手足厥冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。自汗不止。裏寒下脫。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。少陰病。四逆。其人或欬。或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。四逆散主之。此陽邪傳至少陰。陷入於裏。而不能交通陽分。故不宜苦寒攻之。而但以此利解之。少陰病。自利清水。心下必痛。口乾燥者。急下之。熱邪傳入少陰。逼迫津水。注爲自利。質清而無滓穢相雜。色青而無赤黃相間。此正陽邪暴橫。反類陰邪。但陽邪傳自上焦。其人心下必痛。口必乾燥。設係陰邪。則心下滿而不痛。口中和而不渴。必無此枯槁之象。故宜急下以救其陰也。厥陰下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥者。通脉四逆湯主之。下利腹脹滿。身體疼痛者。先溫其

裏。乃攻其表。溫裏四逆湯。攻表桂枝湯。此總以溫裏爲急也。大汗出。熱不止。內拘急。四肢痛。又下利厥逆而惡寒者。四逆湯主之。惡寒脉微而復利。利止亡血也。四逆加人參湯主之。亡血本不宜用薑附以損陰。陽虛又不當用歸芍以斂陽氣。以利後惡寒。陽虛下脫已甚。故用四逆以復陽。爲陽脫加人參。則陽藥愈加得力。陽生則滋長。設誤用陰藥。必致腹滿不食。或重加泄利嘔逆。轉成下脫矣。下利手足厥冷無脉者。灸之。下利譫語者。有燥屎也。宜小承氣湯下之。蓋下利則熱不結。胃不實。何緣得有譫語。此必邪返于胃。內有燥糞。故雖下利而結者自若也。爰用小承氣以微攻其胃。大抵下利脫氣至急。五奪之中。惟此爲甚。故不厭詳。審下利日十餘行。脉反實者死。傷寒發熱下利至甚。厥不止者死。厥證但發熱則不死。以發熱則邪出於表。而裏證自除。下利自止也。若反下利厥逆。煩躁有加。則其發熱又爲眞陽外散之候。陰陽兩絕。故主死也。傷寒發熱下利。厥逆。躁不得臥者死。躁不得臥。腎中陽氣越。

絕之象也。下利而手足厥冷。皆爲危候。加以發熱躁不得臥。不但虛陽發露。而眞陰亦以燦盡無餘矣。安得不死乎。金匱要略云。六府氣絕於外者。手足寒。五藏氣絕於內者。利下不禁。氣已脫矣。此參合陳素中辨證之大略也。廉勤傷寒協熱下利。十有七八。俗人不識。呼爲漏底傷寒。往往妄用溫燥止瀉之劑。以助熱邪。轉變危症。可悲也夫。然據前辨。皆以傷寒之下利以立法。其他泄瀉類證甚多。原因尤別。今舉其重要者。再辨於下。景岳云。泄瀉之本。無不由於飲食不節。起居不時。脾胃受傷。則水反爲濕。穀反爲滯。水穀精華之氣。不能輸化。而泄瀉作矣。泄者。大便溏薄。或作或止。瀉者。大便直下。水去如注。雖分輕重。總屬脾傷。脾受濕而不能滲泄。傷闌門之元氣。而分利無權。併入大腸。遂致成泄。故腸鳴溺少。大便反快。是泄固由於濕矣。難經云。濕多成五泄。曰殄。曰漉。曰鶩。曰濡。曰滑。殄泄者。完穀不化。濕兼風也。兼惡風自汗。腸鳴。脉絃者。宜胃苓湯加升麻煨防風。又有久風入中。令清氣下降而不升。