



類證治裁卷之五

丹陽林璣琴齋嗣甫著

男芝本校

頭風雷頭風附

風邪上干。行感為頭痛。深入則為頭風。其症頭顱重暉。或頭皮麻痺。或耳鳴目眩眉稜緊掣。由素有痰火復因當風取涼。邪從風府入腦。鬱而為熱。為痛。甚則目病昏眩。頭風必害眼。當分偏正。左右寒熱氣血治之。痛在正頂。多太陽經風鬱。宜川芎。羌活。蔓荆。蘇葉等散之。不治太陽經從頭角下經後也。額至巔。絡痛在左右。多少陽經火鬱。宜甘菊花。丹皮。山梔。桑葉。鉤藤等。發之。少陽經從頭角上經後也。耳及耳之前後也。痛偏左。為風虛。防風。薄荷。痛偏右。為痰熱。黃芩。石膏。氣虛者。因勞。補中益氣湯。血虛者。善薦。四物湯加熱。痛者惡熱。消風冷丸者畏寒。追風散。寒熱久鬱。發時悶痛欲睡。裏者多痰。散。二陳湯加酒芩。荆芥。風兼熱者。茶調散。細辛。寒挟熱者。導痰湯。加。川芎。薄荷。石膏。菊花散。散。寒。疼痛者。蒼朮。白芷。痛連齒齦者。鉤藤散。加。痛掣眉棱者。選奇湯。散。鼻流臭涕者。芎庫散。或透項。或搗鼻出涎。散。全蝎年久不愈者。烏頭南星末。慈婦女血。分受風者。養血祛風湯。散。其有因膽火上逆。為暉痛。治宜泄熱者。用羚羊角。生地。丹皮。散。因肝陽乘胃。為嘔吐。治宜熄風者。用蕤神。甘菊炭。鉤桔。甘菊。苦丁茶。嫩桑葉。因肝陰虛。內風動。治宜滋液者。用復脉湯。去參。姜。因陰傷陽。浮齒痛。筋惕。治宜鎮攝者。桂枝加雞子黃白芍。因內風。頭痛。渴羊角。通草。苡米。因內風。頭痛。渴。羊角。梗薄荷。鈍。因內風。頭痛。渴。人參。白芍。鉤藤。

冷目昏治宜潤養者用杞子首烏茯神柏子仁甘菊炭頭腦鳴響狀如蟲蛀名天白蟻者茶子末頭多白屑作痒者零陵香白芷煎汁入雞子白攢匀敷雷頭風腫痛起塊憎寒壯熱腦震如雷鳴者清震湯涼重剷誅伐無過河間立消震湯腦風項背怯寒腦戶穴冷者散首風因于新沐汗多惡風者白芷丸餘參頭痛門治

頭風脈候

浮為風緊為寒浮滑為風痰洪數為風熱陽弦為頭痛細而堅為溼弦而濡為氣虛芤為血虛滑為痰厥頭痛脉急短濶者死凡診寸脉短者頭痛寸口緊急或浮或短或弦皆主頭痛

附 方

補中益氣湯見一卷中風

四物湯見一卷中風

消風散見二卷失音

追風散炮川烏煅石膏炒僵蠶荆芥白芷各二錢半

茶調下錢二分白附子羌活地龍全蠍白芷各二錢半

乳香沒藥各五分

二陳湯見一卷中風

茶調散見一卷傷風

熱風痛瘻虛血虛氣冷痛

菊花散

甘菊花
錢五分
旋覆花
見一卷中風

防風

桔壳

羌活

石膏

蔓荆子

甘草各一

導痰湯

荆芥
防風

陳夏防

芩參草

麥冬石膏

甘菊或加生地

選奇湯

川芎
羌活各三錢

黃芩一錢

甘草八分

芎岸散

川芎
麥冬
阿膠

石膏片腦

人參

茯苓

炙草

細辛

犀角

山

透頂散

細辛二莖
研半

瓜蒂七个

丁香三粒

糯米七粒

冰片

麝香各一分

或加生地

全蠍散

全蠍廿一个
太陽穴

豆許隨病左

地龍六條

土狗二个

五倍子五錢

為末酒調搘貼

頭

養血祛風湯

川芎
蔓荆各五分

歸芍

羌活

姜

東

辛

地

夏草

藁本

石膏

旋覆

復脉湯

見一卷中風

川芎

蒼朮各四錢

荷葉各四錢

清震湯

升麻
川芎

蒼朮各一錢

先煎鮮荷葉水

加姜

細辛

藿香

等分為末薄荷荆芥湯下

解雷湯

落葷子三錢
再入藥煎七分服

升麻

川芎

蒼朮各一錢

先煎鮮荷葉水

加姜

細辛

藿香

神聖散

葛根半生半炒
研半

麻黃

細辛

藿香

等分為末薄荷荆芥湯下

川芎丸

川芎四兩
天麻一兩

蜜和每兩作十九

以一九細嚼

茶酒任下

白芷丸

新白芷不拘多少挫細
荆芥湯下

以蘿蔔汁浸臘乾研蜜丸

彈子大每一丸細嚼

雷頭風

薛

憎寒發熱頭痛腦如雷鳴一夕頂發塊癟甚多延及項後都成瘡瘍俗醫以為外

症用敷藥罔效。診其脉浮大審，知為雷頭風。按東垣先生論此症狀類傷寒病，在三陽不可過用寒涼重劑。誅伐無過故劉河間立清震湯治之。用升麻三錢、蒼朮一錢、青荷葉枝、薄荷錢如法二服立消。此痰火上升故成結核，腫痛用蒼朮除溼，薄荷散風火升麻荷葉引入巔頂升發陽氣，自得汗而腫消。

癘風論治

癰風

紫雲風

癰疥癩斑附

繡毬風

鷓來風

蛇皮風

鵝掌風

赤白遊風

紫白

癰風惡疾也。俗名大麻風。其症皮肉麻頑，身面疙瘩攝之則痒痛腐潰，漸至目紅鼻赤，四體攀搔，頭面突腫。蓋中天地間一種風毒厲氣，淫于腑臟骨髓，注于經絡肢節。久而後發，亦有骨肉傳染而得者。立齋分別五藏受病：謂眉先落者，毒在肺；面發紫泡者，毒在肝；足底痛或穿者，毒在腎；遍身如癬者，毒在脾；目先損者，毒在心。一皮死，不仁二肉死。鐵刺三血死。潰爛四筋死。指脫五骨死。鼻柱崩塌至于聾啞目盲，皆為難治。內經治法以銳鍼刺其腫上出惡血，重洩毒也。其惡血滯在肌表經絡者，宜汗宣刺。汗用紫萍散，刺取委中穴，再造毒刺取委中穴，再造毒刺。其腫上體患多以散。取毒血從齒縫中出，并刺臂腕指縫，下體患多以散。取蟲積從穀道中出，仍鍼腿脰趾縫，上下相等。用必勝兼取治法，力通府藏外達經絡，養營益衛補正逐邪。若妄投燥熱，膿水淋漓，肝血益涸，風熱益熾，腎水益傷矣。初起頭面搔痒，發出紅紫疹塊者。用防風通聖散加苦參、天麻、蟬退數服，或服八珍湯聖愈湯。外用白玉蟾浴湯，加羌活、白芷洗浴後，蟾擦。

搽凡遍體腫塊。以生姜蘸其燥起白屑繫血不榮膚。四物湯加荆防。搔如隔帛繫氣不

充表。

養營

面部麻木繫氣血不能上榮。補中益氣湯。應疹赤暈繫風熱入營。寢者胡麻散。虛者桂枝湯。

風疙瘩破痒繫風毒傷血。吳活當歸散或當歸飲加山梔鈎藤指節攀拳繫陰火燙力加味逍遙散加鈎藤與換肌散間服。

鼻赤屑落屬肺經風熱。人參消風散。加天麻僵蠶面發紫泡屬肝經風毒。施子清肝湯加鈎藤金銀花兼服六味丸筋骨

掣痛屬肝腎陰虛。六味地黃湯。口眼喎斜屬風動煙厥。用全蠍酒洗鹽培研殼蠶。

來小柴陽虛怯冷。補中益氣湯。瘡久潰爛。搽紅玉散。足心穿破。服六味湯。寒熱往

丹通治風癩。稀翁丸。一切毒癘危症。五龍丸。千年藥東華玉散。去風邪。腎囊溼痒者為繡述風。蛇床子湯加川芎當香蔥。

如癬蟲蝕成瘡者為腎藏風。六味丸以滋腎水。目睛溼痒者為繡述風。外用土槿皮川芎當香蔥。

皮頑肌燥至秋痒發者為鴈來風。宜吳活白芷散。諸方選用。若大癟湯類症則有兩陳砂赭石枯芩川椒樟腦研香油調擦掌心頑厚。白皮鱗屑者為鴟掌風。內服大消風散。

火龍散繼服補劑外用雄黃硫黃珠。或加味逍遙散。去風邪。腎囊溼痒者為繡述風。蛇床子湯加

桐油調鴿糞擦之。臂腿瘡癩遊走不定者為赤遊風。赤用加味逍遙散。其肌肉斑駁紫

為紫癥。通用川附硫黃研末姜汁調勻。茄蒂或用水銀輕粉調姜汁擦之。

身發紫斑延暉。如霞者為紫雲風。何首烏散。

光夏月汗斑用蜜陀僧末洋糖醋調黃瓜蒂擦之。雀斑酒刺白屑風痒。玉肌散。此因癟風類及之。他如脫跟

魚鱗載蛇蛇雞爪等風。不過多立名色。前明沈氏嵩科。數四卷皆論風癩治法。以祛

風瀉火殺蟲排毒為先。補血壯元導滯堅筋相濟。忌用熏刺鋒鏹輕粉戒房室禁火燭

鹽醬大楓子性畏益及一切辛葷動風食品方可延生。否則愈而再發必死。昔孫真人治此症百餘人得免于死者二。朱丹溪治五人得免者僅一婦人。然則癘宜易治哉。

癘風脉候

癘風陽脉浮弦關前陰脈實大後兩寸浮而緊。或浮而洪。浮緩者易治。洪大而數。或沉寢者難治。脉若沉而病反在上。浮而病反在下。皆不治。

附 方

紫萍散紫背浮萍一味晒乾研末每服三錢

以黑豆淋酒臨卧調服取汗弱者

涼膈散見一卷中風

雙解散見一卷疫

樟皮散樟皮四兩炒灰

荆芥穗二兩

炙草五錢

枳壳四兩

杏仁二兩

白蒺藜

苦參

防風

醉仙散胡麻牛蒡蔓荆枸杞俱炒各一兩

白蒺藜

苦參

防風

晨午各一服

服至五七日齒縫中出臭涎

令人如醉下盡惡物

病根乃去

多乳香

沒藥

麝香

全蠍

蛤粉

大楓子

藿香等味

再造散麝金角刺各五錢

全蠍

蛤粉

大黃製一兩

白牽牛

取頭末半生半炒六錢

必勝散換柳角刺各五錢

大黃製一兩

輕粉二錢

為末分七服

糖五匙

姜汁五匙

汗裏表

發汗攻風

體上風

下體風

調服

癰

防風通聖散

薄荷

大黃

芒硝

石膏

滑石

芩

桔

草

連翹

麻黃

八珍湯 見一卷中風

聖愈湯 見二卷勞瘵

白玉蟾浴湯 蒼耳子

馬鞭草

防風 荆芥 紫蘇 苦參 銀花 白芷

白玉蟾擦藥 白芷

澤蘭 草烏 南星 杏仁 半夏 大楓子

白芨 白薇 白薇 蛇

四物湯 地芍 归芍

等分為末 姜片擦之

半夏 大楓子 白芨 白薇 蛇

養營湯 見二卷勞瘵

補中益氣湯 見一卷中風

胡麻散 胡麻兩半

苦參 蔓荆子 荆芥 首烏各八錢 咸靈仙 防風 葛蒲 牛

祛風丸

甘菊 枳 防 芍杞 草地骨皮 生地 熟地 蜜丸

羌活當歸飲

當歸 麻各一錢 羌活 水煎 荆芥 荩草 黃連 牛蒡子 升

當歸飲水煎

芍药 地芍 荆芥 防 蕺藜各錢半 者 草 首烏各一錢

加味逍遙散

見一卷火

消風散

見二卷夫音

換肌散

白花蛇 黑花蛇 酒浸各三兩 地龍 當歸 細辛 白芷 天麻

葛根 不灰木

甘草 天冬 荆芥 菊花 苦參 紫參 沙參 木賊草 白芨

梔子清肝湯

梔子 清肝湯 分水煎 丹各二錢 川芎 蒼朮 木鼈子各兩 赤芍 九節菖蒲 定風草 首烏 温酒 調下 牛蒡各七分 甘草五

火肝

六味丸見一卷中風

小柴胡湯見一卷溫

十全大補湯見一卷中風

痛瘻溼除溼逐毒滌 毒追治通治虛風心足數外爛瘡虛陽熱寒虛腎

雲紫 掌鵝皮蛇來鷹綯繡藏臂
頑麻方傳仙尹 種六十三毒風

一埽光

防風
荆芥

苦參

地骨皮

薄荷

甘草

為末每服三錢

蜜水

玉肌散

荳粉
荆芥

八兩

滑石二兩

白芷一兩

白附子五錢

為末每晚用數

肥皂丸

荳粉
荆芥

一兩

為末入肥皂角去子

經三斤

防風

薄荷
甘松

搗丸晒乾晨擦

山柰

朴硝各

癩風

叔傳染毒癩由足趾麻木漸至肌肉不仁身發紅暈常服京口嵩門治風丸散大率瀉毒品味如苦參丸必勝散等類初服大使日三四行紅暈雖退而精神日削纏綿數載眉脫眼斜予謂驅毒宜兼補元否則正氣陷下邪毒留滯非治法矣用八珍丸料加製首烏生杜仲炙黃耆蒸牛膝玉竹天麻獨活秦艽威靈仙乳香沒藥蜜丸兼服酒藥用白花蛇穿山甲松節金毛狗脊威靈仙桑寄生苦參丹參當歸玉竹木瓜桂枝浸煮溫服一料精神稍復痺痛亦定後仍服京口丸散便瀉食減筋攣肉腐平成不救

某 癩風初起左足跟出水左手麻痺不隨脉虛濡按之不起此陰血虛而受風溼癩毒也用熟地當歸川芎杞子首烏白朮黃耆牛膝生杜仲五加皮獨活桂枝鈎藤姜黃熬膏沖酒服手足運掉得舒然此症乃冷癩毒邪乘虛襲入經絡經謂邪之所湊其氣必虛若不遠帷幙慎調攝久之筋骨刺痛眉落眼邪鼻塌肉腐十不一生矣周 壯歲感創症初由臂膿腫硬手腕痛痛延至遍體上下骨節掣痛面發紅斑溼毒

淋漏多在支節診之脉沉數此癘毒從經絡竄入骨髓須用鍼砭去惡血以洩毒非藥力所及辭不治

痺症論治

諸痺風寒溼三氣雜合而犯其經絡之陰也。風多則引注寒多則掣痛。溼多則重者良由營衛先虛腠理不密。風寒溼乘虛內襲。正氣為邪所阻不能宣行因而留滯。氣血凝滯久而成痺。或肌肉麻頑。或肢節攀急。或半體偏枯。或偏身走注疼痛。其不痛者病久入深也。故在骨則重而不舉。在血則凝而不流。在筋則屈而不伸。在肉則麻木不仁。在皮則皴揭不禁。皆痺而不痛。蓋痺者閉而不通邪在陰分也。故經以病在陽為風。在陰為痺。陰陽俱病為風痺。經言三氣雜合。耑言痺病所困也。在陰為痺。分言表裏有殊也。陰陽俱病。表症更兼裏症也。 經痺論曰：風寒溼三氣雜至合而為痺。痺非偏受一氣。如走注之類。寒勝者為痛。脾寒凝則行。痛有定溼勝者為着。著不移或腫痛或不仁。溼人處即痛。風溼勝者為着。後土化病發肌肉即麻木也。 以冬遇此為骨痺。在骨以春遇夏氣。以夏遇此為脈痺。在脈以至陰遇此為肌痺。在肌肉以秋遇此為皮痺。 長夏氣以春遇此為筋痺。春氣在筋以夏遇此為筋痺。在筋有骨筋脈等痺也。 所謂之時而命名。非此外別有骨筋脈等痺也。 五藏皆有合病。久而不去者內舍于其合。經云。諸痺不已。亦溢內也。風勝者易已。留皮膚者易已。故骨痺不已復感于邪。內舍留筋骨者痛久其入藏者死。凡痺逢寒則急。逢熱則縱。 故骨痺不已復感于邪。內舍于腎筋痺不已復感于邪。內舍于肝脈痺不已復感于邪。內舍于心血痺不已復感于邪。內舍于脾皮痺不已復感于邪。內舍于肺。此經病入藏也。經論五痺之入藏者曰。肺脾煩滿喘而嘔。心痺脈不通煩則心下鼓。

暴上氣而喘。嗌乾善惡。厥氣上則恐。肝痺夜卧則驚。多飲數小便上為引。如懷腎。痺善脹。尻以代踵。脊以代頭。脾痺四肢懈惰。發效嘔汁上為大塞。其入府者別有腸痺。胞痺。另詳此。五藏之痺各以其時重感于風寒溼之氣也。風勝脈必浮。寒勝脈必濤。溼勝脈必緩。三痺各有所勝。用藥以勝者為主。而兼者佐之。治行痺散風為主。兼去寒利溼。參以補血。行風自減也。湯防風痛。寒溫寒為主。兼疏風滲溼。參以益火辛溫解凝寒也。加減五積散。治著痺利溼為主。兼去風逐寒。參以補脾補氣。土強可勝溼也。湯加耆术。其症散。蒼肩背沉重。肢節疼痛。下注足胫。屬溼熱。當歸拈術散。有風溼。羌活勝瀆。有寒溼。苡仁湯。痺而身寒。如從水中出者。屬寒溼。丸子有溼熱。加味二痺湯。史公酒。有寒溼。川芎茶苓令其症散。有冷痺。風冷頑麻。有熱痺。熱毒流注骨節。有營熱。四物丹去川芎。有營虛。當歸建中湯。有衛虛。防己黃芪湯。有氣痺。痺在氣分。因勞汗出。卧被風吹。血入肺者渴。蠲痺湯。有有血痺。痺在血分。因勞汗出。卧被風吹。血敗血入飲煎成。有停痰。遍身走痛。二陳湯。加羌活。有支飲。痺指達。茯苓丸。有在經。木防己湯。有入絡。活絡飲。加桑寄生。咸靈丹。治法總以補助真元。宣通脉絡。加活血丹或續斷。使氣血流通。仙鈎藤。牛膝。或活絡丹。治法總以補助真元。宣通脉絡。加活血丹或續斷。使氣血流通。

暢則瘳。自己。

風寒溼合痺。氣血凝滯。身重而痛。手足掣急。石頑改定三痺湯。或通痺散。

周痺。真氣不能周于身。渾身痺痛。風寒溼氣客于肉分。內不在藏。外未發皮。行遍身走注不寧。上半身甚者。烏藥順氣散。下半身甚者。虎骨散。

痺節攀痛。筋風活血湯。痛甚者。散。

著留者之處。身重痠疼。天陰即發。除溼蠲痛湯加不應。補中益氣湯加。骨痺即寒痺痛痺也。苦痛切骨。安腎丸

痺筋即風痺也。風熱攻注。筋弛脉緩。角散。

續斷

痺即熱痺也。

金匱云。經溼則痺。脾絡熱則痺。

風溼鬱熱。經隧為壅。升丹湯去桂麻加草薢石膏。

痺即溼瘡者。痺也。渾身上下左右麻木。

屬衛氣不行。或秦艽四物湯後用人參丸。

本方去蔓荆加桂枝羌活防風。

去蔓荆倍黃皮加防風。

肌肉麻木。屬營氣不行。本方去蔓荆加桂枝羌活防風。

丹溪曰。麻為氣虛。木為溼痰敗血。

皮邪在皮毛。搔如隔帛。或癰疹風瘡。

宜疏風養血。黃湯。

秦艽地黃紫苑。

五藏經病入藏。邪勝正虛。

五藏腎痺。本方加獨活肉桂杜仲半膝黃耆草薢。

本方加東心脾遠志茯苓。

神農脾痺。

本方加厚朴枳肺痺。本方加半夏杏仁神曲。

仁麻黃紫苑。

入門曰。痺初起。駁用參耆歸地。則氣鬱滯邪不散。只以行溼流氣藥主之。久而不愈。宜

峻補真陰。使氣血流行。則病邪隨去。

參景丘論

痺與痿相似。但痿屬虛。痺因血虛火盛。肺熱焦而成痺。因風寒溼邪侵入而成。

也。痺又為中風之一。然受病各異。痺兼三氣。邪為陰受。中風邪為陽受也。

尊生書曰。陽者表與上陰者裏與下也。

與痺與風痿形症雖相似。醫治之法可相混乎。

沈氏集說

治療而用風門通食之劑。醫之過也。痺症非不有風。然風入陰分。與寒溼互結。擾亂其

血脉。致身中之陽不通于陰。故致痺也。古方多有用麻黃者。以麻能通陽氣。白芷能行營

白芷。以黃能通陽氣。白芷能行營

衛然已入四君四物等湯中。非耑發表也。至于攻裏。則從無用之者。以攻裏藥皆苦寒。
用之則陽愈結。其痺轉入諸府。而成死症矣。醫通

戴人曰。痺病以溼熱為主。風寒為兼。其脉沉濇。乃治此者不分經絡表裏藏府。便作脚氣寒溼治。而用烏附乳沒燥熱。以致便尿濇滯。前後俱閉。虛躁日甚。肌肉日削。飲食不下。雖華扁亦難措手矣。

痺症脈候

脉濇而緊為痺痛。脉經脉大而濇為痺。脈急亦為痺。玉機浮濇而緊。風寒溼三氣皆備。脉訣肺脉微為肺痺。心脉微為心痺。右寸沉而遲濇為皮痺。左寸結而不流利為血痺。右關脈舉按皆無力而濇為肉痺。左關脉弦緊浮沉有力為筋痺。醫通

附 方

防風湯見一卷溼

加減五積散見一卷溼

川芎茯苓湯赤苓

桑皮各錢半
炙草各五分

川芎 防風

麻黃 赤芍

當歸各一錢

東皮

棗二枚

炙草各五分

川芎

防風

麻黃

赤芍

當歸各一錢

桑皮

棗二枚

炙草各五分

川芎

防風

麻黃

赤芍

當歸各一錢

桑皮

棗二枚

炙草各五分

川芎

防風

麻黃

赤芍

桑皮

棗二枚

炙草各五分

川芎

附子丸 附 姜 芍 苓 參 草 术 桂

苡仁湯

苡仁 歸 芍 姜 桂 羌 獨 防 术 草 川烏 麻黃

當歸各一錢 水煎

三癆湯

地桂心

芍歸細辛

秦艽參者芩草

防獨杜仲牛膝續斷

加味二妙散

己黃藥酒炒

蒼朮米泔浸炒名二妙丸

此加當歸牛膝防

蒼朮散

蒼朮黃藥各四兩

毫板虎骨酥炙二兩

防風一兩為末每服二錢

當歸拈痛散

見一卷溼

消風散

見二卷失音

清暑益氣湯

見一卷暑

巴戟天湯

巴戟二錢附子牛膝草薢各錢半

肉桂皮石斛

防風炙草當歸各一分

千金犀角散

犀角鑄二兩

羚羊角鑄一兩前胡黃芩

桂枝各用姜汁拌炒五錢施仁大黃升

四物湯

地芍歸芍

甘草五分射干酒炒黑四錢豆豉一升研末

當歸建中湯

見三卷脾胃

防己黃耆湯

見一卷溼

蠲痺湯

耆根芍羌防姜黃各一錢半

甘草五分姜五片東二

黃耆五物湯

耆桂枝各三錢姜六片東二枚日三服一方加人

桃紅飲

桃仁紅花川芎當歸尾威靈仙煎好加麝香少許冲服

寒溼熱暑熱風熱溼熱溼寒溼熱溼熱營熱痺冷衛虛血瘀虛氣虛

二陳湯見一卷中風

指迷茯苓丸見二卷痰飲

木防已湯木防已 石膏 桂枝 姜黃 杏仁 桑枝

活絡飲木 歸 芳 羌 獨各一錢 甘草五分 姜

活絡丹川烏

草烏各炮去皮臍

南星胆奮丸次 地龍培乾各一兩 乳香

酒下

酒糊丸

活血丹熟地

三兩 參 术 歸 芳 獨斷各一兩 酒糊丸

續斷丹續斷

草薢 牛膝 木瓜 杜仲各二兩 蜜丸 酒下二錢半

人參散人參二兩

杜仲 黃耆

棗仁 挑神各一兩 五味子

川芎 熟

改定三痔湯參

芩 术 草 蘭本 歸 芳 老桂心

丹砂五錢 研服

防已 防風 烏

通脾散天麻三兩

獨活 姜 紫本 歸 芳 术各二兩 研服三錢 酒下

烏藥順氣散

見一卷中風

虎骨散虎骨二兩

白花蛇 天麻 防風 牛膝 燭蠶

當歸 乳香 肉

桂各一兩 索草 全蠍各五錢 麻香一錢 每末服二錢

防已 乳香

南星 蒼朮 羌活

疏風活血湯歸

芍 咸靈仙 白芷 防已 黃藥

丹砂五錢 研服

澤瀉各一錢 陳皮一錢 甘

五靈散五靈脂二兩

川烏 雨半 没藥一兩 乳香五錢

澤瀉各一錢 陳皮一錢 甘

除溼蠲痺湯蒼朮二錢

白朮 茯苓 羌活 泽瀉各一錢 陳皮一錢 甘

酒糊丸

酒糊丸