

藥性驪珠

何龍舉
輯

藥性
驪珠

中醫古籍出版社

成都何仲皋先生著

藥性驪珠

四川高等國醫學校發行

據中國中醫研究院圖書館藏

一九三五年四川高等國醫學校石

印本影印原書板框寬一二〇毫米

高一八五毫米

藥性驪珠叙

醫之用藥如將之用兵兵各有其能各有其性非常用之則水陸攻守不知其所長以之制敵烏能必其勝藥亦各有其能各有其性非習而用之亦未必能中其病也神農本草為葯經之祖然其中有專長有兼長古人用葯即用其專長故以之治病如矢之破的而不失其正鵠余與諸生研究醫學藥性一科既致其兼長之性又明其專長之功可謂詳且盡矣然不觀古人之成法知之而無所據行之而未必有所從故又於古人所立之方所用之葯採而錄之以示其專長之果有所在又恐撰方不一難於記憶復以古調西江月出之名曰用藥指南使學者由爽口而爽心因得心而應手用葯之際由一推百自能絲絲入彀而無毫髮之差矣是為序

藥性驪珠首卷

簡陽何龍舉輯

第一章 總論

藥物之定義 凡物質入人體內因其所秉之氣味功能以治愈疾病者曰藥物西醫不明陰陽對於藥物祇知其功而不明其性故用之也效者半不效者半例如通便劑之巴豆油大黃硫酸鈉（芒硝）等均可隨用只以緩瀉劇瀉為區別（國醫則必別其性以定用藥之標準）例如芒硝味鹹性寒有熱而使不通者宜之大黃味苦性寒有濕而大便不通者宜之不可混一故用之屢奏奇效而無副作用之弊

藥物之質料 西醫因化學發達所用之藥多係化學物從大產品內提出藥之有效成分自表面觀之似覺式樣新而法奇究之天產品殊失時有之效力且經製造之後功用全殊例如國醫之研究麻黃汗劑藥也而根則可止汗當歸首止

血藥也而尾則可破血牛膝生用下走如奔得酒則大補肝腎倘不分別用之治
病必多訛誤國醫之論藥物者必究其脈造時月生熟陰乾暴乾新陳產地以及
宜歡宜凡宜水煮宜酒漬宜膏宜煎或蜜炙或醋炒或土炒並用片用節用稍用
葉用枝用根用皮用心去頭去尾去心去皮去油等因國醫于氣化之研究特為
先寬故分析詳而奏效捷茲將國藥之種類略舉如下

- (1) 根類 病在中焦方上焦者用
- (2) 梢類 病在下焦者用
- (3) 頭類 病在身半以上者用
- (4) 身類 病在中者用
- (5) 花類 病在表者用
- (6) 實類 病在裏者用
- (7) 葉類 病在上者用
- (8) 皮類 病在皮膚者用

(9) 心類 病在表者用

(10) 絡類 病在經絡者用

(11) 骨類 病在裏者用

(12) 核類 病在裏紋結核者用

(13) 肉類 病在裏者用

(14) 枝類 病在表及上者用

(15) 石類 病在裏及下者用

(16) 動物之各部 其治病多以類相從

(17) 油類 潤劑用之

(18) 火類 寒病用之

(19) 水類 熱病用之

(20) 金類 裏病及宜重墜者用之

藥物作用之分類 藥物對於人身之作用雖千差萬別大約可分為十六類如

巴溫下
大黃寒下

下

- | | |
|---------|---------------|
| (1) 宣劑 | 病壅塞者宜之如瓜蒂赤豉之類 |
| (2) 通劑 | 病滯留者宜之如滑石茯苓之類 |
| (3) 補劑 | 病虛弱者宜之如人參黃耆之類 |
| (4) 洩劑 | 病積聚者宜之如巴豆大黃之類 |
| (5) 輕劑 | 病鬱閉者宜之如煨花柳退之類 |
| (6) 重劑 | 病驚怯者宜之如磁石硃砂之類 |
| (7) 滑劑 | 病澀者宜之如麻仁油脂之類 |
| (8) 潤劑 | 病滑脫者宜之如龍骨牡蠣之類 |
| (9) 燥劑 | 病水濕者宜之如蒼朮木香之類 |
| (10) 熱劑 | 病寒涼者宜之如乾薑附片之類 |
| (11) 寒劑 | 病大熱者宜之如犀角羚羊之類 |
| (12) 潤劑 | 病枯燥者宜之如麥冬河膠之類 |

(13) 止痛劑 病疼痛者宜之如乳香沒藥之類

(14) 消腫劑 病腫脹者宜之見腫消難矢白之類

(15) 化腐劑 病瘡瘍者宜之如白降丹之類

(16) 生肌劑 病瘡瘍已潰者宜之如紅升丹之類

處方之配合 藥有相使相畏相惡相反相殺相須及單行七種單行者不用輔

也相須者同類不可離也相使者我之佐使也相惡者奪我之能也相畏者受彼

之制也相反者兩不相合也相殺者制彼之毒也當用相須相使者勿用相惡相

反者若有毒宜制可用相畏相殺者不尔勿用也

氣有多少形有盛衰治有緩急方有大小病有遠近證有中外治有輕重近者奇

之遠者偶之汗不可以奇下不可以偶補上治上以緩補下制下制以急近而偶

奇制小其服遠而奇偶制大其服大則數少小則數多多則九之少則一之奇之

不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反從其病也

人大方 或藥物之品多或藥物之分兩重

必小方 或藥物之品少或藥物之分兩少

又急方 或氣味俱厚或毒藥奪病或湯散蕩滌或病急急攻等

又緩方 或用甘緩之味或無毒治病或藥物品多或丸藥遲進或氣味俱

薄可

又奇方 或藥物陽數或獨用一味

又偶方 或兩位相配或二方相合或藥合陰數

又複方 或二方三方及數方相合或本方之外別加餘藥或分兩均齊

藥物製劑之種類 西醫藥物製劑大概以藥物性質為標準醫藥藥物製劑對於

病理藥理頗有關係種類繁多略舉如下

1. 湯劑 蕩除臟腑開通經絡調品陰陽者用之

2. 散劑 或五臟之結去六淫之邪者用之

3. 丸劑 治緩病者用之其法有七

一、麩糊 取其遲化直至中下 二、酒醋 取其易散

三、薑汁

取其除溫

四、柿餅

取其安胃易化

五、水

取其易化

六、蜜

取其遲化而氣循經絡

七、蠟

取其難化而旋之收斂或盡藥不傷脾胃也

八、膏劑

內服取其味厚外用者分為二

一、硬膏

平時並硬遇溫後始漸之軟化

二、軟膏

柔軟能適意改變其形容者

以上二種均由主藥与油脂等賦形藥混合製成

九、丹劑

內服取其藥濃而奏效速外用分為二種

一、升丹

生肌用

二、降丹

化腐用

以上二種用特別裝置在火中或水中升之

十、坐藥

專擇入肛門及陰戶中治下部之疾病或作提或以棉色之

久酒漬

取其補中乃用酒浸出藥中之有效成分也

8. 戒咀

古制以口咬細

每斤合中國秤六分六厘六毫其中分字即份字字意如八兩為八分則二分為二兩餘類推用林杏打拉門或安士或加倫者則英國秤也一林士合中國庫秤一厘七毫五絲六十林士為一打拉門合中國庫一錢〇五厘八打拉門為一安士合中國庫秤八錢四分一安士為一加倫合中國庫秤一百二十兩八分有用克者則法蘭西也一克即一克爾德合中國庫秤二分二厘八毫

9. 炙烘

然藥以運皮膚使藥力從外達內也

藥物之用量

凡稱為等分者謂諸藥之斤兩皆等也刀圭者十分方寸匕之一

准如梧子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取之不落為度五匕者方寸匕之

五分也一撮者四刀圭也以升合分者謂藥物有虛實輕重不得用斤兩則以升

平之古之一升即今之二合半也

氣味性功能 藥分氣味性功能香腥臊腐等藥之氣也酸甘苦寒等藥之味也

寒熱溫涼藥之性也補瀉汗下藥之功也升降沉浮藥之能也

人氣 臊膻之氣入肝焦氣入心香氣入脾腥氣入肺腐氣入腎清氣入上反

表濁氣入下及裏

2. 味 酸味入肝主收吾味入心主堅甘味入脾主緩辛味入肺主散鹹味入

腎主要

3. 性 寒能去熱熱能除寒溫之性次于熱涼之性次于寒毒性能攻邪潤性

能去燥

藥文疏師社代中

脫

功

補能治虛傷可除實汗可去表病下可治裏疾瀉可治滑宜可去清閑

其餘止痛定驚驅風除濕祛痰消腫腫之藥均為藥物之功

功

得者治頭部之病沉者治足部之病升者可使在下之氣上升降者可

使在上之氣下降酸鹹無升甘辛無降寒無浮熱無沉皆藥物之具之

能也至根主升梢主降生主升熟主降則又可以人力改變物之能矣

藥物宜忌

一五宜

青色宜酸赤色宜苦黃色宜甘白色宜辛黑色宜鹹

二五禁

肝病禁辛心病禁酸脾病禁甘肺病禁苦腎病禁甘

三五傷

過酸傷筋辛可勝之過傷氣鹹可勝之過甘傷肉酸可勝之過辛傷

皮毛苦可勝之過鹹傷血甘可勝之

藥物之治病作用

藥物之療病也乃去六淫之外感治七情於內傷調寒陰陽

而諸於平所謂治病必求其本也由本根而施散治外證之消除故人之有各種

病證必視其致病之由而施以治療不能以其有是病而即用是藥更不能如西

醫之對證療法不辨虛實熱寒而妄投藥餌例如傷寒之發熱不得以冷水濕之或用解熱劑熱結旁流之病不得施以止瀉劑也

傷寒之發熱有表熱裏熱之分表熱者身熱惡寒無汗脈浮也裏熱者身熱惡熱汗多脈沉也

表熱者宜辛溫解表裏熱者宜辛寒清裏不可誤也

傷寒之發熱有陽明三陽之分陽明者身大熱汗自出脈洪大也三陽者身熱惡寒無汗脈浮也

陽明者宜辛寒清裏三陽者宜辛溫解表不可誤也

傷寒之發熱有少陽之分少陽者身熱惡寒汗出不多脈弦也

少陽者宜小柴胡湯不可誤也

傷寒之發熱有太陰之分太陰者身熱惡寒汗出不多脈沉也

太陰者宜辛溫解表不可誤也

傷寒之發熱有厥陰之分厥陰者身熱惡寒汗出不多脈沉也

厥陰者宜辛溫解表不可誤也

傷寒之發熱有少陰之分少陰者身熱惡寒汗出不多脈沉也

少陰者宜辛溫解表不可誤也

藥性驪珠卷上

何太夫子仲舉著

四川高等國醫學校校長何龍舉成帙

補劑類

人參

人參性味甘微寒 魂魄能定精神安 補中益氣生津液 久服輕身並延年
(專長) 陽氣虛竭者回之於暫敗之初陰血崩潰者障之於決裂之後
(用藥指南) 人參大補虛損功高白朮黃耆若同薑附治陽虛陰虛歸芍同刺胃
虛食入即吐生薑半夏陳皮老人脾虛下利宜更要鹿茸相濟

甘草

甘草甘平調臟腑 筋骨堅分肌肉補 能增氣力治金瘡 九土之精萬物母
(專長) 解毒瀉火調和百藥
(用藥指南) 甘草解毒瀉火陰頭瘡用蜜敷先生頻服痘疹疏舌腫煎湯漱吐凍
瘡發裂煎洗三黃輕粉油塗莖痛草稍苦棟除煩煮延胡。襄助。

生地黃 熟地黃

生地甘寒血痺攻 肌肉長兮骨髓充 九蒸九晒成熟地 滋陰壯水有奇功

(專長) 生地養陰涼血熱地壯水滋陰

(用藥指南) 地黃爾足名芊取其補腎功深溫病耳聾欲脫精生地復脈要緊腎精耗散若過又宜熱地為君六味八味任加增莫把陰陽錯認

黃耆

黃耆性味甘微溫 能補氣虛治血崩 敗瘡排膿兼止痛 子臟風邪小兒驚

(專長) 托瘡固氣炙者補中生者補表

(用藥指南) 黃耆托瘡固氣表虛此藥為先參考龍腦藕汁丸內固痺疽消散全
遺虛勞裏急黃耆小建同煎桂枝湯內黃耆添又治表虛黃汗

白朮 蒼朮

白朮甘溫瘰癧醫 風寒濕痺並死肌 補脾止汗功推此 蒼朮發汗興運脾

(專長) 善除脾濕