

醫國通卷七

張氏醫通卷之七

長洲石頑張 昭路玉父纂述

男

以柔安世

訥遜言

叅訂

大小府門

泄瀉

靈樞云。夫中熱消痞則便寒。寒中之屬則便熱。胃中熱則消穀令人懸心善饑。膈以上皮熱腸中熱則出黃如糜。膈以下皮寒胃中熱則腹脹腸中寒則腸鳴。飧泄胃中寒腸中熱則脹而且泄。胃中熱腸中寒則疾飢小腹痛脹。

世醫治病但知熱以寒治。寒以熱治。外此總不講也。設病中熱消瘴。而見懸心善饑。洵爲熱證無疑。然必審其臍以上皮熱。方是胃中熱氣蘊隆。若出黃如糜。不但胃中有熱。而腸中亦爲熱。邪奔迫可知。倘臍以下皮寒。而見腹脹有似乎實。熱固結實。爲胃中虛寒之候。或見腸鳴飧泄。非特胃中有寒。且移寒於二腸矣。蓋熱泄則腸垢黃赤。寒泄則鶩溇清冷。此病機之最顯著者。可以明辨。況有脹而泄利黃赤。此脹爲胃寒。陽氣不布之脹。泄爲腸熱使垢之泄。復有消穀易饑。小腹脹痛之病。豈非胃中有熱。腸中有寒之一驗乎。若此種種。苟未明也。

景三瀉心湯黃連湯乾薑黃芩黃連人參湯厚朴

生薑半夏甘草人參湯乾薑人參半夏丸等法必

不可以語至治也

經云春傷於風夏生飧泄風小之邪內○邪氣留連

乃為洞泄和氣留連既久則中氣○清氣在下則生

殄泄下焦虛寒火不生上則中氣○大腸小腸皆屬

於胃胃脈虛則泄脈若氣血之先脈虛則胃虛○溼

勝則濡泄脾意淫淫勝則綿○諸厥固泄皆屬於下

脾腎俱虛則陽氣不能運於四○暴注下迫皆屬於

未故厥冷沉固而泄瀉清冷也○暴注下迫皆屬於

熱暴泄而肛門逆迫此屬火化若暴泄而肛門不禁
非陽久泄○諸病水液澄澈清冷皆屬於寒
火氣炎

注下加以澄澈清
冷安得不爲寒乎

原病式曰。瀉白爲寒。青爲風。黃赤黑皆爲熱也。大抵
瀉利小便清白。不瀉穀不化而色不變者寒也。穀雖
不化而色變黃赤煩渴小便赤瀉者熱證也。寒泄而
消化者未之有也。或火性急速傳化失當。穀雖不化
而果泄臭穢色黃者有之。仲景云。邪熱不殺穀以熱
得泄。則殮泄也。

東垣云。夏間注雨陰晦時行瀉利。予一日體重肢痛
泄利而小便閉澀。思其治法。必用淡滲以利之。今受
寒溼之邪。若從淡滲。非暮年所宜。行年五十。已上降
氣多而升氣少。得淡滲之劑。是降之。又降陽氣愈弱。

精神愈短矣。合用風藥以羌獨升柴甘防同煎。所謂
溼寒之勝。以風平之。又曰下者舉之。是因曲而爲之
直也。若不達升降之理。而一槩施治。安得愈乎。
李全材云。內經之論泄瀉。或言風。或言溼。或言熱。或
言寒。此名四氣。皆能爲泄也。又言清氣在下。則生飧
泄。此名脾虛下陷之泄也。統而論之。脾土強者。自能
勝溼。無溼則不泄。故曰溼多成五泄。若上虛不能制
溼。則風寒與熱皆得干之。而爲病。治法有九。一曰淡
滲。使溼從小便而去。如農夫治澇。導其下流。雖處卑
隘。不憂巨浸。經云治溼不利小便。非其治也。又云在
下者引而竭之。是也。一曰升提。氣屬於陽。性本上升。

胃氣注迫輒爾下陷升柴萆葛之類鼓舞胃氣上騰
則注下自止又如地上淖澤風之卽乾故風藥多燥
且溼爲土病風能勝溼所謂下者舉之是也一以清
涼熱溼所至暴注下迫苦寒諸劑用滌燔蒸猶當溽
暑鬱蒸之時而商飈淅然倏動則炎歊如失矣所謂
熱者清之是也一曰疏利痰凝氣滯食積水停皆令
人瀉隨證祛逐勿使稽留經云實者瀉之又云通因
通用是也一曰甘緩瀉利不已急而下趨愈趨愈下
泄何由止甘能緩中善禁急速且稼穡作甘甘爲上
味所謂急者緩之是也一曰酸收瀉下有曲則氣散
而不收無能統攝注泄何時而已酸之一味能助收

攝之權經云散者收之是也。一曰燥脾土德無慙水邪不濫故瀉皆成於土溼溼皆本於脾虛倉廩得職水穀善分虛而不培溼淫轉甚經云虛者補之是也。一曰溫腎腎主二便封藏之本雖屬水而真陽寓焉少火生氣火爲土母此火一衰何以運行三焦熟腐水穀乎故腎虛者必挾寒脾虛者必補母經云寒者溫之是也。一曰固瀉注泄日久幽門道滑雖投溫補未克奏功須行瀉劑則變化不愆揆度合節所謂滑者瀉之是也。一曰上九治瀉之大法至於先後緩急之權豈能豫設須臨證之頃圓機靈變耳。戴復菴云瀉水而腹不痛者溼也升陽除溼湯或胃

苓湯○飲食入胃輒後便完穀若氣虛也香砂六君
子或枳實理中湯○腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣
者火也黃芩芍藥湯○痰留於肺大腸不固或時瀉
或時不瀉或多或少者痰也脈必弦滑其人神色不
粹二陳加蒼朮木香或探吐之更佳○腹痛甚而不
泄泄後痛減者食積也保和丸消導之○餐泄者史
記名迴風水穀不化溼兼風也風邪于胃木來賊土
清氣在下降陽除溼湯若飲食下噎而輒出不留者
死○澹泄者汚積枯垢溼兼熱也黃芩芍藥湯加香
連○驚澹者中寒糟粕不化色如鴨糞所以澄澈清
冷小便清白溼兼寒也附子理中湯○洞泄者卽名

濡泄體重軟弱瀉下多水溼自盛也青苓酒

去多甚而轉筋血粘故筋急也升陽除溼湯○滑泄

者久下不能禁溼勝氣脫也四柱飲不應用六柱飲

○熱瀉糞色赤黃彈響作聲其門焦痛糞出穀道猶

如湯熱煩渴小便不利五苓散瀉水多者亦必用之

若去桂卽不効○寒瀉腹脹泄注食如神吐理中湯

加肉桂訶子升麻○食久窘迫大便色白腸鳴切痛

脈沉遲身冷不渴溲清或綿綿腹痛附子理中湯加

肉果○暑暴瀉如水周身疼痛汗出脈弱少氣甚

者加吐此名緊病漿水散○盛暑通於外陰冷伏甚

中非連理湯不可氣虛而瀉四君子加升柴肉果

子。傷食泄瀉必噯氣如敗卵臭保和丸虛者治中
湯加減。○積滯泄瀉腹必絞痛方泄者是也。平胃散
加磨積藥。○傷酒瀉葛花解醒湯。○痰瀉則頭暈惡
心胸腹迷悶或時瀉甚或時不瀉。○陳湯加海石香
附星香芩連薑汁調神麴糊丸服。○志早起泄
瀉或時有血午後仍便結糞能食善飲此是酒積作
瀉。○陳加炮薑酒沙川連紅麴陳酒麴糊丸烏梅湯
下有血去半夏加麝少許晨夕各一服。○日間無事
將脯腹膨。○夜腸鳴不得寢泰次早洞泄此名頓瀉
是脾虛溼盛也胃苓湯加水香砂仁虛者理苓湯加
木香。○氣泄腸鳴失氣胸膈痞悶腹急而痛瀉則

下稍安須臾又急亦有腹急氣塞而不逞者比山中
脫停滯氣不流轉木穀不分所致木香調氣散口水
清入胃名爲溢飲滑泄渴能飲水水下復泄泄而大
渴茯苓甘草湯五苓散并炙大世三五壯立已乃督
脈之病也○泄而口渴引飲小便短滴此爲津液內
亡錢氏白朮散○腎水不足之人患泄或過服分利
之劑而渴者加減八味丸失治必致小便不利水腫
脹滿等證成矣○凡大便秘泄服理中湯小便不利大
便反泄不知氣化之故木肺不傳化以純熱之藥治
之是以轉泄少服則不止多服則愈熱所以不分五
苓散加人參炙甘草名春澤湯經云膀胱有州都之

官津液藏焉氣化則能出矣○瀉而腹熱脈滑堅者
屬實當與消導不應是食積發熱也加香連更不應
加大黃微下之○瀉而經年不也者屬寒積備急丸
神効○泄瀉惡心欲吐或水土不伏或感山嵐瘴氣
而瀉藿香正氣散○脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下
水穀不化臍下痞痛腹中雷鳴乃積寒久利腸滑不
禁木香散若藥與食入口卽瀉下者名直腸瀉難治
本方加人參白朮用伏龍肝湯前服○憂思太過脾
氣結而不能升舉陷人下焦而成泄瀉者進迺散去
歸加升麻木香或越鞠枳朮相和服不應用補中益
氣加木香○久瀉穀道不合或脫肛乃元氣下陷天

腸不行收令而然補中益氣加訶子肉果五味烏梅
肉爲丸或四君子加防風升麻○老人消運不及而
膨脹作瀉丸味資生丸加木香善飲者加澤瀉肉桂
○凡瀉多因於溼分利小水爲上若老人氣虛下陷
又宜風藥以勝之如補中益氣加羌防之類或升陽
除溼湯升舉脾胃所謂下者舉之溼寒之勝以風平
之是也大瀉氣脫而不知人口眼俱閉呼及欲絕急
之氣海穴大進參附輩溫補之稍遲卽不可救
五更瀉是腎虛失其閉藏之職也經曰腎司開闔腎
開竅於二陰可見腎不但治小便而大便秘之開闔皆
腎操權也今腎旣衰則命門之火熄而水獨治故令

人水瀉不止其瀉每在五更。天將明時必洞泄二三
次以腎旺於亥子五更之時故特甚也。惟入味丸以
補其陰則腎中之水火既濟而開闔之權得宜。況命
門之火旺則能生土而脾亦強矣。有用六味丸加沉
香砂仁以山藥末打糊代蜜爲丸以攝火歸源而愈
者有用六味丸加遠志益志兼調脾腎而愈者有用
六味丸七分雜二神丸三分服之而愈者有用五味
子煎湯送四神丸者有用二神丸加五味子山茱萸
肉桂茴香陳米飲糊爲丸服者亦有屬酒積食積者
蓋一日進取之物至此時皆下大府而急奔也。但食
積之瀉其腹必脹滿瀉後則頓減瀉下皆是稀糞。酒

積瀉下都是稀沫或有兼血積者與腎瀉之純清水液過乎不同也審係何積卽以何積治之

石頑曰泄瀉諸治法頗詳何獨不及虛損之泄瀉也蓋腎藏真陰虛則火邪勝火邪上升必傷肺而爲欬逆真陽虛則水邪勝水氣內溢必漬脾而爲泄瀉旣救且泄上下俱病先後天之氣竝傷故虛損關捩全係乎此余嘗用理中丸加五味子以治下泄異功散加細辛以治上欬每每獲効若服之作脹發熱者終難挽回不可以其欬瀉俱緩輕許其治也

診口內經云脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入是謂五虛死其漿粥入胃泄注止則虛者活泄而脈大

者難治。大便赤。辨飧泄。脈小者。手足寒。難已。飧泄。脈
小。手足溫者。易已。○脈經云。洩注。脈緩時小。結者生。
浮大數者死。又洞泄。食不化。脈微者。留連者生。緊急
者死。脈滑按之虛者。必下利。腎脈小。甚爲洞泄。脾脈
小爲泄瀉。○仲景云。下利日十餘行。脈反實者死。腹
鳴而滿。四肢清。診其脈洪大者死。腹大脹。四肢清。脫
形泄。甚不及一時而死。下則瀉瀉。上則吐痰。皆不已。
爲上下俱脫死。

滑伯仁治一人年老色蒼。夏月與人爭辨。冒雨勞
役。受饑。且犯房事。夜半忽病發熱。惡寒。上吐下瀉。
昏悶頓躁。頭身俱痛。內改發汗。汗遂不止。脈皆洪。