

重
正
所
所

樂恬散人許槿

題于蘇臺



知識

欽定四庫全書

邗江文富堂發兌

徐敘

從來外科必須傳授成名家者。另有奇方秘法。或各有專長之症。每試必效。非若內科多讀古書。可以對症用藥也。若大概辨別生死。指名瘡症。內服外敷。自唐及明。其法詳備。此書所載諸方。大段已具。又能細載病名。各附治法。條理清析。所以凡有學外科者。問余當讀何書。則令其先閱此書。以爲入門之地。然後再求良法。歲在丁亥。有問道者。欲得余詳爲去取。并加批點。余因驚首至尾。細閱一過。見其所立醫案。荒謬錯雜。毫無知識。至

所載之方。全屬誤用。尤可恨者。將惡毒之藥。以爲常用之品。輕者變重。重者立死。猶自詡以爲神奇。後人讀此書者。信以爲然。事事效法。殺人無算。全無悔悟。云此乃外科之真傳。現有醫藥可據。其九痛者。乃瘡之本症。其死者。乃其人之應死。罪首禍魁。皆此書也。於是奮筆痛罵。指其背。謬以爲讀此書之戒。至其分症列方。頗爲明備。全在施用。不得因此人用法不善。而并其所載之古方而廢之也。洄溪道人徐大椿識。

敘

余昔閱外科正宗。嘗病其紕繆。欲正之。未暇也。旣而從長洲蔣氏夔。得吳江徐氏大椿批本。尋覽數四。歎爲暗室一鑑。遂屬季弟楣手訂。余隨時覆勘。俾成完書。季弟間出其稿。以示同邑蔣子光燭。蔣子願肩校槧之任。已訖功。請余爲之敘。乃言曰。醫仁術也。而易入於不仁。外科爲尤矣。內科之爲醫。技無高下。鮮不欲人之生者。聲譽稍著。妄驕自大。有請不時往。病者忍死以待。不爲矣。外科非欲人之死也。內科之病易壞人。醫者如揀焚拯。

溺外科之病不遽壞人也。緩之以見功。時其急而取厚資焉。賤藥而貴貨。不仁甚矣。雖然此以言乎業外科之無良者也。苟有肺腸。何遽至是。蓋又有入於不仁而不自知者矣。何以言之。外科者。內科之緒餘也。而瘍醫特爲世所賤。簡通人勝流。恥以是名。業此者。大都習內科不成。而後遁於外科。操之旣無其本。所恃獨方藥之末。然且錮藏深秘。諱所自得。其方之良者。旣已隘於施濟。而其未盡良者。或至於殺人。夫以無本之學。守什伯成方。漫爲飛蟲之弋獲。至於殺人。而不思所變計。此所謂

入於不仁而不自知者也。於此有人焉。爲之破其所恃。示以用方之宜。與夫方之偏正純雜寒熱緩急所當詳審。及汰其可以殺人者。因論治法。俾知深求於其本而出之。無至試藥而費人。其爲仁術孰大於是。然徐批此書近百年。轉相傳鈔。未有知棻之者。蔣子獨引以爲已任。昔賢謂棻人詩文集。比於掩骼薶齒。棻此而傳。其於生死而肉骨也。以恒河沙計。無有旣極。豈直爲徐氏掩薶功臣蔣子之用心亦仁矣哉。抑余觀徐氏自敘。本爲問道者發。固將以垂示來者。非以爲一人一家之藏。忍

或者議余季弟與蔣子。輕泄枕秘。又何其自同於不仁也。咸豐十年歲在庚申花朝前三日樂恬散人許樸書於靜心多大年室

重訂外科正宗凡例

一余訂此書大指。以徐批爲主。而間附案語。及采入各方。洞庭王氏鴻緒全生集。治法獨出手眼。與諸書不同。故所采爲多。

一原書文義頗蕪穢。余於正文。不甚更動。於卷一註及餘卷治驗各條。則痛加刪改。雖未能廓濶。稍通順矣。然意義略無出入。讀者可由徐批以識其是非。徐所未批者。亦可推類而得之也。

一各卷歌訣。尤俚鄙。余初仍而不改。旣見別本。頗有

不同。因擇其稍雅馴者錄之。間或竄易一二。俾可
入目而已。

一瘍醫尠能讀書。故刪改多有從俗處。諸方藥品亦
未能悉正。如黃檗作黃柏之類是也。

一徐批原本。或在眉。或在行間。余移附各條後。及本
句下。覽之瞭如。亦免後人重刻挂漏。

一徐批有圈。有點。有勒。有义。余詳註本句下。而通部
別加斷圈。以分句讀。

一原書分十二卷。今增入徐批。每卷葉有多寡。故卷

數仍舊而分卷稍有不同

一是役也釐定體例商推案語發凡於仲兄而往復
辨論以成其是者爲桐鄉陸君以湑同邑王君士
雄同里吳君元禧以徐批別本見借者爲秀水呂
君大綱山陰陳君厚坤力任校刊以濟世而傳後
者則同邑蔣君光燁也例得備書

許楣識

附錄

許樾曰。古人言醫不三世。不服其藥。蓋以其閱歷深而傳授精也。徐氏謂外科必須傳授。亦是此意。然不如身嘗其苦者知之尤確。王洪緒全生集有云。凡疽初起。卽使平塌。不可用托。托則成功。余家治法。以消爲貴。以托爲畏。卽流注癰癤惡核。儻有潰者。仍不敢托。托則潰者雖斂。增出者又當如何耶。真外科千古名言。非余身經體驗。不知。憶余三十歲時。右大腿後患一癰。初起紅腫疼痛。根盤約有寸餘。自揣非攻托不可。敷藥並消散湯。

劑悉屏棄不用。服攻托藥三數劑。遂大如茶杯。膿尙未成。更用大劑攻托。根盤愈大。痛不可言。膏藥自後面環至前面。幾無罅隙。及內膿已熟。頭尙未穿。用齧頭膏齧破。膿泄如注。方能不痛。自此按之有膿。卽換貼膏藥。并重糝呼拔末藥。每日換下膏藥。總有一竹箕。瘡口大如拇指。凡十二日而收功。自以爲用藥精而手段佳。實不知攻托之爲患不淺矣。近二十年來。患對口者數次。患背疽小腹癰者。又各二三次。卽服西黃丸。隨服隨消。戊午年頭面生疔疽十一箇。甚危險。亦賴西黃丸之力居。

多。今年庚申正月。背左又患一疽。漫腫無頭。顏色不變。越日卽如豬肝色。長約三寸。闊二寸餘。第三日有頭數十箇。其點甚細。兩旁尙有漫腫無頭者。第四日有淡黃硬膿。約半粒米大。旁腫處亦照前變豬肝色。第五日硬膿轉爲軟膿。並無稠水。揭膏藥時。膿卽黏下。瘡口深約半分。細如綫香。其數頭并爲一頭者稍大。裏面尙有老膿。仍蓋膏藥。第六日膿頭隨膏藥揭出。已是精肉。第七日長平。第八日有嫩皮。自此不換膏藥。至第十二日癢甚。揭看已是老皮。並不結痂。亦無疤痕。合計數十頭所

出之膿。不及一匙。惟最後一頭出稀膿三日。乾膿兩日而愈。所用之藥。初時外敷紫蟾錠。內服阜角刺四兩。生甘草三錢。兩劑後。接服西黃丸。小金丹。陽和湯。隨後調理脾胃。益信全生集以消爲貴。以托爲畏二語。真外科金鍼。而西黃丸爲消藥第一。卽角刺消散之力亦甚大。大概用角刺不過五六分。至二三錢而止。便是托藥。用至四兩。方是消藥。但服後如未成膿。卽消。儻已有膿。則必大痛。而出膿較速。不至蔓延。卽是功效。此皆余歷經體驗得來。特揭出爲世之業瘍醫者告焉。

槌又曰。紫蟾錠者。合紫金丹蟾酥錠二方而成。用作消藥極驗。無論陰陽二毒皆可敷。二方已見此書疔瘡門。但分合銖兩不同。藥味亦有加增。今另載如左。

山茨菰

二錢去毛皮焙

川文蛤

二錢去蛙末炒

千金霜

一錢去油淨

紅芽大戟

一錢五分去蘆根洗淨焙惟須杭州紫大戟為佳北方縣大戟性烈不堪用

原麝香

一錢揀淨毛皮

明硃砂

二錢漂淨

雄黃

一錢揀鮮紅者

寒水石

三錢煨

銅綠

一錢

膽礬

一錢

明乳香

一錢去油淨

沒藥

一錢去油淨

蜈蚣

二錢去頭足炒

全蠍

一錢酒炒

川山甲

一錢炙

僵蠶

一錢洗去絲炒