

內科易知

內科易知目錄

- 一 頭部
- 二 面部
- 三 耳部
- 四 鼻部
- 五 舌部
- 六 腋部
- 七 乳部
- 八 胸部
- 九 心部
- 十 肺部

十一 各種氣痛

十二 咳嗽

十三 勞傷吐血

十四 哮吼

十五 脾胃

十六 痰疾

十七 三消

十八 飲食積滯

十九 噫膈

二十 嘔吐

二十一 呃逆

二十二 腹部

二十三 痞積

二十四 蟲疾

二十五 鼓脹

二十六 脇部

二十七 腰部

二十八 前陰

二十九 小便

三十 淋症

三十一 遺精

三十二 後陰

三十三 大便

三十四 泄瀉

三十五 痢疾

三十六 脫肛

三十七 痒瘡

三十八 腿部

內科易知目錄終

內科易知

一 頭部

偏正頭風。此症發時雖盛暑亦覺畏風。痛不可忍。

處方 生大烏頭去皮四兩南星

泡一兩

右共爲末。每服二錢用薄荷七分鹽梅一個煎水臨睡調服。雖二十年頭

風亦效。或用生南星。生烏頭等分爲末。葱汁調貼太陽穴亦可。

又方 硫黃一錢

取紅色者去子爲末三分

右二味拌勻鎔成小餅。左疼塞左鼻清涕從右鼻出。右疼塞右

鼻正疼左右俱塞。清涕流盡卽愈。神驗。又方 葱撥末三錢入猪膽內候乾取出

再用

真川芎

白芷

藁本

真青黛

元胡索各二錢

右爲末。水和爲丸。如

蓮子大。令病人仰睡。用一丸水化灌入鼻中。覺藥味至喉微有酸氣。令病人坐起。口

咬銅錢一個。口內有涎出盈盈。卽愈。或加皂角末一錢亦可。又方 白芷二兩五錢

真川芎 甘草 川烏頭半生熟明天麻各一兩 右共爲末。每服一錢。食後服細茶

薄荷湯下。一服卽愈。效驗甚速。又方 白芷三錢 天麻 防風各一錢 荆芥一

錢五分 右共研末煎服 又方 白芷酒洗 右一味爲末。蜜丸彈子大。清茶或

荆芥湯化下。名都梁丸。食後服。忌食各魚。又方 明天麻 白芷 右等共爲末。蜜丸重二錢。每服一丸。先將荆芥一錢細辛三分煎湯細嚼。甚者不過一丸。食後服。

忌食各色魚。感冒風寒頭痛。可服上第一方。

雷頭風痛 頭痛而起核塊。或頭中如雷鳴者是也。處方 川芎 白芷 防風
羌活 甘菊 薄荷 甘草 天麻等治之。不效用後方。又方 天麻 升麻
各一錢 右以新荷葉一大張煎服。

熱瘻頭痛 瓜萎一個 牛蒡四兩焙 右共爲末。每用三錢食後酒沖服。忌食動風
發熱之物。

頭風目痛 處方 製香附二兩 蕺香 甘草各二錢 右共爲末。每用二錢滾鹽湯下。
終年頭似痛而非痛。此腎水不足火邪冲上作痛。用熟地 玉竹各二兩 山茱萸

四錢真山藥 元參 川芎 當歸各三錢 五味 麥冬各二錢 右水煎服。後頭痛更甚。至重二劑斷根。屢試如神。藥味不可加減。

腦後作痛 此風入腎經也。 處方 熟地五錢真山藥 炒雲苓 當歸各三錢 炒芍二錢川芎 陳皮 炙草各一錢 天麻一錢五分 麻黃三分 右水煎服。

頭腦暈眩 暈眩雖然小症。然而大病皆起於暈眩。眼目一時昏花。卒致猝倒不救。宜早治之。 處方 台黨 半夏各三錢 白朮 當歸 熟地 白芍各一兩 川芎

茱肉各五錢 天麻一錢 陳皮五分 右水煎服數劑見效。此方名防眩湯。專治氣血之虛。不治頭目之暈。多服數劑。受益無窮。 又方 白朮二個去殼生搗爛。沖滾水。空心服。至重五服即安。老年更效。

婦人血風頭暈欲死。倒地不知人事。 處方 生蒼耳草嫩心陰乾爲末。每用一錢酒調服。神驗。

二 面部

痄腮。俗名擰耳風。兩腮赤腫。處方。皂角二兩。生南星二錢。糯米一合。右共爲末。薑汁調敷立效。

三 耳部

兩耳聾閉。處方。活鯉魚一尾。將腦髓取出。飯上蒸出油。滴入耳內。自然竅開。再用破故紙。

一兩先用淘米水泡一夜曬乾。再用黃柏二錢煎水泡一夜曬乾。食鹽二錢加水泡一夜曬乾。

黑芝麻一斤燒酒二斤童便一斤。

右共煮乾。取出曬極乾。炒香。取故紙研末。不用芝麻。以陳米醋爲丸。菉豆大。每服二錢。用杜仲炒去絲。知母各一錢。煎湯送下。甚效。

又方。北細辛末一錢。

右將黃蠟溶化爲丸。如鼠糞大。以棉裹塞耳一二次。卽愈。切戒惱怒。

腎虛耳聾。聲響如風水鳴。如鐘磬聲。處方。真川椒用巴豆菖蒲同研細。以松香黃蠟爲丸。塞耳。一日一換。初起者數日卽通神效。

又方。黃柏用人乳泡透。炒枯研細末。以黃酒打麪糊丸。桐子大。每服七八十九丸。開水下。

又方。真磁石。蠶豆大。穿

山甲燒研二分。用綿包裹塞耳。口含生鐵一塊。耳中如風雨聲。卽愈。

耳閉作痛 處方 大田螺 一個撥開蓋。入麝香 五分自化成水滴入。又方 每日平明以大指食指捏住鼻孔勿令泄氣。咬牙努目口脣閉緊使氣俱入耳竅悶極放手時時行之久則自效。

少壯病後耳閉 處方 南棗半斤桂圓四兩葱半斤後下 右煮服三五次自通。忌鹽數日。

四 鼻部

鼻血不止 處方 艾柏飲 艾葉 柏子仁去淨油 山萸肉 丹皮各一錢半大生地

三錢 白蓮肉去心真山藥各二錢 澤瀉一錢 生荷葉者一張乾不效 右水煎服不過二三

服永不再發屢試如神萬無一失。又方 四生丸 生地葉無則用生地搗汁亦可 生艾

葉 生荷葉乾者不效生扁柏葉各等分 右共搗爲丸每服三錢立愈。

鼻淵 鼻中時流黃色濁涕卽是也 處方 鮮鵝不食草一名地胡椒 右一味塞鼻立

效。

五 舌部

舌出血 處方 六味地黃丸加槐花三錢煎服立愈。又方 茅草根 生車前子亂髮。右各爲末吹擦立止。

重舌 處方 黃連 山梔 荆芥 黃芩 連翹 木通 薄荷 牛蒡各一錢 甘草 五分 右燈心一小團水煎服。小兒減半服。

六 腋部

腋下狐臭 處方 蜜陀僧 潮腦各四兩 枯白礬二兩 輕粉三錢 右共爲細末。頻擦兩腋。擦至半月見效。不可間斷。半年全愈。

七 乳部

男子乳忽壅腫如婦人乳 處方 金銀花 蒲公英各一錢 花粉 白芥子各五錢 製附子 木通各一錢 柴胡二錢 白芍 通草 梔子 茯苓各三錢 右水煎服。婦人乳汁不通 處方 貝母 知母 牡蠣粉 右各等分爲末。用猪蹄湯調服二

錢卽通。

無子食乳腫痛難消。處方 麥芽一兩炒 川芎一錢當歸
生地二錢 右煎服卽愈。

八 胸部

胸膈閉結不通。處方 生蚯蚓四條。洗淨研如泥。入生薑汁。薄荷汁。各一茶匙。蜂蜜半酒杯。井水調服。若熱甚者。加眞梅花冰片一二分服。再採心下片時汗出而愈。神效。

胸滿腹脹。處方 蒼朮二斤。淘米水泡一晝夜。燒存性。 甜酒麴四兩。燒存性。 皂礬入瓶內。醋泡曬乾。 右加平胃散。共爲末。醋爲丸。如梧子大。每服三四十丸。酒下。米湯亦可。日服兩次。神效。

九 心部

心氣怔忡。處方 龍眼核一斤。右剝去外層黑皮。長流水煮極爛。加大黑棗一斤。去核搗爛如泥爲丸。每晨淡鹽湯下三錢卽愈。

心下堅大如椀。邊如旋盤。此乃氣分因飲水所結也。

處方。白朮四錢 枳實二錢。

右水煎服。

十 肺部

肺癰 處方 犀黃丸 右服至一料全愈。又方

元參半斤 天冬四兩 桔梗二兩

炙草一兩 水十碗 煎至二碗。另加 蒲公英 金銀花各五錢 再煎 煎至一碗。食後

卽服。初起卽消。日久卽愈。極效無比。又方

生芪炒白芨 銀花 桔梗各一錢

苡仁五錢 貝母一錢六分 陳皮甘草節各一錢

甜葶藶 炒八分 生薑一片 右水二鍾

煎半食後徐徐服。初起者去黃芪。加防風一錢。久不愈者。加槿樹皮一錢。未成卽消。

已成卽潰。已潰卽愈。其效如神。

葷莖湯

老葷莖即蘆根，再老者去節一兩 茄仁三錢 絲瓜瓣

即絲瓜子三錢 杵碎單桃仁

去皮尖一錢

右水二

碗煎一碗服。早晚各服一劑。甚效。

十一 各種氣痛

心胃氣痛

處方

真沈香

木香

公丁香

乳香

沒藥

靈脂

前胡

以上各一錢

真麝香一分

右共研爲末。收入磁瓶。以蠟封口。不可洩氣。每服七分。開水下。

心胃蟲疾作病

處方

真川椒

真烏梅

右生薑煎湯服卽愈。

酒食凝滯。攻衝作痛。

俗稱穿心箭痛。

處方

川練子

去核酒炒錢半

元胡索

五靈脂

桃仁去皮尖研蒲黃各一錢

右水煎服。

胃脘隱痛

胃脘一點隱痛。多年不愈。用快氣溫胃殺蟲諸治不效者。

乃肝鬱不伸。胃土受尅。久易延爲噎膈之症。

處方

整荷葉

一張燒灰存性

生香附米一兩研

九香蟲一枚

製研水胡索三錢酒炒研。右用大棗去核皮薑一兩煮搗入上藥爲丸。日服一錢。開水送下。

十二 咳嗽

咳嗽痰喘

處方

真蚌殼粉

長者爲蚌。圓者爲蛤。須自取蚌殼研粉。若用蛤粉則不效。新瓦炒紅入真青黛少許。

用淡醃菜水滴麻油數點調服二錢神效。

又方

用多年陳白蜆殼。又名蛤

燒過

存性研極細末。米湯服一錢。一日三服。神效。

又方

皂角三片。

肥皂更好。蟲者忌用。

去皮

子弦。一片入麻油炒過巴豆十粒。

一片入薑汁。

製過杏仁。

去皮尖十粒。

一片入蜜製過小半夏十粒。

俱用火炙黃色。

右共研末。

每用五釐安手心。

臨臥以薑湯送服。神效之至。又方 雪梨四兩生薑一兩。共搗汁去渣。加蜜四兩。右共煎數沸。入瓷器內封固。不拘時服。一劑卽愈。無病亦可服。最能滋陰降火。忌食蘿蔔。

又 方 蘭汁 梨汁 白菓汁各二兩。右入銅鍋內熬成膏。隨意服之。

又方 元

參生甘草 麥冬各一兩 金銀花八兩當歸二兩 右水煎服。神效。

或加白芍三錢亦可兼治

肺癰。

咳嗽氣喘 處方 生山藥半碗搗爛甘蔗汁半碗。右和勻。燉微熱服立止。

咳嗽氣喘遇寒卽發 處方 乾薑泡皂角

泡去皮子弦、蟲蛀者忌用。肉桂紫色者去皮。

右各等分。共

搗篩白蜜和勻。杵三千下爲丸。如梧子大。每服三丸。開水下。嗽發卽服。日服數次。忌

葱麵油膩。其效如神。

諸般咳嗽 桔梗 炒荆芥 炒紫苑 飯上蒸一
次再炒 百部 飯上蒸一
次再炒 白前 飯上蒸一
次再炒 以上各八兩 右
共磨細末。每服三錢。臨時開水調服。如初感風寒者。生薑湯調下。又方 款冬花
川貝母 知母各一錢。右煎數滾。用冰糖向燈火上溶化。滴入藥內。服之屢試神
效。並治咽喉發乾。

咳嗽痰血 處方 真青黛 括囊仁 去油海石 炒黑山梔 炒黑
訶子肉等分。右蜜
爲丸。噙化。嗽甚加杏仁。又方 款冬花 百合 蒸焙 右等分爲末。蜜丸。龍眼大。
每臥嚼一丸。薑湯下。又方 大柿餅一個去子 入真青黛一錢。綿紮緊。飯上蒸熟。
臨睡時食。薄荷湯下。極效。

獨聖散 治多年咳嗽。肺痿咯血紅痰。白芨三兩。右一味爲末。每服二錢。臨臥
米湯下。

寒咳 處方 核桃連皮搗爛。加冰糖少許。開水沖。蒸服數次。極效。或照後蘇兜飲。麻

黃丸。均妙。

熱咳 處方 叭嗒杏仁一兩雙仁者不用 泡去皮尖用新鑄鉢新研搗。將杏仁搗爛如

泥分爲三服。每服內加冰糖三錢右共入蓋碗用滾水沖入蓋片刻俟溫連仁末服下早晚各一次數服而愈。秋燥熱咳更妙。若用苦杏仁煎服則不效。

年久咳嗽 處方 扁柏葉陰乾加紅棗七枚煎濃湯代茶時時飲之忌食葷腥煎炒。

另用百合四兩冰糖四錢早晚蒸服不可間斷輕則十日可愈重則半月自痊。又

方 蘇兜飲 紫蘇兜七個右煎濃汁早晚沖雞蛋服雖數十年咳嗽無不神效。

又方 麻黃一錢右熬濃汁一碗去渣加冰糖二兩熬至滴水成珠爲丸如蓮子

大每服二三丸日服數次服完卽愈。咳嗽嗆逆不能落枕者更效。又方 治咳嗽

嗆逆 淨麻黃 紅棗皮 南薄荷各五分上邊桂 紫蘇葉 桑白皮 杏仁去

皮尖大腹皮各四分炙草六分右水煎服放膽用之百發百中。又方 生地

沙參各二兩川貝母去心牡丹皮各一兩五錢元參 黃芩 桔梗 知母 百合

百部 款冬花 天門冬去心廣皮 枳殼各一兩甘草八分右用水煎汁去渣。