

R289.342

3

千金翼方卷第二十一

萬病

總療萬病第一

論曰後生志學者少但知愛富不知愛學臨事之日方知學
爲可貴自恨孤陋寡聞所以愍其如此忘寢與食討幽探微
緝綴成部以貽未悟有能善斯一卷足爲大醫凡膈上冷少
腹滿腸鳴膀胱有氣冷利者當加利藥服訖當利出泔澀青
黃水青泥輕者一兩度加利藥去病即止重者五六度加利
藥得日三頻大利方得盡其根源病乃永愈其利法至巳時
以來兩行三行即定亦自如舊終不成利病也凡病在上膈
久冷淡癰積聚疝瘕癥結宿食堅塊欬逆上氣等固病終日
吐唾逆氣上衝脊脅及咽喉者此皆胃口積冷所致當吐盡
乃差輕者一二度重者五六度方愈其吐狀初唾冷沫酸水

次黃汁重者出赤紫汁若先患注人當出黑血下吐藥大吐
吐時令人大悶須臾自定不令之虛斃得冷飲食已耳不虛
聾手足不痺亦有人當吐時咽中有一塊物塞喉不能得出
者飲一二合藥酒須臾即吐出一物如拳許大似段雞子中
黃重者十塊輕者五六枚

右件等疾狀病之根本若今日不出此根本之疾雖得名
醫與一二劑湯藥押定於後食觸其病還發善醫者當服
此藥一出根本即終身無疾矣

吐利出疾法

凡長病人

虛羸人

老人

貴人

此等之當少服積日不已病當內消也不須加吐利藥

凡加吐利藥傷多吐利若不止者水服大豆屑方寸匕即定
卒無豆屑嚼藍葉及烏豆葉亦得定丈夫五勞七傷陽氣衰

損羸瘦骨立者服之即差旬月之間肌膚充悅腦滿精溢仍加補藥加法在後章中

療風方用藥多少法

歷節風貳拾兩酒伍斗

賊風貳拾兩酒叁斗

大風用藥同歷節

偏風猥退

攤緩風拾貳兩酒叁斗

右以上風皆帶熱須加冷藥仍須利藥得利佳也

賊風掣縱捌兩酒貳斗

濕風周痺捌兩酒貳斗

脚腰攣痛拾貳兩酒叁斗

筋節拘急捌兩酒貳斗

食熱如針刺捌兩酒貳斗

熱病後汗不出初覺叁服壹服一盛年久服壹升

口喎面戾一目不合肆兩酒拾貳兩酒叁斗

起即頭旋肆兩酒壹斗

頭面風似蟲行捌兩酒貳斗

心悶欲嘔吐項強欲陰雨即發者捌兩酒貳斗

因瘡得風口噤脊背反張如角弓伍服壹服壹盛

因瘡得風口噤脊背反張如角弓伍服壹服壹盛

療冷病方

積冷淡瘕

瘦者肆兩酒壹斗強

淡飲疝瘕

六兩酒壹斗半

宿食吐逆

肆兩酒壹斗

癥瘕腸鳴噫

貳兩酒壹斗

癰痔瘕塊欬嗽上氣

貳兩酒壹斗

奔豚冷氣

六兩酒壹斗半

噎噦嘔痢

陸兩酒壹斗半

又疰

貳兩酒壹斗

卒中惡忤心腹脹滿氣急垂死

參服壹服壹蓋

當大吐吐血

瘴氣

參服

蠱毒

五服

溫瘧

五服

瘖瘧

五服

冷痢

六兩酒壹斗半

久勞

捌兩酒壹斗

療婦人方

其風冷等準前

帶下

拾貳兩酒壹斗半

崩中

六兩酒壹斗半

月水不通

六兩酒壹斗半

冷病絕產

六兩酒壹斗半

斷緒

捌兩酒壹斗

產後諸疾

八兩酒壹斗

月水不調

月前後乍多乍少

四兩酒壹斗

落身後病

六兩酒壹斗半

重者子宮下垂

拾貳兩酒壹斗

大排風散

主一切風冷等萬病方

芫花

狼毒

藥刺

天雄去皮

五加皮

麻花

白芷

紫苑

烏頭

去皮

附子去皮

莽草

茵芋

枯樓

荊芥

躑躅

莨花

大戟

王不留行

赤車使者

麻黃

各貳拾分

石斛

半夏

石南

署預

長生

各拾分

藜蘆

各分

狗脊

人參

牛膝

從蓉

蛇床子

莧絲子

萆薢

車前子

秦艽

各柒分

薏苡

五味子

獨活

藁本

柴胡

牡丹

柏子人

芎藭

芍藥

吳茱萸

桔梗

杜仲

桂心

橘皮

續斷

茯苓

細辛

乾薑

厚朴

茯神

山茱萸

防已

黃耆

蜀椒

巴戟天

高良薑

紫葳

黃芩

當歸

昌蒲

乾地黃

通草

各肆分

右六十七味勿熬鍊直置振去塵土即擣麤篩下藥三兩
忝米三升麴末二升上酒壹斗伍升淨泔米以水伍升煮
米極熟停如人肌下麴末熟搗次下散搗如前次下酒攪
之百遍貯不津器中以布片蓋之一宿旦以一淨杖子攪
三十匝空腹五更溫一盞服之以四肢頭面習習為度勿
輒加減非理造次必大吐利欲服散者以絹篩下之一服
方寸匕只一服勿再也水飲漿酒皆得服之丸服者蜜和
服如梧子七丸惟不得湯服也須補者藥少服令內消即
是補也

千金方有白木食茱萸無麻花半夏赤車使者高
良薑紫葳止六十四味名芫花散一名登仙酒又
名三建散按後加減法中有遠志而此方中無疑此脫遠志也

○凡服此藥法先多服令人大吐下利三五度後乃少服

方可得益也其加增藥法如左

麻花

烏頭

王不留行

赤車使者

麻黃

躑躅

茵芋

芫花

五加皮

白芷

莽草

附子

桔樓

荆芥

天雄

芎藭

藁本

署預

巴戟天

細辛

獨活

當歸

黃耆

乾薑

厚朴

防已

山茱萸

大戟

萆薢

桔梗

牡丹

柏子人

狗脊

薏苡

秦艽

菖蒲

右三十六味並主風多者患之者準冷熱加減之

薤白

芎藭

續斷

蛇床子

王不留行

桔梗

芫花

天雄

附子

躑躅

茵芋

當歸

秦艽

芎藭

乾薑

狗脊

草薺

石南

蜀椒

乾地黄

菖蒲

署預

石斛

牛膝

細辛

柴胡

車前子

桂心

柏子仁

五加皮

杜仲

薏苡

右三十二味主濕痺腰脊患之者準冷熱加減之

秦艽

藁本

狗脊

草薺

通草

石南

芎藭

續斷

牛膝

乾地黄

石斛

薏苡

菟絲子

杜仲

天雄去皮

附子去皮

右十六味主攣急躄曳患之者準冷熱加減之

莽草

防己

藜蘆

右三味主身痒疥瘙患之者準冷熱加減之

紫苑

牡丹

茯苓

茯神

柏子仁

薏花

人參

遠志

細辛

右五味主驚癇患之者準冷熱加減之

蜀椒

長生

躑躅

右參味主鬼魅患之者準冷熱加減之

紫菀

芫花

藜蘆

右參味主蠱毒患之者準冷熱加減之

高良薑

桔梗

芫花

山茱萸

茯苓

人參

柴胡

牡丹

薏花

薤白

巴戟天

芍藥

乾薑

附子

烏頭

去皮

麻黃

莽草

右壹拾柒味主痼冷積聚腹痛堅實患之者準冷熱加減之

厚朴

橘皮

桔梗

大戟

藜蘆

半夏

乾薑

藁本

人參

吳茱萸

右壹拾味主腹痛脹滿吐逆患之者準冷熱加減之

茯苓

厚朴

芫花

半夏

細辛

烏頭

黃芩

柴胡

山茱萸

右玖味主淡實患之者準冷熱加減之

厚朴

乾薑

紫苑

茯苓

桔梗

薏花

烏頭

人參

細辛

柴胡

右壹拾味主背滿痛患之者準冷熱加減之

紫苑

署預

石斛

細辛

巴戟天

牡丹

當歸

人參

菖蒲

五味子

桔梗

柏子人

吳茱萸

山茱萸

乾地黃

右壹拾伍味主補五藏虛損患之者準冷熱加減之

柏子

續斷

黃耆

署預

芍藥

巴戟天

五味子

右七味主益氣患之者準冷熱加減之

肉蓯蓉

蛇床子

五味子

附子

天雄

萆薢

枯樓

署預

遠志

巴戟天

菟絲子

牛膝

柴胡

車前子

細辛

茯苓

杜仲

五加皮

石斛

右壹拾玖味主益精髓患之者準冷熱加減之

乾地黄

菟絲子

天雄

附子

右肆味主補骨髓患之者準冷熱加減之

當歸

藁本

白芷

乾地黄

五加皮

石斛

菟絲子

署預

五味子

厚朴

右壹拾味主長肌肉患之者準冷熱加減之

五加皮

杜仲

續斷

右叁味主陰下濕痒患之者準冷熱加減之

茯苓

人參

桔樓

右參味主消渴患之者準冷熱加減之

桔樓

茯苓

芍藥

橘皮

秦艽

山茱萸

車前子

右柒味主利小便患之者準冷熱加減之

菖蒲

桔樓

山茱萸

右參味止小便利患之者準冷熱加減之

人參

細辛

菟絲子

狗脊

右肆味主明目患之者準冷熱加減之

芎藭

白芷

右貳味主止淚患之者準冷熱加減之

細辛

益肝

遠志

人參

補心氣

右參味補益氣患之者準冷熱加減之

石南

萆薢

狗脊

車前子

石斛

右伍味補養腎氣患之者準冷熱加減之

蜀椒

當歸

麻黃

桂心

吳茱萸

紫苑

芫花

藜蘆

附子

半夏

烏頭

菖蒲

遠志

細辛

芫花

五味子

右壹拾陸味主欬嗽上氣患之者準冷熱加減之

蛇床子

石斛

細辛

署預

橘皮

右伍味主下氣患之者準冷熱加減之

附子

乾薑

人參

桂心

橘皮

厚朴

右陸味主霍亂患之者準冷熱加減之

黃耆

通草

主漏

厚朴

山茱萸

莽草

主三蟲

紫苑

當歸

白芷

主崩中帶下

黃芩

蛇床子

主寒熱漏

芎藭

牛膝

栝樓

紫葳

右壹拾肆味主月閉患之者準冷熱加減之

麻黃

栝樓

柴胡

桂心

芍藥

主傷寒

通草

菖蒲

遠志

人參

主健忘

附子

黃芩

乾薑

蜀椒

主下

紫苑

伏苓

芎藭

右壹拾陸味主唾稠如膠患之者準冷熱加減之

論曰所加之藥非但此方所須普通諸方學者詳而用之

阿伽陀圓主萬病第二

阿加陀藥主諸種病及將息服法又服益人神色無諸病方

紫檀

小檗

茜根

鬱金

胡椒

略伍

右伍味擣篩爲末水和內臼中更擣一萬杵圓如小麥大

陰乾用時以水磨而用之

諸咽喉口中熱瘡者以水煮升麻取汁半合研壹圓如梧子大日服之貳服止禁酒肉五辛宜冷將息

諸下部及隱處有腫以水煮牛膝乾薑等取汁半合研壹圓如梧子大日服之四服止禁酒肉五辛生冷醋滑

諸面腫心悶因風起者以水煮防風取汁半合研壹圓如梧子日服之貳服止不須隔日禁酒五辛醋肉

諸四體酸疼或寒或熱以水煮麻黃取汁半合研壹圓如梧子日服止禁酒肉及麪五辛

諸蠱下部有瘡吞壹圓如梧子大又煮艾槐白皮取汁半合研壹圓灌下部二度禁酒肉

諸卒死服者多活看其人手脚頭面腹腫觀顏色無定若有此色而加荊者並不堪治以冷水弱半合研貳圓如小豆灌

口一服不差更與一服若損惟得食白粥鹽齏禁酒肉五辛
諸被魘禱當心常帶壹圓又以水一酸棗許研壹圓如小豆
服之參服止無所禁忌

諸被蛇及惡獸等毒若未被其毒直須辟除隨身帶行使即
遠離入草已被毒者以麝香壹相思子大又以水壹酸棗許
共藥壹圓如小豆於水內研服并以紫檀以水研取汁用研
藥塗其瘡毒處禁酒肉五辛

諸被一切鬼神及龍毒氣者其人飢渴寒熱時來時去不知
痛處或恍惚龍毒者其人昏昏似醉膚體斑駁或青取藥壹
圓如梧子以水酸棗許共藥研灌鼻及服貳服止無所禁
諸被鬼繞亂失心癲狂莫問年月遠近以艾汁壹酸棗許研
藥貳圓如小豆服之若無青艾取乾艾水浸搗取汁用亦得
肆服止并帶壹圓常可隨身口味無所禁忌