

本草从新

此書為醫宗大旨藥品要津集大成者具良工苦心早已不脛而走允宜家置一編以便披閱雖小道烏可廢耶比來惜無善本一時以爭覩為快茲本坊重為校刊以期廣傳今喜梨棗告成不揣謭陋爰識緣起於右 辛巳五月恆德主人謹誌

余先世藏書最夥凡有益於民用者購之尤亟以故岐黃家言亦多海內希見之本余自髫年習制舉業時卽旁覽及焉遇有會意輒覺神情開滌於是盡發所藏而精繹之迄今四十年矣夫醫學之要莫先於明理其次則在辨證其次則在用藥理不明證於何辨證不辨藥於何用故拙著醫學十種其一曰一源必徹其二曰四診須詳於經義病情必斟酌羣言而期於至當也而又念天之生藥凡以濟斯人之疾苦者也有一病必有一藥病千變藥亦千變能精悉其氣味則千百藥中任舉一二種用之且通神不然則歧多而用眩凡藥皆可傷人況於性最偏

駁者乎自來註本草者古經以下代有增訂而李氏綱目爲集大成其徵據該洽良足補爾雅詩疏之缺而以備醫學之用或病其稍繁踵之者有繆氏之經疏不特著藥性之功能且兼言其過劣其中多所發明而西昌喻嘉言頗有異議最後新安汪氏祖述二書著備要一編卷帙不繁而採輯甚廣宜其爲近今贍炙之書也獨惜其本非岐黃家不臨證而專信前人雜採諸說無所折衷未免有承誤之失余不揣固陋取其書重訂之因仍者半增改者半旁掇舊文叅以涉厯以擴未盡之旨書成名曰本草從新付之剞劂庶幾切於時用而堪羽翼古人矣乎其

乾隆丁丑歲二月廿日濱水吳儀洛遵程書於破川之利濟

堂

藥性總義

凡酸屬木八肝苦屬火八心甘屬土八脾辛屬金八肺鹹屬水入腎此五味之義也

凡青屬木八肝赤屬火八心黃屬土八脾白屬金八肺黑屬水八腎此五色之義也

凡酸者能濇能收苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能橫行鹹者能下能軟音軟堅淡者能利竅能滲泄此五味之用也

凡寒熱溫涼氣也酸苦甘辛鹹淡味也氣爲陽味爲陰氣無形而升故

爲陽味有質氣厚者爲純陽薄爲陽中之陰味厚者爲純陰薄而降故爲陰

爲陰中之陽氣薄則發泄厚則發熱

陽氣上行故氣薄者能泄

厚則泄薄則通

陰味下行故味厚者能泄於下薄者能通利

辛甘發散爲陽酸苦涌

涌泄爲陰

辛散甘緩故發肌表酸收苦泄故爲吐瀉

鹹味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽

輕清升浮爲陽重濁沉降爲陰清陽出上竅

本乎天者親上上竅七謂耳目口鼻

濁陰出下竅

本乎地者親下下竅二謂前後二陰

清陽發腠理

腠理肌表也陽升散於皮膚故清陽

發濁陰走五臟

陰受氣於五臟陰陰受氣於五臟故濁陰走之

清陽實四肢

四肢爲諸陽之濁本故清陽實之

陰歸六腑

六腑傳化水穀

此陰陽之義也

凡輕虛者浮而升重實者沉而降味薄者升而生

象氣薄者降脊氣薄者降

而重厚者沉而長象未厚者沉而藏

象未平者化而成象

象未平者化而成象

氣厚味薄者浮而升味厚氣薄者沉而降氣味但厚者能浮能

沉氣味俱薄者可升可降酸鹹無升辛甘無降寒無浮熱無沉

此升降浮沉之義也

李時珍曰升者引之以鹹寒則沉而直達下焦沉者引之以酒則浮而上至顛頂一

物之中有根升梢降生升熟降者是升降在物亦在人也○凡根之在土中者半身以上則上升半身以下則下降雖一藥而

根梢各別用之

或差服亦罔效

凡質之輕者上入心肺重者下入肝腎中空者發表內實者攻
裏爲核者達四肢爲皮者達皮膚爲心爲幹者內行臟腑枯燥
者入氣分潤澤者入血分此上下內外各以其類相從也

凡色青味酸氣躁

躁爲木性屬水氣所化

性屬木者皆入足厥陰肝足少陽膽

經

肝與膽相表裏膽

氣所化

色赤味苦氣焦

焦爲火性屬火氣所化

性屬火者皆入手

少陰心手太陽小腸經

心與小腸相表裏小腸爲丙火心爲丁火

香

土氣性屬土者皆入足太陰脾足陽明胃經

脾與胃相表裏胃爲戊土脾爲己土

香

色白味辛氣腥

腥爲金氣所化

性屬金者皆入手太陰肺手陽明大腸

肺與大腸相表裏大腸爲庚金肺爲辛金

色黑色味鹹氣腐

腐爲水氣所化

性屬水者皆入

足少陰腎足太陽膀胱經

腎與膀胱相表裏膀胱爲壬水腎爲癸水凡一臟配一腑皆屬陽故爲

年丙戌庚壬臟皆屬陰故爲乙丁己辛癸也

十二經中惟手厥陰心包絡手少陽三

焦經無所主其經通於足厥陰少陽厥陰主血諸藥入厥陰血

分者併入心包絡少陽主氣諸藥入膽經氣分者併入三焦

命門相火散行於膽三焦心包絡故入命門者併入三焦此諸藥

則瀉其子又曰子能令母實加腎爲肝母心爲肝子故八肝者併八腎與心肝爲心母脾爲心子故八心者併八肝與肺心爲脾母肺爲脾子故八脾者併人心與肺脾爲肺母腎爲肺子故八肺者併八脾與腎肺爲腎母肝爲腎子故八腎者併八肺與肝此五行相生子母相應之義也

凡藥各有形性氣質其八諸經有因形相類者如蓮翹似心而
入心蕩枝核似醫之類凡而入有因性相從者如潤者走血分燥者入氣分本平天者親上本平地者親下之類如氣香入脾氣有因質相同者如頭人頭幹入身因氣相求者如氣香入脾氣有因質相同者如頭人頭幹入身如紅花蘇木汁似血而入血之類自然之理可以意得也

有相須者同類而不可離也
如黃蘖知母破故純胡桃之類
爲使者我之佐使也惡者奪我之能也畏者受彼之制也反者兩不可合也殺者制彼之毒也此異同之義也

肝苦急急食甘以緩之
肝爲將軍之官其志怒其氣急急則自傷反爲所苦故宜食甘以緩之則急者可平柔能制剛也
肝欲散急食辛以散之以辛補之以酸瀉之
木不宜以辛散之順其性者爲補逆其性者爲瀉肝喜散而惡收故辛爲補而酸爲瀉
心藏神其志喜喜則氣緩而心虛神散故宜食酸以收之心欲喫急食鹹以喫之用鹹補之以甘瀉之
心火太過則爲躁越故急宜食鹹以喫之蓋鹹從水化能相濟也心欲喫故以鹹喫爲補心苦緩故以甘緩爲脾苦溼急食苦以燥之
脾以運化水穀制水爲事溼勝脾
脾以運化水穀制水爲事溼勝脾脾貴充和溫厚其性欲緩急食甘以緩之則反傷脾土故宜食苦以燥之脾

苦爲瀉而甘爲補也 肺苦氣上逆急食苦以泄之節之令氣病

肺主氣行氣

則上逆於肺故急宜食苦以降泄之肺欲收急食酸以收之用酸補之以辛瀉之

肺應秋氣主收斂故宜食酸以收之肺腎苦燥急食辛以潤之

氣宜聚不宜散故酸收爲補辛散爲瀉腎

腎爲水藏藏精者也陰病者苦燥故宜食辛以潤之蓋辛從金化水之母也其

能開腠理致津液通氣也

腎主閉藏氣貴周密故腎欲堅宜食苦以開腠理致津液者以辛能通氣也水中有真氣惟辛能達之氣至水亦至故可以潤腎之燥

腎欲堅急食苦以堅之用苦補之以鹹瀉之

腎主閉藏氣貴周密故腎欲堅宜食苦以堅之也苦能堅故爲補鹹

能堅此五臟補瀉之義也

故爲瀉堅

酸傷筋

酸走筋過則陽筋而拘攣

辛勝酸

辛爲金味故勝木之酸

苦傷氣

苦從火化故傷肺氣火熱

金也又如陽氣性升苦味性降氣

爲苦過則不能舒伸故苦傷氣

鹹勝苦

鹹爲水味故勝火之苦○按氣爲苦傷而用鹹勝之此自五行相制之理若以辛助金而以甘泄苦亦是

捷法蓋氣味以辛甘爲陽酸苦鹹爲陰陰勝者制之以陽陽勝

則不能舒伸故苦傷氣

酸苦爲陽酸苦鹹爲陰陰勝者制之以陽陽勝

者制之以陰何非勝復之妙而
其中宜否則在乎用之權變爾

甘傷肉酸勝甘

酸爲木味故辛
勝土之甘

傷皮毛

辛能散氣苦勝辛
故傷皮毛苦爲火味故傷

勝金之辛

鹹從水化故傷
心血水勝火也

食鹹則渴
傷血可知

甘勝鹹

甘爲土味故
勝水之鹹

此五行相剋之義也

辛走氣氣病無多食辛

五味論曰多食之令人鹹
洞心透心若空也

鹹走血血病無

苦性沉降

多食鹹

味論曰多食之令人渴
洞心透心若空也

苦走骨骨病無多食苦

苦性沉降

骨重難舉矣

五味論曰多食之令人變
也

甘走肉肉病無多食

酸能收縮

甘能緩中善生脹滿

五味論曰多食之令人變
也

酸走筋筋病無多食酸

收縮

筋得酸則縮五味論曰多食

之令人痙攣小便不利也

此五病之所禁也

多食鹹則脈凝泣

澀

而變色

同色

水能剋火故病在心之脈與

多食

火能剋金故病在肺之皮

苦則皮槁而毛反

火能剋金故病在肺之皮

同

火能剋金故病在肺之皮

多食辛則筋急而

爪枯也五味篇曰肝病禁辛多食酸則筋脈勝而皮毛
厚也手足胼胝之謂木能克土故病在脾上能克水故病在腎之骨與髮也五味篇曰腎病禁甘此五味之所傷也

風淫於內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛散之風爲木氣
金能勝之故治以辛涼過於辛恐反傷其氣故佐以苦甘苦勝辛甘益氣也木性急故以甘緩之風邪勝故以辛散之熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之熱爲火氣水能勝之故治以鹹寒佐以甘苦甘勝所以防鹹之過也苦能泄所以去熱之實也熱盛於心而不解者以酸收之熱鬱於內而不解者以苦發之溼淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之溼爲土氣燥能除之故治以苦熱酸從木化制土者也故佐以酸淡以苦燥之者苦從火化也以淡泄之者淡能利竅也火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之相火畏火也故宜治以鹹冷苦能泄火辛能散

火故用以爲佐酸收苦
發義與上文熱淫同治燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下
之燥爲金氣火能勝之治以苦溫苦從火化也佐以甘辛木受
之金傷以甘緩之金之正味以辛瀉之也燥結不通則邪實於
內故當以苦下之寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之
以苦堅之寒爲木氣土能制木熱能勝寒故治以甘熱甘從土
化熱從火化也佐以苦辛等義如藏氣法時論曰腎
苦燥急食辛以潤之腎欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹瀉之也此六淫主治各有所宜也

凡藥須俟製焙畢然後秤用不得生秤溼潤藥皆先增分兩燥
乃秤之

凡酒製升提疆製溫散入鹽走腎而軟堅用醋注肝而收斂竚
便除劣性而降下米泔去燥性而和中乳潤枯生血蜜甘緩益

古東漢上醫曰氣以甫中則動擾而製即耗性勿傷上膈黑豆

甘草湯清血解毒致令平和羊脂塗燒傷瘡骨容易脫

酥豬脂塗燒傷瘡骨容易脫

去穰者免脹去心者除煩此製治各有所宜也

本草所謂黑豆
烏豆皆黑大豆

也蘇頌曰緊小者爲雄入藥尤佳宋奭曰小者力更佳皆謂黑
大豆中之較小者非世俗所稱馬料豆也世俗所謂馬料豆卽
稽豆也稽豆性溫熱味澹劣乃豆中最下之品以其野生價最
賤北方甚多故餵馬用之蓋凡豆皆可作馬料而莫有如此豆
之價廉也○今藥肆中煮何首烏不用黑大豆而用稽豆甚謬
竝有將煮過首烏之稽豆僞充淡豆豉尤屬可笑○市醫每有
以稽豆皮加入煎劑者不知黑大豆之皮有可用稽豆之
皮無可用也因時珍混註稽豆卽小黑豆以致後人多誤

用藥有宜陳久者

收藏高燥處又必時常開看不令黴蛀

有宜精新者如南星半

夏麻黃大黃木贼櫻榔芫花槐花荆芥枳實枳殼橘皮香蠶佛

手柑山茱萸吳茱萸燕窩蛤蚧沙糖壁土秋石金汁石灰米麥

酒醬醋茶薑芥艾墨蒸餅諸麴諸膠之類皆以陳久者爲佳或

取其烈性減或取其火氣脫也凡煎阿膠鹿膠等止宜微火令小沸不得過七日若日數多火傷陰也○煎膏子亦宜微火并不可久煎○陰虛有火之人一應藥餌食物最忌煎炒脩合丸子宜將藥切絕薄片子蒸爛熟擣爲丸若用火製焙不但不能治病反致發火傷陰舊疾必更作餘則俱宜精新若陳腐而欠鮮明則氣味不全服之必無效唐耿湧詩云朽藥誤新方正謂是矣此藥品有新陳之不同用之貴各得其宜也