

臺輶

徐靈胎全集

四

卷五湯方目

麥冬湯

桂枝加厚朴杏子湯

麻黃杏仁甘草

石膏湯

定喘湯

皺肺丸

清燥救肺湯

喘

雞矢醴丸

防已茯苓湯

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

桂枝去芍藥如麻黃細辛附子湯

枳朮湯

蒲灰散

已椒薑黃圓

牡蠣澤

瀉散

大腹水腫方

麻豆湯

十水丸

舟車神祐方

太聖濟川丸

木香散

葶藶

丸

療水病洪腫氣脹不消食方

療患氣兼水

身可腫垂死方

五香散

五皮散

治蠱脹

方

敷藥

沉香琥珀丸

調榮飲

烏鯉

魚湯

小胃丹

煨腎散

禹餘糧丸

以上臟
脹水腫

甘草乾薑湯

桂枝去芍藥加皂莢湯

韋莖湯

桔梗白散

以上
肺痿

血枯方

柏葉湯

瀉心湯

滋血潤腸湯

治吐血百治不瘥療十瘥神

驗不傳方

犀角地黄湯

犀角地黄湯

四

生丸

白芨枇杷丸

皮膚血汗方

汗血方

諸竅出血方

療舌上出血如孔鑽者

療

舌血不止

紫霜丸

療齒斷血出

療酒醉

牙齒漏血

雄黃麝香散

治牙縫出血

黃

連散

療滿口齒血出

治牙宣方

療鼻瀝

血三升氣欲絕方

茅花湯

地黃散

療淋

血方

療小便出血方

瞿麥散

神效方

髮灰散

玉屑散

鹿角膠丸

黃土湯

赤小豆當歸散

牛角鰓灰散

猪臟丸

又猪臟丸

以上諸血

茱萸湯

生薑瀉心湯

半夏瀉

心湯

黃芩加半夏生薑湯

猪苓散

大半

夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

生薑半夏湯

半夏乾薑散

葛根加半夏

湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

黃連湯

昆

布丸

關膈不通方

千金理諸噎方

又方

中風客熱噦方

嘔噦方

消穀丸

卒

噦

廣濟栴榔散

崔氏方

深師治噎方

反胃方

丁香柿蒂湯

治冷呃方

撞氣

阿魏丸

以上噎膈嘔吐

溫脾湯

訶梨勒丸

香茸丸

固腸丸

附子理中丸

以上泄瀉

蘭臺軌範卷五

吳江徐靈胎洄溪著

門人姜桂萼芳校

喘

素問

經脉別論夜行則喘出於腎淫氣病肺有所墮恐喘出於
肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘
出於腎與骨當是之時勇者氣行則已怯者則着而爲病
也陽明脉解篇陽明厥則喘而惋惋則惡人帝曰或喘
而死或喘而生者何也岐伯曰厥逆連臍則死連經則生

脉要精微論肝脉搏堅而長因血在脇下令人喘逆

逆調論腎者水臟主津液主卧與喘也

此句又爲喘之總訣

生氣通

天論因於暑汗煩則喘喝靜則多言

陰陽別論陰爭於

內陽擾於外魄汗未藏四逆而起起則熏肺使人喘鳴

水熱穴論水病者下爲肘腫大腹上爲喘呼不得卧者標本俱病故肺爲喘呼腎爲水腫肺爲逆不得卧

金匱

上氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加痢尤甚

喘方

麥冬湯

金匱

火逆上氣咽喉不利止逆下氣此主之

麥冬

七升

半夏

一升

人參

甘草

各二兩

粳米

三合

大

棗

十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一

服

此即竹葉石膏湯去竹葉石膏加大棗也專清肺胃之火若火逆甚仍用竹葉石膏為妙

桂枝加厚朴杏子湯

傷寒論

喘家主之

於桂枝湯方內加厚朴

二兩

杏仁

五十個去皮尖

餘依前法

麻黃杏仁甘草石膏湯

傷寒論

發汗後不可更行桂枝湯汗

出而喘無大熱者此湯主之

麻黃

四兩去節

杏仁

五十個去皮

甘草

二兩炙

石膏

半斤碎綿裹

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮

取二升去滓溫服一升

即越婢湯加杏仁去薑棗

定喘湯

振生方

治肺寒膈熱哮喘

麻黃

款冬花

半夏

桑皮

各三錢

蘼子

二錢

杏仁

一錢五分

白果

二十一枚碎炒

黃芩

甘草

各一錢

右以水煎徐徐服

皺肺丸

治喘

款冬花

知母

秦艽

百部

去心

紫苑

貝母

阿膠

糯米

炒各一兩

杏仁

另研四兩

右爲末將羊肺一具先以水灌洗看容得水多少卽更添些煮杏仁令沸濾過灌入肺中繫定以糯米泔煮就研爛成膏搜和前藥末杵數千下丸梧子大每服五十丸食前桑白皮煎湯下

清燥救肺湯

治臍鬱喘嘔

桑葉

三錢經霜者

石膏

二錢半炒

甘草

一錢

胡麻仁

一錢炒研

阿膠

八分

人參

七分

麥冬

一錢二分

杏仁

七分去皮

枇杷葉

一片去毛蜜炙

右九味以水

一碗煎六分頻頻二三次滾熱服

小青龍加石膏湯

越婢加半夏湯

俱見咳嗽

按此二方為喘病之主方其餘眾方意不能外此即有他法必有別因當隨症增減也

麻黃湯

見傷寒

資生腎氣丸

瀉白散

錢乙

黑錫丸

俱見通治

按黑錫丸鎮納元氣為治喘必備之藥當蓄在平時非一時所能驟合也

臃脹水腫

靈素

靈脹論黃帝問

曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在於臟

腑之外

四字總括明透

排臟腑而郭胸脇脹皮膚故命曰脹帝曰

未解其意岐伯

曰夫胸腹臟腑之郭也膻中者心主之官

城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送也胃之五竅者間里門戶也廉泉玉英者津液之道也故五臟六腑者各有畔界其病各有形狀營氣循脉衛氣逆爲脉脹衛氣並脉循分爲膚脹水脹篇黃帝問於岐伯曰水與膚脹臃脹腸覃石瘕石水何以別之岐伯答曰水始起也目窠上微腫如新卧起之狀其頸脉動時欬陰股間寒足脛痠腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也黃帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客於皮膚之間皤皤然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹

色不變此其候也。臌脹何如岐伯曰腹脹身皆大與膚
脹等也。色蒼黃腹筋起此其候也。腸覃何如岐伯曰寒氣
客於腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內著惡
氣乃起瘕肉內生其始生也大如雞卵稍以益大至其成
如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下
此其候也。石瘕何如岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客於子
門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉衄則留止日以益
大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下陰
陽別論云陰陽結邪多陰少陽曰石水少腹腫邪氣臌

腑病形篇督脉微大爲石水起臍已下至小腹睡睡然土

至胃腕死不治

水爲有形之物故按之即起膚脹爲無形之氣故按之不起腸覃乃腸外惡氣所結

故月事仍下石瘕乃胞中惡血所凝故月事不行各有定理也至石水則在少腹之中水結不散之症若臌脹則非氣非小臟腑皮肉俱望

腫邪盛正衰難爲治矣

素腹中論黃帝問曰有病心腹滿旦食則不著食此爲何

病岐伯對曰名爲臌脹帝曰治之奈何岐伯曰治之以雞

矢醴一劑知二劑已

水熱穴論黃帝問曰少陰何以主

腎腎何以主水岐伯對曰腎者至陰也至陰者盛水也肺

者太陰也少陰者冬脉也故其本在腎其末在肺皆聚水

也。腎者胃之關也。關門不利故聚水而從其類也。故凡水病下爲臑腫太腹上爲喘呼不得卧者標本俱病。氣厥論肺移寒於腎爲涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也。陰陽應象大論濁氣在土則生臃脹。

金匱

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脉目浮外證骨節疼痛惡風皮水其脉亦浮外證臑腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗正水其脉沉遲外

證自喘石水其脉自沉外證腹滿不喘黃汗其脉沉遲身
發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿脉浮而洪浮
則爲風洪則爲氣風氣相搏風強爲隱疹身體爲痒痒爲
泄風久爲痂癩氣強則爲水難以俛仰風氣相擊身體洪
腫汗出乃愈惡風則虛此爲風水不惡風者小便通利上
焦有寒其口多涎此爲黃汗寸口脉沉滑者中有水氣
面目腫大有熱名曰風水視人之目裹上微攢如蚕新卧
起狀其頸脉動時時咳按其手足上陷而不起者風水
太陽病脉浮而緊法當骨節疼痛反不疼身體反重而酸

其人。不渴。汗出。卽愈。此爲風水。惡寒者。此爲極虛。發汗得之。渴而不惡寒者。此爲皮水。身腫而冷。狀如周痺。胸中窒。不能食。反聚痛。暮躁不得眠。此爲黃汗。痛在骨節。欬而喘。不渴者。此爲肺脹。其狀如腫。發汗卽愈。然諸病此者。渴而下利。小便數者。皆不可發汗。裏水者。一身面目黃腫。其脉沉。小便不利。故令病水。假如小便自利。此亡津液。故令渴也。越婢加白朮湯主之。少陰脉緊而沉。緊則爲痛。沉則爲水。小便卽難。脉得諸沉。當責有水。身體腫重。水病脉出者死。夫水病人。目下有卧蚕。面目鮮澤。脉伏。其人消。