

東醫寶鑑雜病篇卷之七上

東醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君

臣許汝奉

教撰

亥癩

瘡病之源

內經曰夏傷於暑秋爲痲瘧○秋善病風瘧又所愧汗未

之源內經曰夏傷於暑秋爲痲瘧○夏暑汗不出者秋成風瘧○秋菴病風瘧又曰魄汗未
 盡形弱而氣燦穴腠以閉發爲風瘧○風成爲
 寒熱又曰因於露風乃生寒熱○風氣盛於皮
 膚之內內不得通外不得泄腠理閉則洒然寒閉
 則熱而悶名曰寒熱○夏傷於暑秋必病瘧蓋
 傷之淺者近而暴傷之重者遠而深瘧瘧者久瘧
 也是知夏傷於暑濕熱閉藏而不能發泄以外邪
 氣內行至秋而發爲瘧也○瘧之爲病以暑舍
 于榮衛之間得秋之風寒所傷而後發亦有非暑

因風寒感冒而得之者在于陽則發熱在于陰則發寒并則病作離則病止作止故有時在氣則發早在血則發晏淺則口作深則問目或在頭項或在背中或在腰脊雖上下遠近之不同在太陽則一也

一也

○大發風暑當發汗夏月多在風涼處歇遂閉其汗而不泄故也

○病氣如凌虐人之狀

又曰瘧有凌虐之狀在傷寒人則為壞證

在內傷人則為勞瘵然則豈美疾哉

瘧疾形證

瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒懷鼓

欲飲冷

○夫陰陽上下交爭虛實更作陰陽相

移也陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓

頤巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰

氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則

外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故欲冷飲

也

虛而陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出
之陽陽與陰復并於外則陰虛而陽實故先熱而
渴夫虐氣者并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝
則寒陽勝則熱經○衛虛則先寒榮虛則先熱表
邪多則寒多裏邪多則熱多表裏相半寒熱相等
則○人之榮衛晝行於陽夜行於陰○衛氣榮
衛行到病所不通乃作寒戰鼓振頭顙中外皆寒
腰脊俱痛此邪氣入於內也寒戰俱已內外皆熱
頭痛如破渴欲飲冷煩滿欲吐白汗此邪氣發於
外也○暑瘧單熱濕瘧多寒寒瘧先寒後熱風
瘧先熱後寒餘
皆先寒後熱

脉法

瘧脉自弦弦數多熱弦遲多寒弦小緊者宜下之
弦遲者可溫之弦緊者可發汗浮大者可吐之言
數者風發也以飲食消息止之○瘧脉自弦微
則為虛代散則死○瘧脉自弦弦遲多寒弦數

多熱隨時變遷。○瘧脉多弦但熱則弦而帶數
寒則弦而帶遲亦有病人而脉極虛微而無力似
手不弦然而必於虛數之中見弦但不搏手耳細
察可也。○弦短者傷食弦滑者多痰虛微無力
爲从瘧。○瘧脉
遲緩者病自愈。

寒熱先後

瘧理開發因遇夏氣淒涼之水寒藏於腠理

皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風
者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱
也病以時作名曰寒瘧。○先熱而後寒者由先
傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名
曰溫瘧。○其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨
發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘴瘧。瘴謂熱

也。

病有漸漸惡寒而復發熱者何也曰陰脈不足陽往從之陽脈不足陰往乘之何謂陽不

雜病篇

則惡寒近前陽明燥則發熱故為往來寒熱也疎
○甚者內外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起
則休作無
定時矣脂五

瘧發日數多少

夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃

皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行於陽夜行
於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是
以口作衄○衛氣與邪相并則病作與邪相離則
病休其并於陰則寒并於陽則熱離於陰則寒也
離於陽則熱已至次日又集而并合則復病也綱
○其間日發者由邪氣內薄於五臟橫連募原也
其道遠其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間
日乃作也綱○時有間二日或至數日發或渴或
不渴其作何也曰其間者邪氣與衛氣客於六腑
而有時相失不能相得故休數日乃作也瘧者陰

陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴○三月一發者受病一年間日一發者受病半年連日發者受病一月二日連發住一日者氣血俱受病也又曰三日一發陰經受病也最重○陽爲腑邪淺與榮衛並行一日一發○陰爲臟邪深橫連募原不能與正氣並行故間日蓄積乃發或三四日一發久則必爲癰母

癰發有晝夜早晏之異

帝曰其作日晏與日早者何氣使然岐伯曰邪氣客於風府循

脊而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此作日稍益晏也其出於風府日下一節二十五日下至軀骨二十六日入於脊內注於伏膂之脉其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益

早也。○陽爲晝發邪，淺榮衛晝行背與脊故也。○陰爲夜發邪，深榮衛夜行胸與腹故也。○陽爲子時至巳，陰爲午時至亥，如發寅卯而退於未申，或發於未申而退於子丑，皆謂之陰陽。今分須用藥，趨早或移時分定陰陽，然後陽瘧截住，陰瘧升散。○從卯至午發者，邪在外也；從午至酉發者，邪在內也；從酉至子發者，或至寅發者，知邪在血分也。○

六經瘧

夏傷於暑，秋必病瘧。初不知何經受病，隨其受而取之。有申三陽者，有申三陰者，大抵經中邪氣，其證各殊。在太陽經者，謂之寒瘧，治多汗之在陽明經者，謂之熱瘧，治多下之在少陽經者，謂之風瘧，治多和之。此三陽受命，皆爲暴瘧，發在夏至後處暑前。此乃傷之淺者，近而暴也。○在陰經者，則不分三陰，皆謂之溫瘧，其發在處暑後冬至前。此乃傷之重者，遠而深也。瘧者，老瘧也，故謂之

人虛。○傷寒餘熱未淨，重感於寒，而變瘧，各曰溫瘧。○傷風瘧，此為傷寒壞病，其證先熱後寒，臥

屬三陽，宜汗。宜吐，瘧屬三陰，宜汗。宜和，宜溫。

○太陽瘧，宜桂枝羌活湯。麻黃羌活湯。○陽明瘧，人參白虎湯。柴苓湯。○少陽瘧，宜柴

胡桂枝湯。柴胡加桂湯。○三陰瘧，宜白虎桂枝湯。麻黃白朮湯。或小柴胡合四物湯。各曰柴胡四

物湯。○太陽陽明合病，桂枝芍藥湯。桂枝石膏湯。三陽合病，宜桂枝

黃芩湯以和之。○桂枝羌活湯。治太陽瘧，自汗，頭項痛，腰脊強。桂枝羌

活防風甘草各一錢半，右剉作一貼水煎服。

麻黃羌活湯。治太陽瘧，無汗，即前方法。桂枝加麻黃也。劑去服法同上。

更... 監... 卷三... 雜病篇... 五

柴胡桂枝湯

治少陽瘧寒熱乍往乍來柴胡二錢桂枝黃芩人參芍藥半夏各一錢甘草五

分右剉一貼入薑

三棗二水煎服

柴胡加桂湯

治少陽瘧往來寒熱極驗柴胡三錢黃芩桂枝各二錢半夏一錢甘草四分右

剉作一貼入薑三

棗二水煎服

白虎桂枝湯

溫瘧者其脉如平身無寒但熱骨節煩疼時便難朝發暮解暮發朝解此藥主

之石膏四錢知母二錢桂枝甘草各一錢粳米一

合右剉作一貼水煎服

麻黃白朮湯

治風瘧麻黃桂枝皮青皮陳皮川芎白芷半夏翅紫蘼葉赤茯苓白朮梔子細辛

檳榔甘草各七分右剉作一

貼入薑三棗二水煎服

柴胡四物湯

治三陰經溫瘧或夜發者柴胡生乾地黃各二錢人參半夏黃芩甘草川芎當

歸赤芍藥各一錢右剉作

一貼入薑三棗二水煎服

桂枝芍藥湯

治瘧寒熱大作此太陽陽明合病也謂之大爭寒熱作則必戰動發熱則必汗

泄經曰汗出不愈知爲熱也不治則恐久而傳入

陰經宜用此桂枝一錢赤芍藥知母石膏黃芩各

二錢右剉作一

貼水煎服

桂枝石膏湯

治太陽陽明合病間曰瘧熱多寒少石膏知母各三錢黃芩二錢桂枝一錢右

剉作一貼水

煎服之

桂枝黃芩湯

服桂枝芍藥湯後寒熱轉甚者知太陽陽明少陽合病也宜用此和之柴胡二

錢石膏知母各一錢半黃芩人參半夏甘草各一錢二分桂枝一錢右剉作一貼水煎服

瘧晝發夜發宜分治益氣湯枋覲加半夏黃芩○血虛

夜發宜柴胡四物湯枋見桃仁承氣湯點覲麻寅黃芩湯柴胡芩歸湯

麻黃黃芩湯治夜發瘧麻黃三錢黃芩二錢甘草一錢半桂心一錢桃仁十五枚右剉作一

貼水煎臨臥服○桃仁味苦甘辛肝者血之海血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此麻黃黃芩湯乃發散血中風寒之劑也

柴胡芩歸湯治夜發陰瘧引出陽分而散後服人參截瘧飲止之柴胡乾葛川芎各一錢桔

梗當歸赤芍藥人參厚朴白朮茯苓陳皮各七分紅花甘草各三分右剉作一貼入薑三棗二梅一

水煎服

諸瘧證治

瘧者風瘧寒瘧熱瘧濕瘧痰瘧食瘧
勞瘧鬼瘧疫瘧瘴瘧瘵瘧老瘧諸

風瘧

自感風而得先熱後寒宜麻黃白朮湯
無汗則宜散邪湯有汗則宜正氣湯

寒瘧

自感寒而得寒多熱少宜人參養胃湯
飲果附湯草果飲柴胡桂薑湯一名牝瘧交解

熱瘧

因暑勝熱多得之一名痺瘧亦曰暑瘧
虎湯柴苓湯魁明柴胡知母湯爭功散及龍虎湯

嗽

濕瘧

因冒襲雨濕汗出澡浴得之寒熱相半小便
不利宜五苓散

痰瘧

因外感內傷鬱聚成痰頭痛肉跳吐食嘔沫甚則
昏迷卒倒宜柴陳湯加草菓或四獸飲冷附湯久

不止以露薑飲截之。○有人忽得瘧疾嘔吐異
常以二陳湯麩朮加人參縮砂倍用白豆蔻進一
二貼自然寒熱不作蓋白豆蔻能消能
磨流行三焦榮衛一轉寒熱自平也。

食瘧

一名胃瘧因飲食失節飢飽有傷所致寒已復熱
熱已復寒七熱交併若飢而不能食食則吐痰經
曰寒熱善飢而不能食食已肢滿腹脹病以日作
名曰胃瘧是也宜平陳湯加枳實白朮山梔子神
麩青皮或清脾飲小清脾湯又二陳
湯加青皮檳榔縮砂白豆蔻亦佳。

勞瘧

即久瘧也寒熱微上寒中有熱上中有寒最難調
治由表裏俱虛真元未復疾雖暫止小榮復來經
年不差宜芎歸鱉甲散常山飲五勞元六和湯烏
頭七棗湯露薑養胃湯十將軍丸一補一發丹辰
砂元養胃丹。○久瘧屬元氣虛寒蓋氣虛則寒
血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則

寒熱交作或吐涎不食或泄瀉腸痛手足逆冷寒戰如慄皆脾胃虛弱也但服補中益氣湯防覲諸證悉愈苦投清脾截瘧多致不起

鬼瘧

因感尸疰客忤寒熱日作夢寐不祥多生恐怖宜辟邪丹雄朱丹或燒人場土作丸塞男左女右鼻

中

疫瘧

一方長幼相似或染時行變成寒熱須聚運氣用藥宜不換金正氣散勦覲如意丹五瘟丹瘴疸丸

瘟方見
疫瘧

瘴瘧

挾山溪嵐瘴蒸毒之氣令人迷困發狂或啞乍寒乍熱乍有乍無南方多病此宜雙解飲子地龍飲

羌活蒼朮湯瘴疽

丸勦覲觀音丸端

瘧瘧

者老瘧也以其隔三日一發纏綿不去也○三

日一作者邪入於三陰經也作於子午卯酉日者少陰經瘧也作於寅申巳亥日者厥陰經瘧也作於辰戌丑未日者太陰經瘧也瘧得於暑當以汗解夫感冒與風皆外邪也故非汗多不解必先與參朮等補劑爲君加柴葛等發散藥漸而收汗得汗而虛又行補養下散屬陰最難得汗補藥力到汗出至足方是桂枝○老瘧係風暑之邪人在陰分宜用血藥引出陽分而散古方多用峻劑恐非所宜○若感病極深雖得大汗所感之邪必自臟傳出至腑其發無時必亂而失期若發於午之後寅之前者血受病也爲難愈須漸遣早亦是佳兆故治此病春夏爲易秋冬爲難非有他也○以汗之難易爲優劣也○凡瘧經年不差謂之老瘧必有痰水瘀血結成痞塊藏於腹脇作脹且痛乃瘧母也雖內虛非常山檳榔決不能除但須製