

御纂醫宗金鑑外科

上海昌文書局
印行

R26

2-1

卷一 編輯外科心法要訣

人身經絡圖歌

脈訣歌

十二經氣血多少歌

癰疽總論歌

癰疽陽證歌

癰疽陰證歌

癰疽半陰半陽歌

癰疽五善歌

癰疽七惡歌

癰疽順症歌

癰疽逆證歌

癰疽辨腫歌

癰疽辨痛歌

癰疽辨膿歌

癰疽辨瘰歌

癰疽辨瘰歌

癰疽總論治法歌

內消治法歌

內托治法歌

瘰癧治法歌

癰疽鍼灸法歌

癰疽灸法歌

癰疽灸法歌

癰疽灸法歌

癰疽灸法歌

癰疽灸法歌

桑柴火烘法歌

牛膠蒸法歌

藥筒拔法歌

癰疽烙法歌

卷二 編輯外科心法要訣

腫瘍主治類方

仙方活命飲

神授衛生湯

清熱消風散

乳香黃耆散

內疎黃連湯

回陽三建湯

竹葉黃耆湯

內消散

內固清心散

琥珀蠟礬丸

護心散

透膿散

託裏消毒散

神功內托散

復元通氣散

雙解貴金丸

黍米寸金丹

麥靈丹

保安萬靈丹

腫瘍敷貼類方

如意金黃散

五龍膏

四虎散

真君妙貼散

二青散

坎宮錠子

雜宮錠子

白錠子

科蚪拔毒散

二味拔毒散

回陽玉龍膏

中和膏

鐵桶膏

烏龍膏

神效千槌膏

馬齒莧膏

潰瘍主治類方

四君子湯

四物湯

八珍湯

十全大補湯

八參養榮湯

內補黃耆湯

異功散

理中湯

六君子湯

香砂六君子湯

托裏定痛湯

聖愈湯

柴胡四物湯

地骨皮飲

知藥四物飲

三黃四物湯

補中益氣湯

八參黃耆飲

獨參湯

溫胃飲

橘皮竹茹湯

胃愛丸

二神丸

加味地黃丸

參朮膏

八仙膏

洗滌類方

慈歸濁瀉湯

艾茸敷法

猪蹄湯

膏藥類方

萬應膏

紺珠膏

陀僧膏

巴膏

亞聖膏

絳珠膏

絳紅膏

加味太乙膏

白膏藥

貝葉膏

碧螺膏

麻藥類方

環麻散

整骨麻藥

外敷麻藥

去腐類方

白降丹

紅升丹

元珠膏

生肌類方

生肌定痛散

輕乳生肌散

薑蓉散

腐盡生肌散

月白珍珠散

五色靈藥

生肌玉紅膏

瑩珠膏

呂祖一枝梅

卷三

編輯外科心法要訣

頭部

百會疽

透腦疽

侵腦疽

佛頂疽

額疽

重疽

髮疽

天疽銳毒

耳後疽

耳發

耳根毒

玉枕疽

腦後發

腦鑠

油風

白屑風

禿瘡

螺蛭癬

髮際瘡

面部

額瘍

額疽

額疔

面發毒

面遊風

疔腮

頰瘍

骨槽風

發頤

時毒

風眉疽

眉心疽

龍泉疽

虎鬚毒

燕窩瘡

雀斑

黑痣

紫黑肝黯

卷四

編輯外科心法要訣

頂部

腦疽

偏腦疽

天柱疽

魚尾毒

百脈疽

結喉癰

夾喉癰

少陽疽

背
部
太陽經濕癰 馬刀瘻 陽明經癰 重臺瘰癧 上石疽 朱紫瘰 鈕扣風

上中下發背 上搭手 中搭手 下搭手 蓮子發 蜂窩發 陰陽二氣疽 黃水瘡

腰
部
串疽 酒毒發 連珠發 丹毒發 禽疽 痰注發

腎俞發 中石疽 纏腰火丹

卷五 編輯外科心法要訣

眼
部
眼胞蘭毒 眼丹 鍼眼 眼胞痰核 椒瘡 粟瘡 皮細瘡

漏眼睛瘡 目中芤肉

鼻
部
鼻疽 鼻疔 鼻淵 鼻蠟瘡 鼻瘡 鼻痔 肺風粉刺 酒皸鼻

耳
部
黑疔 耳疳 耳衄 耳痔 耳聾 耳聾 旋耳瘡

口
部
大人口破 鵝口瘡 口瘡

唇
部
反唇疔 鎖口疔 唇疽 齙唇 唇風

齒
部
牙疳 牙宣 鎖牙疽 牙疔 牙癰 走馬牙疳 齒蠟 齒齕

卷六 編輯外科心法要訣

舌
部
紫舌脹 痰包 舌衄 重舌 痰核 重舌 舌疔 舌疳 附癰瘰癧

猴
部

緊喉風

附喉蛾

慢喉風

喉閉

附喉蛾

啞痺喉風

弄舌喉風

喉疳

喉癰

上唇癰

鎖喉毒

乳蛾

喉瘤

胸乳部

甘疽

腫中疽

脾發疽

井疽

蜂窩疽

靈疽

瘰癧疽

內外吹乳

乳疽

乳癰

乳發

乳漏

乳中結核

乳旁

乳岩

卷七

編輯外科心法要訣

腹部

幽癰

中脘疽

淋癰

銜疽

臍癰

附臍中出水

少腹疽

腹皮癰

緩疽

腋部

腋癰

腋疽

脇疔

肋部

肋疽

淵疽

肉發丹毒

脇癰

附疽

內癰部

肺癰

大小腸癰

胃癰

脾癰

肝癰

心癰

腎癰

三焦癰

內癰總論

驗內癰法

卷八

編輯外科心法要訣

肩部

肩中疽

乾疽

過肩疽

膠疽

肩風毒

樂疽

臑部

臑癰

附臑包

魚肚發

石榴疽

肘癰

臂部

臂癰

附五

腕癰

兌疽

穿骨疽

骨縫疽

螺站串

手部

子發背

掌心毒

虎口疽

附合名

病蝦

手發背

調疽

蛇頭疔

天蛇毒

蛇眼疔 蛇背疔 蛙節疔 蛇腹疔 泥鰍疽 代指 蜈蚣蛇 癰瘡

狐尿刺 鵝掌風

卷九 編輯外科心法要訣

下部

惡癰 穿襠發 跨馬癰 便毒 疳瘡 陰虱瘡 腎囊癰 腎囊風

婦人陰瘡

臀部

鵝口疽 坐馬癰 臀癰 上馬癰 下馬癰 湧泉疽 臟毒 痔瘡

坐板瘡

卷十 編輯外科心法要訣

股部

附骨疽 咬骨疽 股陰疽 橫痃疽 陰疽 伏兔疽 股陽疽 環跳疽

肚門癰 箕門癰 腿遊風 青腿牙疳

膝部

膝癰 疔疽 膝眼風 鶴膝風 下石疽 緩疽 委中毒 上水魚

人面瘡

卷十一 編輯外科心法要訣

脛部

三里發 腓腸發 黃鰍癰 青蛇毒 接骨瘡 附陰疽 內踝疽 外踝疽

穿踝疽 濕毒流注 附以膝經 腎氣遊風 膝瘡 鱗漏 四彎風 風疽

足部

足發背 湧泉疽 脫疽 敦疽 甲疽 足跟疽 厲癰 四淫

臭田螺 牛程蟻 土栗 冷疔 腳氣瘡 田螺胞 肉刺

卷十二 編輯外科心法要訣

發無定處上

疔瘡

流注

癰疽

多骨疽

結核

癰發

瘰癧

烏白癩

卷十三

編輯外科心法要訣

發無定處中

大麻風

楊梅瘡

楊梅結毒

赤白遊風

紫白癩風

白駁風

癰瘍風

丹毒

粟瘡作痒

枯筋箭

卷十四

編輯外科心法要訣

發無定處下

疥瘡

癬

黃水瘡

暑令癰毒

瘡疽

產後癰疽

翻花瘡無圖

血風瘡

瘡瘡

浸淫瘡

火赤瘡

貓眼瘡

魚脊瘡

骨癰瘡

風疔無圖

血疔

白疔

漆瘡

血瘡無圖

脫痛無圖

瘡口誤入毒水無圖

諸瘡生蠅蛆無圖

卷十五

編輯外科心法要訣

雜證部

跌撲

金瘡

箭頭入肉

鉄鍼入肉

鉄鍼誤入喉

誤吞銅錢

骨髀咽喉

杖瘡

夾傷

竹木刺入肉

破傷風

發瘰

湯火傷

凍瘡

人咬傷

熊虎狼傷

馬咬傷

瘋犬咬傷

馬汗驢涎入

蛇咬傷

蜈蚣咬傷

蝎蟄

蜂咬

射工傷

蛇刺傷

天蛇瘡

蠅螫傷

百蟲入耳

卷十六

編輯外科心法要訣

嬰兒部

赤遊丹毒

胎瘤

紅絲瘤

胎癰瘡

痘癰

葡萄疫

胎驚丹毒

滯熱丹毒

嬰兒瘡瘍

垂癰

胎風

臍瘡

臍突

陰腫

脫肛

肛門作瘡

遺毒

痘裏火癰

痘疔

痘裏發丹

痘爛

痘風瘡

逐日八神所在不宜鍼灸歌

十二時八神歌

十二支日八神所在歌

十日不宜用鍼犯之病多反覆

九宮房神圖

九宮房神歌

升行靈藥針難口法

煉金頂砒法

製寒食散法

幽癰圖



幽癰在臍上七寸

腹部

幽癰 幽癰臍上七寸生初小漸大腫硬疼憂思厚味火毒發咬牙寒戰毒陷攻注此證生臍上七寸初起如粟漸增漫腫疼痛形如搗卵甚則堅硬痛牽胸肋由過食膏粱厚味憂思氣結腸胃不通火鬱成毒自內而外發也初起腫痛皮色未紅時若心煩嘔噦脈沉實者當疎火毒以絕其源宜內裏透膿湯膿脹痛不潰是氣血虛也急用十全大補湯溫補之外兼用針針開針鍼者針入斜出防傷內膜也或誤行汗下或誤敷寒涼以致腫而不潰清而不斂者急用十全大補湯加乾姜附子以救之已潰朝寒暮熱者氣血虛也食少作瀉脾胃虛也胸痞痰壅脾肺虛也俱服六君子湯服後諸證悉退換十全大補湯調理即愈外治之法按癰疽腫瘍潰瘍門無論已潰未潰忍咬牙寒戰係氣虛不能勝毒毒陷攻裏之兆或潰後膿水忽多忽少瘡口如蟹吐沫者係內膜已透俱為逆證

託裏散

皂刺

金銀花

黃芩

牡蠣

煅

當歸

赤芍

朴硝

大黃

花粉

連翹

各等分

共研粗末

每用五錢

酒水各一

鍾煎八

分去渣服

方託裏散醫諸瘡毒腫甚

癰疽

隔蒜灸法

見前部

託裏透膿湯

見頭部

補中益氣湯

十全大補湯

六君子湯

即前部

六君子湯

去心

共研粗末

每用五錢

酒水各一

鍾煎八

分去渣服

方託裏散醫諸瘡毒腫甚

中脫疽

中脫疽由胃火生臍上四寸隱隱疼堅硬漫腫無紅熱不食嘔噦毒內攻注此證一名胃疽發於心膈之下臍上四寸任脈經中脫

穴隱痛日久向外生疽堅硬漫腫皮色無紅無熱由過食炙博以致胃府火毒而成人迎脈盛是毒氣攻裏作嘔不食咳嗽膿痰者逆初宜服仙方活命飲色紫堅硬宜服山甲內消散膿勢將成內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門若起長膿邊或瘡不斂痛者急用艾壯隔獨頭蒜片置患上灸之回陽

中脫疽在臍上四寸

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽

中脫疽圖



中脫疽在臍上四寸

癰瘰圖



癰瘰生在臍上二寸

疽衝圖



疽衝生在臍上二寸

山甲內消散 穿山甲 三錢 當歸尾 大黃 甘草節 三錢 土木 燉三 墨牽牛 鹽蠶

錢各一 右酒水各一鍾煎八分空心服渣再煎服大便行三四次方食稀粥淡味調理 仙方活命飲 見腫瘍門

漏癰○漏癰七情鬱火成臍上三寸赤微紅暴腫焮痛二七潰頂陷色黑潰邊山此證由七情鬱火凝結而成生臍上三寸屬任脈經建里穴初如粟米痛痒相兼其腫迅速寒熱往來甚則嘔噦牽引臍痛初腫微紅頂尖根未漸遠赤色時痛時止十四日潰膿者順若頂陷紫黑根脚漫腫面赤大渴脈見浮數而散大者逆內痔與幽癰參攷外治法按癰疽腫瘍潰瘍門

衝疽○衝疽臍上二寸生心火毒熾入腎紅高腫焮痛連潰若見七惡定然山此證生於任脈臍上二寸下腕穴一名中發疽又名墮腎瘡由心火熾盛流入腎經而成色赤高腫應在二十一日潰破膿稠受補者順初宜瘡科流氣飲或仙方法命飲消之膿將成時內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門其證若手壩紫黑膿水清稀七惡證見者逆瘡科流氣飲見諸部○仙方法命飲見諸門

臍癰圖



臍癰生在臍前

黃水此屬腸胃濕熱積久宜服黃連平胃散外用三妙散乾撒瘡濕即愈當忌酒麪生冷果菜不致再發若水出不止者亦屬逆黃連平胃散 黃連 五錢 陳皮 厚朴 各三錢 甘草 二錢 蒼朮 一兩 共研細末每服三錢白滾水調服

三妙散 檳榔 蒼朮 生 黃蘗 各等分 共研細末乾撒肚臍出水津淫成片止痒滲濕又治濕癬以蘇合油調搽甚效

仙方三妙散用檳榔蒼朮黃蘗同研參濕瘡蘇合油調治濕癬收乾止痒效稱強

少腹腹圖



少腹腹圖

少腹疽○少腹疽生臍下邊證由七情火鬱經高腫紅皮韋背易漫腫爛腐水膿艱此證由七情火鬱而生每發於氣海丹田關元三穴氣海在臍下一寸五分丹田在臍下二寸關元在臍下三寸皆屬任脈經此三穴或一穴發腫即為少腹疽高腫紅活疼痛韋背勿潰潰膿者易治若漫腫堅硬綿潰腐爛膿稀如水者難治凡遇此證初起急用艾灸腫頂七壯至三七壯以痛痒通徹為度宜服仙方活命飲氣寬之人大渴便秘者宜服內疏黃連湯通利之老弱之人宜服內補十宣散令其速潰若潰遲恐透內膜外治宜同癰疽腫瘍潰瘍門

仙方活命飲 內疏黃連湯 俱見腫瘍門 內補十宣散 見胸郭癰癰毒

腹皮癰 腹皮癰生腹皮內皮裏膜外腫隱發腹痛不止膿成候證由膏粱鬱火生此證生於腹皮裏膜外無論左右隱發日久後愈難重

於皮外右關脈見沉數而腹痛甚者是其候也由膏梁火鬱而成初起壯實者用雙解貴金丸下之虛弱者減半用之不應再服半劑凡下之

腹皮癰




後腹痛不止膿將成也急用託裏透膿湯潰後與癰疽潰瘍門治法相同不可過用剋伐之劑若希圖消散過傷胃氣則腫不能潰潰不能斂三見危亡矣

緩疽



緩疽緩疽脾經氣積凝少腹旁生堅入疼數月不潰生寒熱食少削瘦致難成註此證由太陰脾經氣滯寒積而成生於少腹之旁堅硬如石不紅不熱痛引腰腿數月不潰若兼食少削瘦者屬敗證但不可棄而不治初宜服山甲內消散不應不可強消徒損胃氣以十全大補湯加烏藥附子胡蘆巴溫補之外用木香餅熨之兼用獨頭蒜搗爛鋪於患上又壯灸之以知熱為止次日再灸以或

消或潰為效若潰後即按癰疽潰瘍門治法



山甲內消散見中脫疽 十全大補湯見潰瘍門 木香餅見乳部乳中結核

癰疽



癰疽癰疽腫生腹間腫硬焮赤痛熱寒肝脾血熱兼忿怒初宜清解潰補痊註此證一名夾肢癰發於腋際即俗名疔股窩也屬肝脾血熱兼忿怒而成初起暴腫焮硬色赤疼痛身發寒熱難消必欲作膿初宜服柴胡清肝湯外敷冲和膏疼痛日增宜服透膿散加金銀花甘草節桔梗膿脹痛者鍼之已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門此證首尾忌用寒涼中年易愈老弱之人難痊

腋疽



腋疽腋疽初起若核形肝志脾愛氣血凝滯漫腫堅硬宜絲灸日久紅熱潰先疼註此證一名米疽又名疫疽發於疔股窩正中初起之時其形如核由肝脾二經憂思志怒氣結血滯而成漫腫堅硬

皮色如常日久將潰色紅微熱疼痛也初宜又壯隔蒜片灸法內服柴胡清肝湯加烏藥消之虛弱之人宜服香貝養榮湯外用烏龍膏敷之



早治或有全消者遲則膿成宜服託裏透膿湯膿脹痛者鍼之膿出痛減隨患者虛實補之其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門此證初終內外治法禁用寒涼中年易愈老弱難痊

癰疽



癰疽癰疽初起若核形肝志脾愛氣血凝滯漫腫堅硬宜絲灸日久紅熱潰先疼註此證一名米疽又名疫疽發於疔股窩正中初起之時其形如核由肝脾二經憂思志怒氣結血滯而成漫腫堅硬

小針心去

醫方 諸行藏於腋下生肝脾火毒瘰而瘰寒熱拘急色紫黑急按疔門治即甯此證生於腋下由肝脾二經火毒而成堅硬勢若釘頭洋而且痛寒熱往來四肢拘急其色紫黑煩躁作嘔痛引半身宜服參靈丹其次內外急按疔門治之即愈

參靈丹 見腫瘍門

助部

肋疽 肋疽始發為肝經火毒鬱結結腫形紫痛極手或如盤急宜鍼從免內攻此證一名夾禁疽生於肋條骨間由肝經火毒鬱結結聚而成初如梅李漸大如盤色紫痛連及肩肘患在左痛牽右肋患在右痛牽左肋二十一日之內膿潰稠粘者順佳期不潰既潰出水者逆初腫急宜鍼從出紫血庶免毒氣攻裏後亦腫痛甚煩燥膿實作嘔者有餘之證宜服雙解毒金丸下之腫硬不潰宜服透膿散脈弱作嘔此胃虛也宜服香砂六君子湯補之亦有痛傷胃氣而作嘔者即同胃虛治之若感受寒邪及偶觸穢氣而作嘔者雖腫時尤宜壯胃助氣為主蓋腫時作嘔因毒氣內侵者十有一二停飲內傷者十有八九惟醫人臨證詳辨之膿熟用針鍼開之餘按難疽潰瘍門治法

雙解毒金丸 透膿散 俱見腫瘍門 香砂六君子湯 見潰瘍門

淵疽圖



淵疽在腋下二寸堅硬不紅

內發丹毒圖



內發丹毒多於胸背及腰脇也赤如霞遊走如雲

淵疽 淵疽肝脾憂急成生於肋下硬腫痰潰破有聲內膿透未潰當服護膜靈此證因憂急太過以致肝胆兩傷而成生於肋下初起堅硬腫而不紅日久方潰得稠白膿者順如豆漿水者險瘡口有聲似小兒啼此屬內膿透也即於陽陵泉穴灸二十七壯其聲即止穴在膝膕骨外膝下一寸陷中蹲坐取之即得內外治法皆同肋疽凡肋胸脇腰腹空軟之處發難疽者當在將潰未潰之時多服護膜散可免透膜之患

護膜散 白蠟 白芨 各等 共研細末輕劃一錢中劃二錢大劃三錢黃酒調服米湯亦可

內發丹毒 丹毒肝脾熱極生肋上腰脇赤霞形急夜出紫黑血嘔噦昏脹毒內攻此證由肝

脾二經熱極生風所致生於肋骨延及腰脇色赤如霞遊走如雲痛如火燎急向赤腫周圍從出紫血以瘦牛肉片貼之羊肉片亦可其毒即可減半初服雙解毒金丸汗之次服化斑解毒湯投方應病者順若嘔噦昏潰胸腹脹偏身青紫者則為毒氣內攻屬逆

化斑解毒湯 升麻 石膏 連翹 去心 牛蒡子 炒研 人中黃 黃連 知母 黑參 錢各一 竹葉二十片 水二鐘煎八分服

歌方 化斑解毒熱生風致發丹毒雲片紅壯膏翹等中黃等黃連知母黑參同

雙解毒金丸 見腫瘍門

脇難疽 脇難疽紅高腫疼疽堅癰漫冷不紅皆屬肝脾火結遲潰敗膿冷虛山此證生於腋肋有硬骨者為肋肋下軟肉處為李脇難

腦癰



腦癰在腦骨下軟肉處

五臟六腑



諸募穴圖



疽二證皆由肝胆火凝結而成多生於體虛之人初如梅李漸長如盤如盆色紅焮痛高腫二七潰破膿稠為癰若堅硬手攣漫腫木痛不紅不熱月餘潰破稀膿為疽若失治屆期不潰攻擊成膿腫如鼓脹破出敗膿腥臭膿者逆癰疽二證初腫時俱宜急服柴胡清肝湯清肝湯鮮鬱瀉火如已成者服托裏透膿湯膿熟脹痛俱用卧鍼開之已潰以排餘膿補氣血為要餘按癰疽潰瘍門治法投補不應者難治柴胡清肝湯見頭部癰疽○託裏透膿湯見頭部癰疽

內癰部

肺癰○肺癰肺熱復傷風肺藏生癰隱痛胸狀若傷寒燥熱甚稠濁痰涎腥臭膿未潰射干麻黃汗壅不得卧葶藶散清後稠膿能食舌腫清兼血不食山註此證係肺藏蓄熱復傷風邪鬱火成癰以致胸中府穴隱隱疼痛振寒脈數狀類傷寒咽燥不渴欬而喘滿唾稠粘黃痰兼臭穢膿血也治之者於未潰時乘膿未成風鬱於表者法宜疏散用射干麻黃湯以汗之如氣壅喘滿身不得卧者急服葶藶大東湯以瀉之如數有微熱煩滿胸中甲錯膿欲成者宜千金葶藶湯以吐之若吐膿腥臭形如米粥者宜桔梗湯以排餘膿若吐膿腥臭咳而胸滿者宜外臺桔梗白散以開閉塞若咳吐膿血兼午後身

熱煩燥宜金經湯主之兼飲童便若潰後胸膈脇肋隱痛不止口燥咽乾煩悶多渴自汗盜汗眠卧不得咳吐稠痰腥臭此係癰膿不盡而兼裏虛宜實肺桔梗湯主之若癰膿已潰喘滿腥臭濁痰俱退惟欬咽乾略吐痰血脇肋微痛不能久卧者此屬肺癰潰處未斂宜紫苑葶藶湯清補之渴甚去半夏加石膏服之若癰膿潰後咳嗽無休膿痰不盡形氣虛羸者宜清金葶藶丸主之凡治此證惟以身溫脈細膿血交粘痰色鮮明飲食甘美膿血漸止使潤者為吉若手掌皮粗潰後六脈連數氣急顛紅汚膿白血懶食及大便秘結燥者為凶中府穴又名肺募在乳上第三根肋骨間

射干麻黃湯

射干

十三枚

或三兩

麻黃

生薑

各四兩

細辛

紫苑

款冬花

各三兩

大棗

七枚

五味子

半夏

各半升

水煎溫服

葶藶大棗湯

葶藶

重者五錢

大棗

十枚

以水三鍾

煎至一鍾服之

千金葶藶湯

葶藶

二升

葶藶

以仁炒

瓜瓣

各半升

即冬瓜仁

桃仁

五十粒

去

水煎服

方千金葶藶肺癰

微熱煩滿

吐敗濁

皮膚甲錯

宜葶藶

意以桃仁

水煎服

桔梗湯

苦桔梗

甘草

二兩

水煎服

方桔梗湯用排餘膿

肺癰吐膿米粥形

清熱解毒須甘草

開提肺氣桔梗功

外臺桔梗白散 苦桔梗 貝母各三分 巴豆一分去皮 右三味為散強人飲服半錢七歲者減之病在膈上者吐膿在膈下者瀉出若下

多不止飲冷水一杯則定歌方 外臺桔梗白散方肺癰使秘服之良桔梗貝母與巴豆藥微力大功速捷

金鯉湯 金色活鯉魚四兩重 貝母二錢 先將鯉魚連鱗剖去肚腸勿經水氣用貝母細末拌在魚肚內錢紫之用上白童子便半大盆將

魚浸重便內重湯地煮魚眼突出為度少頃取出去鱗骨取淨肉浸入童便內地熱肉與童便作二三次一日食盡一枚其功效甚捷

方金鯉湯中效罕稀法同貝母活鯉魚童便浸魚重湯地肺癰煩熱善能醫

寧肺桔梗湯 苦桔梗 貝母各去心 當歸 桔梗仁研 生黃耆 枳殼數分 甘草節 桑白皮炒 防己百合去心 薏苡各八分

五味子地骨皮 知母生 杏仁炒研 苦草各五分 水二鍾姜三片煎八分不拘時服 欬甚倍加百合 身熱加柴胡黃芩 大

便不利加蜜炙大黃一錢 小水澀滯加燈心木通 煩燥痰血加白茅根 胸痛加人參白芷歌方 寧肺桔梗肺癰歸薑貝殼甘果皮

防己百合等五味杏知薏仁地骨宜

紫苑茸湯 紫苑茸 犀角末 甘草炙 人參各五分 桑葉用經霜者 欬冬花 百合去心 杏仁炒 阿膠便潤炒用 貝母去心 半夏製

蒲黃各生 姜三片水二鍾煎八分將犀角末調入食後服歌方 紫苑茸湯參犀角欬冬桑葉否百合阿膠甘夏貝蒲黃韋醫肺癰不久卧

清金寧肺丸 陳皮 白茯苓 苦桔梗 貝母去心 人參 黃芩各五分 麥冬去心 地骨皮 銀柴胡 川芎 白芍炒 胡黃連

各六錢 五味子天冬去心 生地 酒浸梅膏 熟地搗膏 歸身 白朮各一兩炒 甘草三錢炙 右為細末煉蜜為丸如梧桐子

大每服七十丸食遠白滾湯送下歌方 清金寧肺丸肺癰陳苓桔梗貝參冬桑葉歸身黃連草朮味生熟地骨膏

大小腸癰○大小腸癰因濕熱氣滯瘀血注腸中初服大黃行滯瀉腹成意以牡丹平註此二證俱由濕熱氣滯凝結而成或努力瘀血或產

後敗瘀蓄積流注於大腸小腸之中初起發熱惡風自汗身皮甲錯關元天樞二穴隱痛微腫按之腹內急痛大腸癰多大便墜腫小腸癰多

小水滯澀脈俱通紫此時癰膿未成宜大黃湯下之瘀血利盡若小水閉澀仍宜大黃湯加琥珀末木通利之自效若癰成日久不潰身皮甲

錯內無積聚腹急脹痛身無熱而脈數者係腸內陰冷不能為膿宜意以附子散主之若脈見洪數壯膈高突腹痛脹滿不食動轉側身則有

水聲便淋刺痛者癰膿已成宜意以湯主之腹濡而痛少腹急脹時時下膿者毒未詳也宜丹皮湯治之如膿成臍出腹脹不除飲食減少面

白神勞此屬氣血俱虛宜八珍湯加牡丹皮肉桂黃耆五味子飲而補之患者轉身動作宜徐緩而勿驚慎之如就延日久因循不治以致毒

攻內藏腹痛牽陰腸胃受傷或致陰器紫黑腐爛色敗無膿每流污水食轉多臭煩燥不止身熱喘乾俱屬逆證關元穴又名小腹着在臍下

三寸天樞穴又名大腸募在臍旁開二寸

大黃湯 大黃剉炒 牡丹皮 硝石研 芥子 桃仁炒先以湯浸去 右各等分共剉碎每用五錢水二鍾煎至一鍾去滓空心時溫服

以利下膿血為度未利再服歌方 大黃湯善治腸癰少腹堅脹未成牡丹皮與大黃炒芥子桃仁硝石蜜

意以附子散附子也 敗醫五分 意以仁 右為末每服方寸匕以水二合煎服小水當下三因云意以附子同煎當用一

兩分每服四錢水一盞半煎七分去渣空心服 意以附子散中錯腸癰脹脈數附子敗醫意以仁為末水煎空心服

意以湯 意以仁 枯婁仁 各三 牡丹皮 桃仁 各二 水二鍾煎至一鍾不拘時服

歌方 意以湯治腹水聲腸癰便淋刺痛疾牡丹皮共枯婁子還有桃仁意以仁

丹皮湯 丹皮 枯婁仁 各一 桃仁 各二 朴硝 各二 大黃 五錢 水二鍾煎一鍾去渣八硝再煎數滾不拘時服

歌方 丹皮湯療腸癰證腹滿而痛時下膿硝黃丹萸桃仁共水煎服之有奇功

八珍湯 見清湯門

胃癰 胃癰中脫穴腫疼不飲不嗽吐血膿飲食之毒七情火候治腸癰大法同 此證初起中脫穴必隱痛微腫寒熱如瘡身皮中錯並無

欬嗽咯吐膿血由飲食之毒七情之火熱聚胃口成癰癰未沉數者初服清胃射干湯下之若脈滿滯者瘀血也宜服丹皮湯下之脈洪數者

膿成也赤豆意以仁湯排之體倦氣喘作渴小水頻數者肺氣虛也補中益氣湯加麥冬五味子補之其候證生死治法與大小腸癰同中脫

穴又名胃募在臍上四寸

清胃射干湯 射干 升麻 犀角 麥冬 各一 元參 大黃 黃芩 各一 芒硝 梔子 竹葉 各五 水煎服

歌方 清胃射干湯射干升麻犀角麥冬各參大黃芒硝等竹葉山梔胃癰痊

赤豆意以仁湯 赤小豆 意以仁 防己 甘草 各等 水二鍾煎八分食遠服

歌方 赤豆意以仁湯最神甘己赤豆意以仁胃癰膿成脈洪數二鍾水煎服八分

丹皮湯 見大小腸癰 補中益氣湯 見清湯門

脾癰 脾癰濕熱瘀血凝滯門穴腫兼隱疼腹脹嗝乾小水短利下濕於補收功 此證始發章門穴必隱疼微腫由過食生冷兼濕熱或瘀

血鬱滯脾經而成令人腹脹咽嗝乾燥小水短澀初宜大黃湯赤豆意以仁湯二方合而用之以攻滯鬱二便通利腹脹全消宜六君子湯扶

脾調理順道看法與胃癰同章門穴又名脾募在臍旁開六寸高上二寸

大黃湯 見大小腸癰 赤豆意以仁湯 見胃癰 六君子湯 即香砂六君子湯去藿香砂仁見清湯門

肝癰 肝癰憤鬱氣逆成期門穴腫更兼赤臥驚悸滿便不利清肝滋腎即成功 此證始發期門穴必隱痛微腫令人兩脇脹滿脇痛側卧

則驚便溺難由憤鬱氣逆而成初服復元通氣散次服柴胡清肝湯痛脹已止宜服六味地黃湯脾虛食少則佐以八珍湯治腎補脾治之

取效禁用溫補鍼灸期門穴又名肝募在乳旁一寸半再直上一寸半

復元通氣散 見腫瘍門 柴胡清肝湯 見頭部瘰癧 六味地黃丸 見面部瘰癧 八珍湯 見清湯門

外科心法

心癰 心癰巨關腫脹發熱嗜飲火毒成面赤口渴身作痛治法陽熱熱宜清此證始發巨關穴必隱痛微腫今人寒熱身痛頭面赤色口渴隨飲隨乾由心火熾盛更兼酷飲嗜熱而成宜服涼血飲酒毒為病者宜服升麻葛根湯治之此證其屬罕有但治法不可不備巨關穴又名心募在臍上六寸五分

涼血飲 木通 瞿麥 荊芥 薄荷 白芷 花粉 甘草 赤芍 麥冬 生地 山梔子 車前子 連翹 用燈心若

潮熱如淡竹葉水煎服 歌方 涼血飲善治心癰瞿麥荊芥薄荷連翹赤芍山梔乾生地車前花粉麥門冬

升麻葛根湯 山梔 升麻 葛根 白芷 柴胡 黃芩 黃連 木通 甘草 水二鍾煎八分不拘時服

歌方 升麻葛根湯山梔酒毒心癰黃連宜柴胡通芩升葛單水煎溫服不拘時

腎癰 腎癰腎經不足生京門微腫隱隱疼少腹肋下脹滿房勞形寒邪外乘此證始發京門穴必隱痛微腫令人寒熱往來面白不渴

少腹及肋下脹滿由腎虛不足之人房勞太過身形受寒邪氣自外來之初服五積散加細辛寒盡痛止宜用桂附地黃丸調理京門穴

又名腎募在身側腰中監骨下肋間

五積散 蒼朮 二錢 陳皮 桔梗 川芎 當歸 白芍 各一錢 麻黃 枳殼 麩炒 桂心 乾姜 厚朴 各八分 白芷 半夏 各四分

甘草 生 茯苓 各四分 引姜一片水二鍾煎八分不拘時服 頭痛惡寒者加連翹葱頭三個蓋卧汗出甚效 歌方 五積散蒼朮陳芩

麻黃半桔歸芍芎芷朴桂心乾姜單腎癰寒邪服成功 桂附地黃湯 見消渴門

三焦癰 三焦癰由濕熱凝石門穴上腫隱疼寒結治同腸癰法內癰俱係膜內生此證始發石門穴必隱痛微腫令人寒熱往來二便秘

澀由濕熱遇寒凝結而成治法與大小腸癰同凡內癰俱係膜內成患外皮不腐石門穴又名三焦募在臍下二寸

內癰總論 凡人胸腹有十一募募者各藏府陰會之所也靈樞云發內癰內疽者其本經募上肉必浮腫募中必時時隱痛浮腫為癰隱痛

為疽此即內癰內疽之驗也茲內癰有治法內疽無治法何也蓋內癰內疽其病原無殊惟在根淺根深之別耳根淺為癰根深為疽若臨證

用藥攻補得宜無不收效至募有十一而內癰僅九證者何也蓋胆府形如膜皮無出無納汁清氣潔不生內癰內疽若夫膀胱亦如膜皮中

惟濁水故古今書籍並無講及內癰內疽者是以未敢詳載雖然中極穴即膀胱募也今人間有中極穴或浮腫或隱痛者所見證候竟同小

腸癰治法亦當按小腸癰治之可也俟後之學者留意焉

驗內癰法 凡遇生內癰之人與生黃豆五粒嚼之口中無豆味者是其候也

卷八

編輯外科心法要訣

肩部 〇肩中疽 乾疽 過肩疽 〇肩疽癰發正肩中疽硬黑陷腫紅乾疽肩前過肩後風濕積熱血瘀凝此證生於肩中廉屬三焦

肩中疽圖



乾疽圖



過肩疽圖



圖 疽 膠



圖毒風肩



樂疽圖



胆二經紅注高腫一名疣癰堅硬平塌為肩中疔肩之前廉屬大腸經名乾疽一名疔癰肩之後廉屬小腸經名過肩疽瘡勢無論大小惟在發源之處命名總由濕熱風邪鬱成亦有負重於血凝結而成高腫紅注城熱速潰者順若平塌堅硬無紅無熱潰遲者險甚則腫痛連及肩胛口紫寒戰大痛不食或兼綿潰便瀉者逆治法初起有表證者俱宜剋防敗毒散汗之有裏證者內疎黃連湯下之汗下之後腫痛不退膿勢將成宜用託裏透膿湯膿熱開之至於引經之藥惟在臨證時因經加之潰後內外治法俱按癰疽潰病門。

荆防敗毒散 見項部腦症
 ○內疏黃連湯 見腫瘍門
 ○託裏透膿湯 見頭部侵腦症

膠疽（肩風毒）膠疽肩後腋外生。小腸肩貞風火凝肩風毒生臆端上。大腸肩髃風濕成。生於肩後下腋之後外。微上歧骨縫間。經屬小腸肩貞穴由風火凝結而成。初起如粟。堅硬腫痛。肩臆拘急不能舉揚。初服荊防敗毒散。便燥實者。服雙解貴金丸。雙解之。肩風毒生於肩梢臆上骨尖處。經屬大腸肩髃穴。由邪風深襲骨縫。與濕稽留化熱而成。初起宣腫色赤。大者如桃。小者如杏。痛連肩臆。更兼拘急。初服蠲痛靈。愛散汗之。即消。若腫痛日深。不能盡消者。膿勢將成也。宜服託裏透膿湯。二證潰後內外治法。俱按癰疽潰瘍門。

蜀痛無憂散
 番木鱉
香油
 當歸
酒洗

草烏姜汁煮
 蒼朮米泔水浸炒
 半夏各二錢
 威靈仙一兩
 各製為末共和勻。每服五七分至一

錢無灰酒調服。再飲酒以醉為度。蓋卧出汗避風。此方加蘭羊花四兩。亦治頭風痛。方蠲痛無

○**雙解貴金丸** 見腫瘍門

樂疽○樂疽肩胛腋上生骨縫開合凹陷中堅如鵝卵痛入骨色絡血熱氣鬱成法此證生於肩前腋
之上骨縫開合空凹陷中初如椒子漸腫堅硬大如鵝卵按之疼痛入骨屬色絡經血熱與氣鬱而
成其證屆期潰破出稠膿腫消者順月餘不潰既潰出清水腫硬不退者逆初宜服神授衛生湯若
惡風太過倍加蔥白汗之次服託裏透膿湯潰遲者十全大補湯潰後內外治法俱按癰疽潰瘍門
神授衛生湯見腫瘍門○託裏透膿湯見頭部侵腦疽○十全大補湯見瘡瘍門

臑部 自肩至肘曰臑

圖癰臍




癰包毒



臍癰 附癰包毒 ○臍癰肩肘周匝腫色赤焮疼初起癰包毒狀鵝鴨卵臍內三陰外三陽此證由風濕或風火凝結而成生於肩下肘上週匝漫腫色赤焮痛初起狀如粟米一增亦有起一粒連疔瘡者漸次焮腫紅熱癰脹痛甚紅腫之外無量者順有二量者險三四量者逆腫發臍內或臍外結腫一枚如桃如鵝鴨卵者名鵝包毒毒者癰之輕證也臍癰包內外治法俱按

魚肚發



魚肚發 ○魚肚發如魚肚形青靈穴生心火凝暴腫紅活焮熱痛癰疽治法即成功此證生於臍之後垂肉處屬心經青靈穴由火毒凝結而成暴腫色赤焮熱疼痛形如魚肚腫消治法俱按癰疽腫潰瘍門其引經之藥惟在臨證加之

石榴疳




石榴疳 ○石榴疳起肘上臍胞根開堅腫疼破翻如榴寒熱如癰由三焦相火與外濕相搏而成初起宜蟾酥丸汗之外以艾炙九壯貼蟾酥餅用萬應膏蓋之焮腫處數沖和膏服菊花清燥湯煩燥熱甚者服護心散九日後作稠膿痛減喜食表裏證俱退者順反此者逆破後用菊花清燥湯洗之次以菊花燒灰存性加輕粉少許先勻敷之神效至透膿脫腐生肌時內外治法俱按癰疽潰瘍門

圖癰疔



癰疽生於肘之上寸餘堅硬色紫左右同甘草各五分 竹葉二十片 燈心二十寸 水二鍾煎八分食遠溫服

時癰



時癰發於肘圍繞高腫焮熱赤紅疼心肝指留風邪火勢小為癰大為癰在此證生於肘之圍繞者發高腫焮熱色紅疼痛由心火風火之邪指留凝滯而成形勢小者為癰形勢大者為癰初服煎防敗毒散汗之次服白芷升麻湯清託之外敷二味拔毒散將潰治法俱按癰疽腫潰瘍門

圖癰疔



癰疽生於肘之上寸餘堅硬色紫左右同甘草各五分 竹葉二十片 燈心二十寸 水二鍾煎八分食遠溫服