

山居本草

山居本草卷三下目錄

菜部 下

椿芽

綱目作椿樗
白皮及根

葉 莢

槐芽

苗葉 皮 根 皮 莖 白皮

枝木 槐膠

花子

榆芽

白皮 莢仁 花子

蕪荑

木槿

苗皮根

五加苗

根皮

皂莢芽

莢 木皮 根皮 子 刺 附肥 葉

皂莢子

欖櫚

俗作棕 子花 皮 筍

馬蘭

根 葉

香薷

荊芥

紫蘇

子

水蘇

薄荷

牛膝 莖葉

紫苑

决明 附茫莖

益母草

夏枯草

紅花 子苗

昆布

百部

蒲公英

茄 蒂花根莖葉

苦茄 子根

苦瓠 瓢及子花蔓

苦瓜 子

壺盧 葉蔓鬚花子

敗瓢

王瓜 根子

黃瓜

絲瓜 葉藤根

菜瓜

南瓜

冬瓜

瓢子

瓜皮

花椒

綱目作秦椒載在果部味既辛辣不能以果品常用且嫩可作茹蔬氣復芳香堪入食料今移

入菜部餘俱倣此

川椒

椒目葉根

野椒

蔓椒

根

地椒

胡椒

大茴

小茴

畢澄茄

吳茱萸

葉枝根白皮

食茱萸

鹽麩子

樹白皮根白皮附錄咸平樹及

酸角附百藥煎鹹草

附五倍子

川芎苗

附川芎

桂心

附牡桂

甘草

豆藿

豆芽

豆莢

豆腐

罌粟苗

俱見穀部

芡莖

菱莖

砂仁

胡桃

俱見果部

山居本草卷三 下

新安程履新德基甫述

男

光緒梅壑甫
光經通五甫

校


菜部 下

椿芽

綱目作椿樗。香者為椿。臭者為樗。二樹相似。南北皆有。但椿木實而葉香。可茹。作素菜甚佳。樗木疎而氣

臭。最為無用。但嫩芽淪食。消風祛毒。俗名香椿芽。嫩辛能同椿多壽耳。

動風。不宜與猪肉熱麪。頻食。同豆腐炒茹極佳。葉煮水洗瘡疥風疽。樗根葉尤

良。白禿無髮。取桃楸葉心同搗塗之。白皮及根皮。

刮去粗皮。

陰乾。臨時切焙用。

性溫味苦澀。主治赤白濁赤白帶赤白久痢。

精滑夢遺燥下濕。去肺胃陳積之痰。去口鼻疳蟲。殺蛇

蟲疥蠱。鬼疰傳尸。蠱毒下血。止女子血崩。產後血不止。
腸血瀉。血不住。腸滑瀉。縮小便。蜜炙用。

附方 去鬼氣

樗根一握。細切。以童兒小便二升。豉一合。浸一宿。絞汁煎一沸。三五日一度服之。

小兒疳疾

樗白皮。日乾二兩。為末。以粟米淘淨。研濃汁。和九。梧子大。十歲三四丸。米飲下。量大加減。

仍以一丸。納竹筒中。吹入鼻內。三度良。

小兒疳痢

困重者。用樗白皮。搗絞。以水和棗。作大餠。餠子。

日曬少時。又搗如此三遍。以水煮熟。空肚吞七枚。重者。不過七服。忌油膩熱麪毒物。又方。用樗根濃汁。一蜺。

殼和粟米。泔等分。灌下部。再度。即瘥。其驗如神。大人亦宜。

休息痢疾

日夜無度。腥臭。不可近。臍腹振。

痛。東垣脾胃論。用樗根白皮。訶黎勒。各半兩。母丁香三十箇。為末。醋糊丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。唐瑤。

經驗方。用樗根白皮。東南行者。長流水內漂三日。去黃皮。焙為末。每一兩。加木香二錢。粳米飯為丸。每服一錢。

二分。空腹。米飲下。

水穀下利

及每至立秋前後。即患痢。兼腰痛。取樗根一大兩。荷篩。以好麴捻作。

鮮飽如皂子大。水煮熟。每日下利清血。腹中刺痛。椿根

空。心服十枚。並無禁忌。神良。醋糊丸。梧子大。每空心米飲下。臟毒下痢。赤白。用香椿

三四十丸。一加蒼朮。枳殼減半。臟毒下痢。洗刮取皮。日

乾為末。米飲。臟毒下血。溫白。用椿根白皮去粗皮。酒

下一錢。立效。酒服五十九。或下血經年。酒半盞服。或作丸服。虛者加

酒糊丸亦可。人參等分。血痢下血。臘月。日未出。時取背陰地。北引。梧

即虎眼樹。末。每二兩。人寒。食麤一兩。新汲水。九。梧子大。陰乾。每服

三十丸。水煮滾。傾出。溫水送下。忌見日。則無效。名如神。脾毒腸風。因營衛虛弱。風氣襲之。熱氣乘之。血滲腸

丸。四兩。蒼朮。米泔浸。焙。以殼麤炒。各一兩。為末。醋。產後腸

糊丸。如梧子大。每服五十九。米飲下。日三服。脫。不能收拾者。樗枝取皮。焙乾。一握。水五升。連根葱五

則再熱。一服。可作五次用。洗後睡少時。忌鹽酢醬。女人

麤發風毒物。及用心勞力等事。年深者亦治之。

白帶

椿根白皮滑石等分爲末。粥丸梧子大。每空腹白湯下一百丸。又方。椿根白皮一兩半。乾薑炒黑。

白芍藥

炒黑黃蘗炒黑。各二錢。爲末。如上法丸服。男子白濁。方同上。

莢

一名鳳眼草。

主治大便下血。

槐芽苗葉

性平。味甘微苦。嫩時採茹。治諸風邪氣。產難絕。

傷及癰疹。牙齒諸病。煎湯治驚癇壯熱。疥癬及丁腫皮。

莖同功。

一名懷音懷。處處有之。木高大。初生嫩芽可療。熱水淘過食。亦可作飲。代茶。或採槐子種畦中。

採苗食亦佳。子可染皂。

附方霍亂煩悶

槐葉。桑葉。各一錢。炙甘草三分。水煎服之。腸風痔疾。用槐葉。

熟晒乾研末。煎飲代茶。久服明目。

鼻氣窒塞

以水五升。煮槐葉。取三升。下葱豉調和。再煎飲。

枝煎水洗瘡。及陰囊下溼痒。八月斷大枝。候生嫩芽。煮。

汁釀酒療大風痿痺甚效。治赤目崩漏。炮熱熨蝎毒青
枝。燒瀝塗癰。燬黑指牙去蟲。煎湯洗痔核。燒灰沐頭長
髮。

附方風熱牙痛

槐枝燒熱烙之

胎赤風眼

槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻

油一匙置銅鉢中晨使童子一人以其木研之至瞑乃止令仰臥以塗目日三度瘥

九種心痛

當太

歲上取新生槐枝一握去兩頭用水三大升煎取一升頓服

崩中赤白

不問遠近取槐枝燒灰食煎酒下方寸

七日二服

胎動欲產

日月未足者取槐樹東引枝令孕婦手把之即易生

陰瘡

淫痒

槐樹北面不見日枝煎水洗三五遍令再暖之

木皮根白皮

主治爛瘡喉痺寒熱煮汁服治下血煮汁

淋陰囊墜腫氣痛煮漿水漱口齒風疳蠱血治中風皮

膚不仁。浴男子陰疝卵腫。浸洗五痔。一切惡瘡。婦人產門痒痛。及湯火瘡。煎膏止疼。長肉消癰腫。

附方中風身直

不得屈伸反復者。取槐皮黃白者切之。以酒或水六升。煮取二升。稍稍服之。

破傷中風

避陰槐枝上。皮旋刻一片。安傷處。用艾灸皮上。百壯。下痛者。灸至痛痛者。灸至不痛。用手

摩之。風蟲牙痛

槐樹白皮一握。切以酪一陰下溼痒。槐白升。煮去滓。入鹽少許。含漱。

煎水

痔瘡有蟲作痒。或下膿血。多取槐白皮濃煮汁。先日洗。瘡熏後洗。良久。欲大便。當有蟲出。不過三

度。即愈。仍以皮為末。綿裹納下部中。

蠅螬惡瘡槐白皮醋浸半日洗之。

槐膠主治一切風化涎。肝臟風。筋脉抽掣。及急風口噤。

或四肢不收。頑痺。或毒風周身如蟲行。或破傷風口眼偏斜。腰背強硬。任作湯散丸煎。雜諸藥用之。亦可水煮。

和藥爲丸。煨熱綿裹塞耳。治風熱聾閉。

槐耳

已見萊部

花

未開時採收。陳久者良。入藥炒用。染物以水煮一沸出之。其稠渣爲餅。染色更鮮明。性涼。味苦。

主治涼大腸。清五痔。心痛。眼赤。殺腹臟蟲。及皮膚風熱。腸風瀉血。赤白痢。並炒研服。炒香頻嚼。治失音及喉痺。吐血。血衄。崩中漏下。

附方衄血不止

槐花烏賊魚骨等分。半生半炒。爲末吹之。

舌衄出血

槐花末傳之即

止。吐血不止

槐花燒存性。入麝香少許。研勻。糯米飲下三錢。

咯血唾血

槐花研每服

三錢糯米飲下。仰臥一時取効。

小便尿血

槐花炒鬱金煨。各一兩。爲末。每服二錢。淡豉湯下。立效。

大腸下血

七

集簡方用槐花荆芥穗等分爲末。酒服一錢。柏葉三錢。槐花六錢。煎湯日

服。袖珍方。用槐花枳殼等分。暴熱下血。洗淨控乾。以

炒存性為末。新汲水服二錢。炒槐花末。填滿札定。米醋炒。鍋內煮爛。搗丸。酒毒出血。

罌子大。日乾。每服一丸。空心常歸煎酒化下。新槐花炒研酒。槐花半生半炒一兩。山梔子。臟毒下血。服三錢。日三服。

或用槐白。婦人漏血。服二錢。食前溫酒下。血崩不止。皮煎湯服。

槐花三兩。黃芩二兩。為末。每服半兩。酒一盞。中風失。秤鍾一枚。桑柴火燒紅。浸人酒內調服。忌口。

音。炒槐花三更。癰疽發背。凡人中熱毒。眼花頭運。口乾。後仰臥嚼咽。舌苦。心驚背熱。四肢麻木。覺

有紅暈在背後者。即取槐花子一大抄。鐵杓炒褐色。以。好酒一盞。汗之。乘熱飲酒。一汗即愈。如未退。再炒一服。

極効。縱成膿者。亦無不愈。彭楊梅毒瘡。乃陽明積熱所。幸菴云。此方三十年屢効者。

炒。入酒二盞。煎十餘沸。外痔長寸。并用槐花煎湯頻洗。疔。熱服。胃虛寒者勿用。

瘡腫毒。槐花微炒。核桃仁二兩。無灰酒一鍾。煎十餘沸。

瘡腫毒。槐花微炒。核桃仁二兩。無灰酒一鍾。煎十餘沸。

熱服。未成者二三服。發背散血。槐花綠豆粉各一升。同炒象牙色。研末用細茶

已成者一二服。見效。一兩煎一盞。露一夜。調末三下血血崩。槐花一兩。櫻灰五錢。鹽一錢。水

錢傳之。留頭勿犯婦女手。三鍾煎。白帶不止。槐花炒。牡蠣煨。等分。為末。每酒服三錢。取效。

子。按太清草木方云。槐者。虛星之精。十月上巳日。採子。服之。去百病。長生。又。庾肩吾常服槐子。年七十餘。鬚

髮皆黑。目看細字。亦其驗也。古方以子。冬月入牛胆中。漬之。陰乾百日。每食後吞一枚。云。久服明目通神。白髮

還黑。有痔及下血者。尤宜服之。雷公炮製云。取兩子。三子者。槌碎牛乳浸一宿。蒸過用。性寒味苦。

主治疎導風熱。口齒風。涼大腸。潤肝燦。五內邪熱。止涎

垂。補絕傷。久服明目益氣。頭不白。延年。治五痔瘡。瘦以

七月七日取之。擣汁。銅器盛之。日煎令可為丸。如鼠屎

狀。納竅中。日三易。乃愈。治大熱難產。催生。吞七粒。并墮

胎殺蟲去風合房陰乾煮飲明目除熱淚頭腦心胸間
熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉治丈夫女人陰瘡
溼痒乳癰子臟急痛

附方槐角丸

治五種腸風瀉血糞前有血各外痔糞後

弩肉如爛各舉痔頭上有孔各瘻瘡內有蟲各蟲痔並

皆治之槐角去梗炒一兩地榆當歸酒焙防風黃芩枳

殼麩炒各半兩為末酒糊丸大腸脫肛槐角槐花各等

梧子大每服五十九米飲下

血蘸藥炙熟食之以酒送內痔外痔許仁則方用槐角

下猪腰子去皮蘸炙亦可

取地膽為末同煎丸梧子大每飲服十丸兼目熱昏暗

作挺子納下部或以苦參末代地膽亦可

槐子黃連二兩為末蜜丸梧子大熱心悶槐子燒末酒

大每漿水下二十九日二服

榆芽

又名零榆白者名粉處處有之有數十種今人不能
盡別惟知莢榆白榆刺榆榔榆數者而已莢榆白榆

皆大榆也。枝條生莢如錢成串，俗呼榆錢，可作羹，亦可
收至冬，釀酒，淪過晒乾，可為醬，即榆仁醬也。山榆之莢
名蕪荑，與此相近，但味稍苦耳。
荒歲人取皮為粉，食之當糧。

嫩葉作羹及燂食。消水
腫，利小便，下石淋，壓丹石。
時珍曰：晒乾為末，淡鹽水拌，或炙或晒乾，拌菜食之，辛滑

下水煎汁洗酒皸鼻。同棗仁等分蜜丸。治膽熱勞不眠
氣。

〔白皮〕性平。味甘滑利。主治利竅，滲溼熱，行津液，消癰腫。

除邪氣，大小便不通，腸胃邪熱，氣通經脈，滑胎，利五淋。

治齁喘不眠，搗涎傳瘡癰，小兒頭瘡，痂死生皮，擣和三

年醋滓，封暴患赤腫。女人妬乳腫，日六七易效。

〔附方〕斷穀不饑。
榆皮，檀皮為末，日服數合。齁喘不止。
榆白皮，陰乾，焙為末，每旦夜用

水五合，末二錢，煎如膠服。久嗽欲死。
許明則有効方，用厚榆皮，削如指大，長尺餘，納喉中，頻出入，當

吐膿血而愈。虛勞白濁榆白皮二升。水二斗。分五服。小便氣淋榆枝石燕

子煎水五淋澀痛錢榆白皮陰乾焙研。每以二錢。水五合煎如膠。日二服。渴而尿多

非淋也。用榆皮二片。去黑皮。以水身體暴腫同米作粥

一斗。煮取五升。一服三合。日三服。臨月三日墮胎下血不止。

食之。小臨月易產榆皮焙為末。臨月三日服方寸七。令產極易。

便良。榆白皮當歸焙各半胎死腹中或母病欲下胎。榆身首

兩入生薑水煎服之。生瘡塗之蟲當出。火灼爛瘡榆白皮五色丹毒俗名

犯者多死。不可輕視。以榆白皮為末。鷄子白和塗之。小兒蟲瘡榆皮末和猪脂塗

癰疽發背榆根白皮切。清水洗搗極爛。和香油傳之。小兒瘰癧榆白皮生搗如泥。封之。頻易。

者。將愈以桑葉嚼爛。隨大小兒瘰癧泥封之。頻易。

小貼之。口合乃止。神效。

兒禿瘡醋和榆白皮末

塗之。蟲當出。