

葉先生醫案總訂十二卷

此

痢

痺

便血

瘕瘕

脫肛

驚

痿

癰癩

臨證指南醫案目

卷七

痢

便血

脫肛

痿

痺

瘰癧

驚

癰

臨證指南醫案卷八

丁丑八月 若溪漫士臨本

蕭李太瞻附

古吳集 桂天士先生著 錫山鄒錦畹滋九全校

召銘新甫

衄

溫邪 衄血

連翹

元參

淡黃芩

黑山樅皮

杏仁

鬱金

風溫 衄血

丹皮

元參

連翹

赤芍

芫花

黑梔皮

濕熱
胃火
上蒸

某三此熟蒸於水穀之濕齕血歛衄衄穀如音治在陽明

熟地

知母

石膏

元參

牛膝

膽火
上升
心營

陳女常有衄血今夏忽起神識如呆診脈直上頂際大忌驚恐惱怒天癸得通可愈

尾角

丹參

元參

生地

連翹

知母

林二陽升鼻衄不止

細生地

烏犀角

炒知母

牛膝

黑山梔

川斛

丹皮

炒黑側柏葉

某

努力傷陽逆鼻動

犀角

二錢

細生地

三錢

炒丹皮

二錢

元參

一錢

炒牛膝

一錢

黑山梔

一錢

炒黑側柏葉

五錢

臨服沖鮮荷葉汁一小杯

陰虛
陽虛
趙十

脈左數。衄血火升。

生地

阿膠

天冬

麥冬

淡菜

生白芍

茯神

炒山藥

程

從前衄血都以養陰益氣而愈。知非官熱。皆勞役陽

冒以致陰血之動也。今壯年肌肉不充。身動氣促。如喘

口中膩涎濁沫。竟是腎精帶傷。收納失職之象。急急保

養。遠戒酒色。猶可向安。

當用生地

熟地

人參

黃肉

湖蓮

芡實

補骨脂

山藥粉丸

朱七脈數陰虧。陽升頭暈。心中煩雜。鼻衄。

生地

元參

金銀花

川斛

丹皮

石決明

某咳逆失音。衄血。

生地

龜板

丹安

牛膝

山藥

茯苓

某時發

生地

元參

丹皮

山藥

茯苓

澤瀉

黃柏

人中白

酒蒸
傷胃
其

食燒酒辛熱及青梅酸泄遂則血咳嗽心腹極熱五

味偏勝腑陽臟陰為傷此

陰和法

生白扁豆

北沙參

白糯米


治痢諸方
為案中景

醫書

血行清道從鼻而出古名曰衄與滿道之吐咯者不
司清道即指至高之分由山根以上清明之次而來
也其穴乃手足太陽足陽明陰陽蹻五脈之會及衝
脈交會其間可見諸經皆能為衄不獨肺胃而然諸

書雖已詳明惟景岳辨之尤切但創之爲患總由乎
火外爲六淫之變化內因五志之掀騰氣血日爲錯
亂陰陽爲之相乘天人交感之處虛實攸分矣若風
寒壅盛於經陽氣鬱而迫營者宜參麻黃桂枝症之
大意若溫風暑熱拂鬱而動血外溢者用辛涼清潤
等劑認定經絡之高下若火邪極甚而載血上泛者
有苦寒鹹寒之法審其原委之淺深此外因主治法
也至於煩冗曲運耗及木火之營肝臟厥陽化火風
上灼香甘鹹柔婉理所必需多勞過慾病及天一之
眞陽浮引陰血以冒上竅者滋潛厚味法從陰補血

脫則挽回元氣培陽則導火歸源四酒用和陽消歸
之劑因努力用培中益下之方此內因主治法也
老惟審內外兩因庶乎施治無誤矣



疝

其七疝治法最詳予和其旨辛香以泄肝得氣疎泄而
病緩矣。按法調理不愈。七味導引。紬腎益氣。升舉脾陽。
而墜氣仍然。艾炙蒸臍。原得小安。內經任脈為病。男子
內結七疝。女子帶下瘕聚。同為奇經主之。故疎泄諸方
能治氣實。參朮升補。僅治中虛下陷。與元海奇絲中病
無補。壯歲至老。病根不輟。下焦日衰。可知升陽一法。體
症頗合。衰年僅可撐持。勿使病加可矣。

生鹿茸

錢

鹿角霜

錢

當歸

錢

生菟絲子

錢

獨陰
疑聚
肝絡

沙糖漿一錢

川桂枝尖五分

飢時服

朱二

勞傷溫裏已效。臍旁動氣。小腹結疝。羣九偏寒。皆陽

一氣不自復。酒陰聚結。不宜急於育子。

當歸

能茴香

淡從蓉

枸杞子

安息香

茯苓

孫。疝墜於右。筋縮。連小腹。痛此寒主收引。議連溫通厥

陰之絡。

川棟子二兩

穿山甲二兩

炮黑川烏五錢

炒黑小茴香一兩

橘核二兩

乳香五錢

用老韭白根汁泛丸。飢時服二錢五分。

明 臍下小腹形象橫梗發必痛連脇腰以及陰囊此乃
厥陰肝氣不宣議以苦辛加左金佐通經脈之凝滯

川連

吳萸

穿山甲

青木香

金鈴子

延胡

青橘葉湯丸

郁 肝病絡虛氣聚小腹滯脹前用河間金鈴子散加牡
橘葉合酸苦辛勝法小效加食述飢則脇腹鳴盛而
濁氣下泄頗安乃絡虛不足中之有餘形質痼症不可
純攻

桃仁

當歸稍

炒小茴

橘核

郁李仁

南山查

茵白汁丸

謝五七痛皆肝少腹堅聚有形是閉塞不通之象自日久
恙血絡必傷古人治疝必用辛香助燥氣勝之品宜緩
商矣

歸鬚

杜牛膝根

小茴香

川棟子

穿山甲

栝子仁

然

脈右弦左瀉富臍痛連小腹已屬凝聚有形嘔吐黃

濁大便欲解不通若患處漉漉有聲痛勢稍減惟臥著
體不轉移其痛更加此屬肝氣疝瘕辛香流氣所稱通
則不痛耳

炒桃仁

炒橘核

金鈴子

炒延胡

韭白汁

兩頭尖

小茴

青皮

此通泄厥陰氣血方也。痛甚於下。濁結有形。非辛香無以入絡。非穢濁無以直走至陰之域。以子和方合

奏議意

施四

立冬前一日。寒戰後。熱屬厥陰。食鹽鹹寒。沉墜浮囊。大溲溺甚少。至晚腫脹愈加。顯然陽微濁聚。治從

分開泄冷溼

粗桂枝

吳黃

川棟子

枳實

生牡蠣

澤瀉

犀角皮汁十匙

跨脫

唐三

寒溼已入太陽之裏。膀胱之氣不利。陰囊墜腫。

疑帶

五苓散加獨活漢防已

筋抽

某

肝風筋抽怒勞致傷宜通補熄風

菴蓉

補骨脂

歸身

小茴

韭子

茯苓

胡桃肉

青鹽

羊內腎蒸熟和凡

奇脈

朱

動氣疝瘕遠眩汨汨有聲男子精氣不充是下焦損傷溫補勿過剛燥須察八脈以推病情

淡薤蓉

歸身

炒枸杞

小茴

炒沙苑

茯苓

紅棗肉

鬱怒

汪

自云鬱怒不已夏季忽起腹脹醫以快氣疎滯湯藥其脹竟入小腹下墜書筋外突脹甚延及腎囊乃肝疝

之症議子和法

歸鬚

橘核

青木香

青皮

小茴

黑山梔

青蘗管

周三六久勞怒肝木內震脇中少腹背肝脈逆行之厥氣
凝聚為脹聚久結形為癥瘕情懷鬱滯永不能痊以內
起情志不萌草木微功耳

炒小茴

黑山梔

川棟子

延胡

青木香

青皮

生香附

橘核

肝拉
犯胃

吳六味酸食不化湧吐逆少腹厥氣上冲下有宿疝以肝
濁攻胃經云食出完穀是無陽也