

傷寒論淺注補正

張仲景傷寒論原文淺註補正

目錄

卷首

傷寒淺註補正敘

傷寒淺註敘

長沙方小引

仲景原敘

淺註凡例

補正凡例

讀法補正

卷一上

辨太陽病脈證上計四十一節

附太陽方

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

白虎加人參湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯
甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

葛根湯

葛根加半夏湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

卷一中

辨太陽病脈證中計八十一節

附太陽方

桂枝加厚朴杏仁湯

乾薑附子湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

真武湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

桃仁承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝加桂湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

卷一下

辨太陽病脈證下計五十九節

附太陽方

抵當湯

抵當丸

大陷胸丸

大陷胸湯

小陷胸湯

文蛤散

白散

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

黃連湯

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

甘草附子湯

白虎湯

炙甘草湯

卷二

辨陽明病脈證計八十節
張本第七十八節七十九節今照古本兩節合為一節

附陽明方

大承氣湯

小承氣湯

豬苓湯

蜜煎導方

豬膽汁方

茵陳蒿湯

吳茱萸湯見下少陰方

麻仁丸

梔子蘗皮湯

麻黃連軀赤小豆湯

梔子豉湯見太陽

卷三

辨少陽病脈證計十節

附少陽方

小柴胡湯見上第三卷太陽方

卷四

辨太陰病脈證計八節

附太陰方

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

卷五

辨少陰病脈證計四十五節

附少陰方

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花湯

吳茱萸湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

通脈四逆湯

四逆散

卷六

辨厥陰病脈證 計五十五節

附厥陰方

烏梅丸

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

麻黃升麻湯

乾薑黃連黃芩人參湯

白頭翁方

卷七

辨霍亂病脈證 計十一節

四逆加人參湯

理中丸

通脈四逆加豬膽汁湯

辨陰陽易差後勞復病脈證 計七節

辨瘧瘵瘴暍脈證

燒裨散

枳實梔子豉湯

牡蠣澤瀉散

竹葉石膏湯

案內臺正方一百一十三道今少禹餘糧丸實一百一十二道也此上古相傳之方伊聖集為湯液經以治百病非為傷寒設也仲景得其書而神其用建安紀年以來憫族親之死於傷寒者十居其七遂屏去習俗傷寒方而以此方為救治遂以此名書其實非傷寒專方也今之病家一聞議及則曰傷寒論各方老醫相戒不可用况我非傷寒病乎心甚疑之疑而不服則可服而又疑則多事矣余故著醫病順其自然說於後

附識一道

附錄六首

傷寒論淺注補正卷二

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園淺註

男

蔚古愚
元犀靈石金校字

蜀天彭唐宗海容川補正

夔門鄧其章雲航參校

辨陽明病脈證

補曰內經云陽明之上燥氣治之燥者陽明之本氣也此氣在人則屬胃與大腸在天則屬申酉二辰申當坤方屬土酉當兌方屬金在四時當七八月為燥金用事之候蓋天地只是水火二氣化生萬物水火相交則蒸而為濕燥與濕反乃水火不交之氣也火不蒸水則雲雨不生水不濟火則露澤不降水不潤則木氣不滋而草木黃落火不蒸則土返其宅而膏脈枯竭究水火之所以不交則由於金性之收收止水火各返其宅故神名蓐收令司秋月草木枯槁水泉涸竭是為燥金用事之驗也其在一日則為申酉二時天地賴此燥氣所以戢水火之盈餘竭物產之精華而使之消息也人身稟天地之燥氣於是有胃與大腸二者皆消導水穀之府惟其稟燥氣是以水入則消之使出不得停於胃中西洋醫言胃之通體皆有微絲血管吸水出胃而走入連網西醫所謂連網即是隔膜乃內經所謂三焦為化

行水穀之府也。水出胃走入膈膜。然後下行而入膀胱。若胃之燥氣不足。則水停矣。西醫言食入則胃熱轉至。以腐爛之。西醫所謂熱。即燥氣也。水既出於胃中。而食物之質未盡化者。下行入小腸。以化液。其所剩糟粕。乃入大腸。然糟粕至此。尚有餘液。必得大腸燥金之氣。以收吸之。使餘液吸盡。出。往下集。去。訖。而糟粕乃化為堅糞。若大腸燥氣不足。則為溏瀉。此胃與大腸所以必有此燥氣。而後能消水穀也。然而燥氣太過。則又為結硬等証。必賴太陰之濕以濟之。內經言陽明不從標本。從中見之。氣化。正是賴中見太陰濕氣以濟其燥之義。仲景存津液。亦是此義。手太陰肺與手陽明大腸相表裏。位雖上下懸隔。然肺系之油網。下連膈膜。又下連版油。至下焦油網。則與大腸相接。肺津腴潤。注於大腸。則燥而不太過。足陽明胃與足太陰脾相表裏。位甚相近。以膜相連。胃中食物。化液歸脾。從膜中布達。乃生膏油。膏油者。脾之物也。膏油功用。上濟胃氣。下滋大腸。膏油之色。本帶微黃。故病能發黃疸。膏油透。出筋骨之外。則為肥肉。是名曰肌。邪在肌肉。循膏膜而入。則能內通於胃。胃有大絡。上通於心。西醫言胃中化液。有大管導之上行。至頸會管。遂與心之血管相會。西醫所謂管。即內經所謂絡也。絡言其絲條。管言絲條中之孔竅。胃絡通心。故胃中燥火入心。亂神。則為譫語。燥。

熱相合。胃家實。則譫語。舌上起芒。口乾燥。又以胃管上通口也。若燥屎在大腸。則為潮熱。應申酉金旺之時。而始從下潮上。也。其經行身之前。從面至腹。抵足。跌皆陽明經所行。臍下血室。有衝脈兩條。夾臍而上。至於喉間。是衝脈麗於陽明之部分。陽明胃中汁液化血。則下入血室。又血室一名氣海。臍旁所化之氣。歸於氣海。上出口鼻。亦必從臍旁循陽明之道路而上。是以衝氣亦能隨脈上逆入胃。陽明二字。或言取太少兩陽合併於人身之前兩陽相合。故曰陽明。然內經言陽明少陰。有司天在泉之說。是人身之陽明經。仍取大之陽明以為名也。在天以卯酉屬陽明。以卯酉為日月之門戶。且酉為日入。如周易明入地中之明。言陽明陽盛而竭。是以成其燥氣。陽明之氣必以下行為順者。金氣肅降。所以成化工也。各經皆有陽明之證。以水穀之海。而各經皆秉氣於胃也。讀者當會通焉。

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰。太陽陽明者。蓋以陽明之上。燥氣

陽之標熱。合陽明之燥熱。併於太陰脾土之中。脾之津液。為其所燥。而窮約所謂脾約是也。正陽陽明者。蓋以燥氣陽明之本也。天有

氣太過。無中見太陰濕土之化。所謂胃家實是也。少陽陽明者。蓋以少陽之上。相火發其汗。誤利其小便。則水穀

耗竭。而少陽之相火熾盛。津竭則胃中燥。火熾而實。則大便難是也。

傷寒論淺註補正 卷二 陽明篇

二

此一節言陽明有太少正之分也。

補曰太陽陽明者。從太陽肌肉而入內之膜油。脾主膏油。被熱灼而膏油枯縮。則腸亦枯澀。是為脾約。指脾之膏油收縮而言也。少陽陽明。是膜網與胃相通。膜網之水。外從腠理而汗下。從小便而泄。則胃中之水皆去。遂乾燥矣。此處提綱。即將膏油膜網與腸胃相通之迹。先行發明。則通篇變証可尋求矣。

何謂正陽陽明之為病。燥氣為陽明之本氣。燥氣盛於上。胃家實也。

此復申明正陽陽明之為病也。按沈堯封曰。此是陽明證之提綱。後稱陽明證三字。俱有胃家實在內。胃家實。言以手按胃中實硬也。如大陷胸證。按之石硬。即名實熱。梔子豉證。按之心下濡。即名煩虛。夫心下俱以濡硬分虛實。何獨胃中不以濡硬分虛實乎。此說與柯韻伯之論相表裏。雖非正解。亦可存參。

問曰。何緣得太陽陽明病。答曰。太陽之津液。從胃府水穀而生。患太陽病。若發汗。若下。若利小便。此皆亡之。胃中津

液胃中。無津液而乾燥。其太陽未解之邪熱。因轉屬陽明。其不更衣。腸內之實。腸內既實。其大便必難通。而者。此

名太陽轉陽明也。

此一節承上章太陽陽明病而言也。然重申胃家實之旨是陽明病之總綱。

正曰此承上太少陽明而言。淺註謂單承太陽不知仲景雖未提出少陽字面而若神小

便已承上文少陽條。即如太陽篇其干及少陽之證又何曾提出少陽二字。讀者當細玩之。

問曰有諸中者陽明病外證云何。答曰胃熱之外見者肌肉之中身熱與太陽之表熱不同也。

於外汗自出與太陽之自汗不同也。表寒已解故不惡寒。反惡熱也。因只有胃家實之病根即見熱盛汗

名曰汗自出。同也。表寒已解故不惡寒。反惡熱也。出之病證不惡寒反惡熱之病情內

外俱備方是陽明之的證。此一節補出陽明外證合上節為一內一外之總綱。

正曰身熱自汗與太陽正同。太陽之邪在肌肉則翕翕發熱。漸漸自汗出。肌肉即肥肉與

肉之膏油皆屬於脾胃故胃熱亦發見於肌肉而為身熱自汗與太陽同也。惟不惡寒反惡

熱是陽明燥熱之的証與太陽之惡寒不同。淺註不知肌肉之理是以畧差焉。

問曰身熱不惡寒既得病有始得之一日不發熱而惡寒者何也。答曰陽明主金氣金氣微寒

既入於肌肉之雖得之一日不待解惡寒將自罷。即自汗出而惡熱也。此陽明之

此承上文不惡寒反惡熱而言也。但上文言陽明自內達外之表證。此言風寒外入之表證。

問曰

陽明病未經表散其

惡寒何故自罷

答曰陽明與他經不同以其

居中土也

中土為萬物所歸故凡表寒裏熱之邪無所不歸

無所不化皆從燥而為實則

無所不化皆從燥而為實則

無所復傳

一日表氣通於太陽其

始雖

惡寒

而

二日

為陽明主氣之期正傳而邪亦傳正再傳而邪有所歸而不再

傳故

自止

此胃家實

為陽明病之根也

此復設問答以明惡寒自罷之故並指出胃家實之根也

過汗亡津液而轉屬陽明者固多而汗出不徹與不因發汗者亦有轉屬之證

本太陽病初得病時發其汗汗先出不徹其太陽表熱之氣不能隨

汗而泄而即與此轉屬陽明也

此外更有傷寒發熱無汗其時即伏胃

燥氣混為一家而轉屬陽明也

不和之病機嘔不能食發汗而反汗出

澀澀然者

水液外泄則

是

轉屬之外

轉屬陽明之證也

上文歷言陽明本經之自為病此復申明太陽轉屬陽明之義除過汗亡津液外又有此汗

出不徹而轉屬不因發汗而轉屬合常變而並言之也

三日為少陽主氣之期病固傷寒三日

現陽明

證而脈大

為邪歸中土無所復傳是

述自此以上六節論陽明之氣主表而外合太陽主裏而內關津液之義也按此即高士

宗所謂讀論者因證而識正氣之出入因治而知經脈之循行則取之有本用之無窮矣

陽明與太陰正氣相為繫傷寒陽明脈大浮而緩陽明身手足自溫是為陽明而繫在太陰太陰者表裏邪氣亦交相為繫傷寒陽明脈大浮而緩陽明身手足自溫是為陽明而繫在太陰太陰者

濕土也。濕熱相并。身當發黃。若小便自利者。濕熱得以下泄故不能發黃。至七日。日已過為八日。值陽明主氣之期。遂移其所繫而繫陽明。

胃燥則大便不硬者。此為陽明也。

此節合下節。明陽明與太陰相表裏之義也。

傷寒。由太陰而轉繫陽明者。其人不特大便澀然微汗出也。

此承上節而補言陽明之汗出。即上章所云外證俱在其中矣。

正曰。上是由太陽轉繫太陰。故曰脈浮。此節轉繫陽明。亦是由太陽而轉繫陽明。是從自

汗油膜中入胃。淺註言太陰誤矣。蓋此二節。正是明首章太陽陽明之義而已。

陽明不特與太陰表裏。而且與太陽少陽相合。陽明中風。不涉於本氣之燥化。而涉於少陽之熱化。故口苦咽乾。復涉於太陰之濕化。故腹滿微喘。大

於太陽之寒化。故發熱惡寒。陽明脈本浮大。以象陽明協於太陽。故脈浮。見大。而見緊。浮緊之脈。宜從汗以解之。若誤下之。陽邪內陷。於中止。

則運而腹滿。中土不增。少陽之三焦不能決瀆。復增出小便難。證之新也。

述。此言陽明之氣。不特與太陰為表裏。抑且中合於太陽。外合於少陽也。

正曰。此只申明少陽陽明證。脈浮而緊。是弦脈也。發熱惡寒。是少陽證也。口苦咽乾。是少

陽證也。惟腹滿微喘。兼在陽明。當借少陽而達於表。不可下腸胃。而引入裏也。少陽三焦司

陽明

本經患之

自天未嘗久留太陽經而化熱者
天自為風寒自為寒可於是辨

之風
若龍食名中風

以風能鼓動
陽明之氣也

不能食。名中寒。寒以

能閉拒陽明之氣也然此特初病則然久則為實滿等證雖能食者亦歸於不能食矣

會心於文字之外則得矣。

試論寒中

陽明病若中寒。

陰寒過甚不得本氣燥
熱之化則穀不消而

不能食。化水而不

亦便利

四肢為諸陽之本胃
陽虛而津液外泄故手足

澱然汗出此欲作

而大便仍不固

泄而仍不瘥

燥氣用事。

必大便初硬

寒氣用
事而

後半即澹所以然者以胃中

冷水穀不

能別故也

此言陽明中寒也。

補曰水穀不別四字。指出水從胃中即散出而走膜膈也。西醫所謂胃之通體有微絲血

管將水散出。內經所謂上焦為水之上源。即指水從胃中而散入膜膈也。胃中冷。即總論所

謂燥氣不足。合總論觀而水穀之治法明矣。

試論風中

陽明之中

風病兩

為陽土。風為陽邪。次陽相得。故初病時。谷

食即此可以定其為中風矣然病在陽明小便當利大便當硬今小便反不利大便

反自調。是津液尚還入於胃中。但不得少陰之癸水。以相合也。少陰主骨節。而不能上合於陽明。故其人骨節疼。且骨節合於肌肉之間。翕翕如有熱

狀。似此陽不遇陰。病難自解。乃奄然而發。然煩躁濈然汗出而解者。此少陰水之陰氣。不勝陽神之神氣。兩不相敵者。忽

而兩相與作汗。而共并。即戰慄汗。若轉連解之義也。脈而為緊則愈。蓋以緊則為陰。陰氣復而陽氣平。成癸合矣。

此言陽明中風也。

正曰飲食與大便自調。是陽明之穀氣勝也。小便不利。是太陽之水不化。其人骨節疼。是

太陽之身疼痛。翕翕如有熱狀。是太陽桂枝證之翕翕發熱。此乃太陽水中所化之氣。沸鬱

在肌肉間。皆太陽病。本未能解。惟賴陽明之穀氣勝。外合太陽。兩陽相併。是為重陽。內經云

重陽狂。故必奄然發狂。濈然汗出而解。仲景又自注曰。此為太陽水中所化之氣。不勝於胃

中之穀氣。而穀氣有權。得發於肌肉之間。與太陽之汗交并外出。故得解也。又注曰。脈緊則

愈。亦是太陽外閉。陽明內搏之脈。淺注以水為少陰癸水。以脈緊為戊與癸合。牽強之至。

陽明病欲解時。從申至戌上。

蓋陽明旺於申酉。病氣得天時之助也。然此言陽明之表證。出微汗而解。若胃家實之證。值旺時。更見發狂譫語矣。

此言陽明欲解之時。作一小結也。

陽明病。雖以胃家實為大綱。而陽明病。胃氣實則不能食。可以知其胃家之虛矣。醫者反攻其熱。則虛不受攻。治者當刻刻於虛寒上著眼。

人必噦所以然者胃中虛冷故也。此胃氣存亡之關頭。以其人胃氣本虛故攻其熱必噦。

此一節言陽明中氣虛寒之為病也。

補曰此言胃氣虛冷無燥屎雖有身熱之陽明証亦不可誤攻其胃非胃有燥屎而不可

攻也。淺註必扯胃家實為言反添葛藤。

胃氣虛則不能輸陽明病脈宜大遲。是經脈不能稟氣於胃也。內經云食氣入胃濁氣歸心。淫精氣於經脈。陽明病脈而反遲於脈。脈氣流經可知。食氣散於各經之中。自不厭其飽。若不

能散達止留食難用飽飽則濁氣歸心不淫於微煩不但此也且不下頭眩不能循必見小便難

滯於胃故上下不行則留此欲作穀疸。黃疸雖已下之而腹滿如故所以然者以胃虛不能滯於中為腹滿此欲作穀疸病也。下之而腹滿如故所以然者以胃虛不能滯於中為腹滿此欲作穀疸病也。

此一節言食氣入胃胃虛不能淫精於經脈也。

正曰小便難不是經脈所司乃三焦膜網所司也。膜網不清利穀又不化則壅滯難發遂

為黃疸。修圓不知陽明病三字是言身熱本屬陽証不知脈遲是言陽証見陰脈不知食難

用飽是遲脈之胃虛冷身雖熱而胃則不熱也。不知飽則微煩是胃結通心食停則心氣阻

遏故煩也。穀疸二字穀是病在胃疸是病在膜。淺註乃扯經脈為解豈不悞哉。

胃氣虛則不能輸精於皮毛。陽明病法當多汗。今反無汗其身瘡如蟲行皮中狀者此以胃氣久虛不能輸精於皮毛。