

竹林文集論語目錄卷三

保產上總目

保產總論

附胎

產室

檢火

試劑

脈試

睡是妙藥

忍戒

漫麻益

臨產宜飲食

臨產禁忌卦

正產

胎產

附產

坐產

竹林女科證治目錄卷三

保產上總目

保產總論

滑胎

催生

產室

穩婆

弄痛

試痛

脉訣

臨產宜正卧

睡是妙策

忍痛

惜力

慢臨盆

臨產宜飲食

臨產貴運動

臨產禁巫邪

正產

難產

橫產

倒產

坐產

偏產

礙產

盤腸產

熱產

凍產

驚產

傷產

臨產服藥

臨產安慰

臨產血暈

交骨不開

胞衣不下

膀胱落下

子宮脫出

損破脬胞

產門不閉

產後調護

產後禁忌

乳少

乳出

吹乳

妬乳

乳癰

乳巖

盤腸產治

產後舌不收

產後乳懸

產下肉線

子母蟲

腸癢

產後身冷

兒枕痛

惡露不下

保產下總目

產後總論

血塊作痛

產後調治

惡露不下

惡露不止

外感發熱

火證發熱

陰虛發熱

氣虛發熱

乍寒乍熱

太陽感風

少陽感風

陽明感風

厥陰感風

少陰感風

風寒發厥

產後中風

虛極生風

咳嗽

喘促

羸勞

產後發瘕

鬱冒

血暈

血脫

虛汗

頭痛

脅痛

心腹痛

臍腹痛

心痛

遍身痛

腹痛

腰痛

腿痛

四肢麻痺

脚氣

失音不語

狂言譫語

驚悸

吐衄

嘔吐

消渴

霍亂

泄瀉

泄痢

淋瀝

浮腫

小便不利

小便尿血

大便閉結

大便下血

附保產黑神丹

竹林女科證治卷三

保產上

保產總論

生產一事造化自然之理本古今常事而人人認爲難事時至自生不必憂疑而人人抱乎憂疑者總由此理未明也造化原不令人難生人多不知調攝因而難生造化原不令人逆生人多慌忙逼迫因而逆生難逆兩端關係二命倘平時不知講求則臨產必至誤事爲夫君者宜於平時家中談論令婦女習聞

知熟有孕知調護臨產有主張不慌忙無疑懼自無
難產之患以受胎後論卽不能如古人胎教凡可禁
忌者詳見安胎上卷亦宜省悟以臨產時論胎至十月形完
氣壯手足必動動則母腹必痛痛急則胞衣必破子
自出胎而生苟不耐耐順時見其腹痛半日一日不
產卽謂難生不知是胞衣未破子未出胎若不耐耐
催其速生一催之間因多誤事故臨產切不可慌張
卽一二日三五日無妨總宜安心定氣任其自然勉
強忍痛進其飲食要坐則坐要行則行要睡則睡莫

聽穩婆逼迫用力太早自己亦勿求速旁人亦勿多
言驚慌恐懼以亂其心時至自然分娩

滑胎

滑胎之法惟欲其坐草之期易而且速而難易之由
則在血之盈虛不在藥之滑利蓋血多則潤而產必
易血虧則澇而產必難故未產之前但當培養氣血
而預爲之地如四物湯滑胎煎五福飲小營煎八珍
湯卽皆滑胎之要藥若不知此而過用滑利等藥或
產期未近無火無滯而妄用清火行氣之劑多致血

虧氣陷反爲臨期大害若果肥盛氣實者則紫蘇飲
保生無憂散皆可擇用

四物湯

熟地黃

當歸 各三錢

川芎 一錢

白芍 二錢

水二鍾煎七分服

滑胎煎

當歸

熟地黃 各三錢

山藥 薑汁炒

杜仲 炒各二錢

枳殼 麩炒

川芎 各七分

水煎食前溫服氣體虛弱加人參白朮 蜜炙各便

實多滯加牛膝錢一

五福飲

人參隨宜

熟地黃

隨宜當歸二錢

白朮蜜炙

炙甘草各一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

小營煎

當歸

熟地黃

白芍

山藥

薑汁炒

枸杞子

各二錢

炙甘草

一錢

水煎食遠溫服

八珍湯

人參

白朮

蜜炙

茯苓

熟地黃

當歸

白芍

川芎

炙甘草各一錢

薑棗為引水煎服

紫蘇飲

大腹皮

川芎

白芍

陳皮

蘇葉

當歸

各一錢

人參

炙甘草

各五分

薑三片水煎服

一方有香附無人參

保生無憂散

當歸

川芎

白芍

乳香

去油研

枳殼麩炒

南木香

血餘

各等分

水煎服

催生

催生之藥原因婦人難產不得已而用之也若平素易產者時至自生不必服藥如必欲服求其快便須待產婦腹痛必至腰痛已甚方是欲產之候始可用藥順勢推之自當立下若只腹痛未甚兒身尙未欲生切不可早服催生之藥強其速生使兒身不能轉胞則橫生倒產必不免矣是故生無可催也所謂催生者不過助其氣血而利導之耳然必待臨產腹痛已甚方可用脫花煎少加肉桂分五七爲最穩最妙或

程日久產母困倦難生俱宜服滑胎煎以助其氣血
使之速生若氣虛無力艱於傳送者必用獨參湯接
濟其力皆為催生要法若期未至而妄用行氣導血
之劑以為催生亦猶擾宋人之苗耳

脫花煎

苗歸

七八錢
或一兩

肉桂

川芎

牛膝

各一二錢

旱前子

一錢
五分

水二鍾煎七分溫服氣虛加人參二

錢 陰虛加熟地黃

三五錢

滑胎煎

當歸

熟地黄

各三錢

山藥

薑汁炒

杜仲

炒各二錢

枳殼

麩炒

川芎

各七分

水煎食前溫服氣體弱

加人參白朮

蜜炙各二錢

便實多滯加牛膝

錢一

獨參湯

人參

二兩去蘆

水煎濃汁乘熱頓服頻頻服之補接氣力

產室

產室當令溫涼得宜若產在春夏宜避風產在秋冬

宜避寒故盛暑不可當風取涼以犯外邪又不宜熱

甚致令產母頭痛面赤亦不宜多人喧嘩驚慌熱氣

薰蒸若夏月宜儲涼水一盆溫則換之以解其熱若
冬月宜儲炭火一盆務令下體和煖衣被亦宜加厚
庶不爲寒氣所侵可免胎寒血滯難產之患且產後
胎元旣落氣血俱虛感邪尤易故不可以不慎

穩婆

產婦臨盆必須聽其自然不宜催逼安其神志不使
驚慌直待瓜熟蒂自落矣故用穩婆必須擇老成忠
厚者預先囑之及至臨盆務令從容靜鎮不得用手
法催逼世之穩婆催逼有二有不知時候惟恐後時

者有急完此家復往彼家者每因勉強試湯分之搯
之逼之使下多致小兒頭身未順而手足先出或橫
生或倒產爲害不少若痛陣未緊眼無金花手指中
節未跳動產門穀道未挺迸切不可令其坐草又或
有生息不順及雙胎未下之類俱宜穩密安慰不可
令產母聞知恐驚則氣散愈難生下又有一等詭詐
奸滑穩婆故作哼訝之聲或輕事重報以顯己能以
圖厚謝以致產婦驚疑爲害不淺又有狡滑穩婆意
欲害人私以手指搯破胞衣者極宜預防總之全憑