

傷醫大全

瘍醫大全卷二十

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

胸膺臍腹部

自胸膺起至乳房臍腹脇肋止凡一切癰疽等毒皆稟於此部中以便檢閱參法

附錄之拍東陽和同錄

甘疽

甘疽門主論

靈樞云甘疽發於膺

膺胸兩旁為起亦謂之臑

色青其狀如穀實瓜藪常苦寒熱急治之去其寒熱不急治十日

死死後出膿

心法曰此疽生於乳上肉高聳處屬肺經中府穴之下無論左右皆由憂思氣結而成

胸發



胸發門主論

申斗垣曰胸發發於玉堂

穴在紫宮下一寸六分又名玉英

膺中

一名元兒穴在玉堂下一寸六分兩乳間

中庭

穴在膺中下一寸六分

鳩尾

穴在蔽骨

之端言其骨垂下如鳩形故名

前蔽骨下一寸是也

等穴皆任脈之絡名陰脈之海乃人身之子午也急

早內託防毒歸心傷膜者死

啟玄

汪省之曰中庭疽在乳之中央任脈之經

理例

薛立齋曰胸發生於正胸堂去結喉三寸與心窩不遠乃手足六經交會之所其患最凶喪人性命

宜速治若三四日失治則皮開肉裂甚可畏也若使長大百不救一宜用牛黃熊胆研細香油調塗

四邊弦上以免開花如痛用乳香沒藥為末鋪粗紙內外以青布片捲好蘸清油點着在瘡四圍照

之痛自止矣內服清熱護心祛毒鎮心湯劑若開花穿穴神仙莫救

肺疽



肺疽門主論

申斗垣曰肺疽即天火瘡乃任脈之經當胸而生在紫宮玉堂之穴十日可刺膿水黃白色者可治

如無膿漸大傍攻上硬下虛自破流水不絕咳唾引痛者死

啟玄

腫中疽

腫中疽門主論

王肯堂曰：腫中疽生心窩上兩乳中間，屬任脈經。腫中穴蓋腫中為氣之海，氣所居焉。能分布陰陽，若臟腑陰陽不和，七情不平，則發此證。稍遲則潰爛惡證多者難治。準繩



井疽

井疽門主論

靈樞云：發於胸名曰井疽，其狀大如豆，三日起，不治下入腹，不治七日死矣。

王肯堂曰：心窩生疽，初起如黃豆，肉色不變，名曰井疽。又名穿心冷癰。若冷氣攻心，精神恍惚，嘔吐冷痰，惡聞食臭，毒氣內陷，腹脹滿者不治。若心躁如火，肌熱如焚，不時盜汗，唇焦舌乾，黃色渴飲冷水者，是正候也。準繩



申斗垣曰井疽又名心漏疽又名穿心毒最為難治有經年不愈者乃多食生冷死厭之物惡毒積久內犯心包絡故外發於心掩也乃心胃兩經受證治同癰疽法

啟玄

汪省之曰井疽乃任脈之經在鳩尾穴狀如大豆三四日間若不早治十日必死外發者生內陷者死

理例

心漏



心漏門主論

陳遠公曰有胸間生瘡因不慎酒色致成漏竅生數頭流血久則形神困憊腰痛難伸行同僂僂人以為心漏也誰知乃腎虛成漏乎夫心腎本相通也心氣必得腎氣以相生腎氣必得心氣以相閉心漏之成成於腎氣之泄也安可不急治腎氣之衰乎然治腎而心氣不閉則補腎先益蓋有出氣而无止氣耳或云漏瘡多成於濕熱今補腎而不閉心竅則漏不愈閉心竅而不去濕熱只治心腎漏亦不能愈也然漏亦不同漏在他處者可泄其濕熱在胸間者不可泄濕熱也蓋漏既成於腎虛腎虛則寒而非熱也腎虛者腎水虛而非邪火盛也補真陰而邪水自消溫腎寒而濕熱自退耳用溫腎丹鹿茸二具附子二枚人參青鹽各二兩瓦松二枝紅棗四兩煮棗搗丸每空心酒下三十丸服半月腰疼少減服月餘而漏愈矣

冰腦 此方奇在鹿茸鹿茸此能益腎中之水火更能補心中之缺

竅青益者誠以較堅也。漏多孔竅流血必多。血得益則止也。死松者消濕熱於死形。心漏雖非濕熱。然未可少有留存。則孔竅難塞。故兼用之以防其變。又恐氣虛不能運化。加參以生氣於心腎之間。助茸附之力。通達上下尤易成功也。

馮魯瞻曰：胸前有一孔常出血。水名曰心漏。用嫩鹿茸去毛酥炙。附子炮去皮臍。鹽花共為細末。棗肉為丸。每服三十九。空心酒下。兼治腎虛腰痛如神。錦囊

赤膈類傷寒門主論

凡胸膈赤腫疼痛。頭疼身痛發熱惡寒。此名赤膈傷寒。宜荊防敗毒散。加瓜蒌子、黃連、黃芩、紫荊皮、元參、赤芍、升麻、白芷。如症有表復有裡。胸膈赤腫疼痛者。防風通聖散。加黃連、瓜蒌子、紫荊皮。如表症已退。大便燥實。胸膈腫痛者。涼膈解毒。如瓜蒌子、枳殼、桔梗、紫荊皮、赤芍。又宜稜針刺腫毒出血。如半表半裡。胸膈腫痛者。柴胡枳桔湯。加瓜蒌子、紫荊皮、赤芍。

小兒龜胸門主論

龜胸者。胸高脹滿。形如覆掌。多因乳母酒麵五辛無度所傷。或夏月煩燥熱乳宿乳。與兒蓋肺氣最清。為諸臟華蓋。水氣泛溢。肺為之浮。日久痰滯。則生風熱。一觸諸辛。肺氣昏亂。是以脣紅面赤咳嗽喘促。溼瀉蒸熱。由此而成。疳由疳而成。龜背矣。如藥後而復作。傳變目睛直視。痰涎壅上。或發搐者難治。

脾發疽



脾發疽門主論

王肯堂曰脾發疽生心窩下兩傍屬脾經食實六無論左右皆生由多食煎炒醉飽入房以致毒聚脾經而成稍遲則潰傷脾膜膿如蟹沫者死服藥而嘔飲食不進者死準繩

心法曰此疽因過飲辛熱藥酒積火成毒亦生

胸前蜂窠發



胸前蜂窠發門主論

申斗垣曰蜂窠發在胸乳間或左或右或雙發在或中穴在胸府下一神藏穴在或中下靈墟穴在神藏

下分一寸三穴乃足少陰腎經所主心熱甚急宜內託疏心火其症心懸若飢飢不能食舌乾咽腫歸心則死啟玄

枯筋箭門主論

陳寶功曰枯筋箭乃憂鬱傷肝肝無榮養以致筋氣外發初起如赤豆大枯點微高日久破裂攢出筋頭蓬鬆枯槁多生胸乳間者是也宜用藥絲線齊根繫緊七日後其患自落再換珍珠散其疤自收兼戒口味正宗

乳癰

乳癰門主論



陳遠公曰有乳上生癰先疼後腫尋常發熱變成瘍癰此症男婦皆有之而女人居多蓋女人乳兒之時偶爾貪睡兒以口氣吹之使乳內之氣閉塞不通以至作痛即以解散藥治之隨手而愈若因循失治而乳癰成矣唯男子則不然乃胃火熾盛不上升於口舌而中壅於乳房乃生此症故乳癰乃陽症也不比他癰有陰有陽治法不必分陰陽但分先後為虛實耳蓋乳癰初起為實邪久經潰爛為正虛然邪之有餘仍是正之不足於補中散邪乃萬全之道不必先攻而後補也用和乳湯銀花粉各三錢當歸蒲公英各一兩生甘草二錢川山甲一片土炒為末水煎服一劑乳房通腫消不二劑也此方以貝母花粉消胃中壅痰痰壅而乳房不通今化其痰則胃火失勢後以公英山甲解熱毒利其關竅不攻自散恐藥過於迅逐加歸甘草補正和解正既无傷邪火毒不致變為乳巖也

冰鑑

陳寶功曰婦人平日不善調養以致胃汁濁而壅滯為膿名曰乳癰

宗正

又曰亦有憂鬱傷肝肝氣

滯而結腫成癰者宜逍遙散加橘葉散之

又曰亦有暴怒傷肝肝火妄動結腫者橘皮湯散之馮魯瞻曰婦人之乳男子之腎皆性命之根也人之氣血周行先聞寅時始於手太陰肺經出於雲門穴穴在乳上丑時歸於足厥陰肝經入期門穴穴在於乳下出於上入於下肺領氣肝藏血乳正

居於其間也其足陽明之脈自缺盆下於乳又衝脈者起於氣街並足陽明夾臍上行至胸中而散故乳房屬足陽明胃經乳頭屬足厥陰肝經婦人不知調養有傷衝任且忿怒所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行陽明之血熱甚或為風邪所客則氣壅不散結聚乳間或硬或腫疼痛有核乳汁不出名曰妒乳漸至皮膚焮腫寒熱往來謂之乳癰風多則硬腫色白熱多則焮腫色赤不治則血凝氣為壅滯而與乳內津液相搏腐化為膿治之之法凡初起寒熱焮痛即發表散邪疏肝清胃速下乳汁導其壅塞則病可愈若不散則易成膿宜用托裡若潰後肌肉不生膿水清稀宜補脾胃若膿出反痛惡寒發熱宜調榮衛若晡熱焮腫作痛宜補陰血若食少作嘔宜補胃氣切戒清涼解毒反傷脾胃也

錦囊

又曰有因婦人所乳之子膈有滯痰口氣焮熱含乳而睡熱氣吹入乳房凝滯不散遂生結核若初起時惡痛揉軟吮去乳汁即可消散失此不治必成癰腫亦有因小兒斷乳後不能回乳或婦人乳多嬰兒少飲積滯凝結又或經候不調逆行失道又有邪氣內鬱結成癰腫初起時切勿用涼藥蓋乳本血化不能漏泄遂結實腫乳性清寒又加涼藥則陰爛宜也惟涼藥用之既破之後則佳如初發時宜用南星薑汁敷之可以內消更加草烏一味能破惡血逐塊遇冷即消遇熱即潰更加乳香沒藥以定痛內則用瓜萋十宣散通氣散間服之然年四十已下者治之多瘥以氣血旺故也五十以上慎勿治之多死以天癸絕也不治自能終其天年若欲加治惟調氣血為主 又曰若鬱怒肝火熾盛為腫為痛者自當疏肝散鬱兼以養血和血則肝陽不强而腫自退若鬱結彌甚血滯不舒更由乳汁壅積潰而成膿則為乳癰矣氣血大傷尤宜重為滋補少佐疏肝解毒若端事清解則潰者難膿而膿者難長矣

胡公弼曰婦人乳有十二穰始生乳癰祇患一穰膿血出盡又患一穰逐穰輪流傷至七穰即傳次

乳次乳患遍則危而不救者多矣初起每早服元壽丹可保餘穰不受傳毒毒又曰憂怒傷肝肝氣滯而結腫者初起必煩渴嘔吐寒熱交作腫痛疼甚者牛蒡子湯主之厚味飲食暴怒肝火結腫者橘葉湯主之又曰男子乳頭屬肝乳房屬腎女子乳頭屬肝乳房屬胃又曰不乳兜婦人患乳名曰害乾奶子

陳實功曰乳房屬陽明胃經所司乳頭屬厥陰肝經所主多血少氣有乳之婦名曰外吹懷孕之婦名曰內吹正宗

汪省之曰如懷孕八九個月患內吹乳雖膿出腐脫肌生必待分娩而後始能收口理例

申斗垣曰胎氣旺而上冲致陽明乳房作腫名曰內吹又名裡吹奶啟玄

馮魯瞻曰乳癰者俗呼曰吹乳吹者風也風熱結泊於乳房之間血脈凝泣焮痛脹潰稠膿湧出此屬胆胃熱毒氣血壅滯又名乳癰為易治用青皮疏厥陰之滯石膏清陽明之熱甘草節解毒而行汚濁之血荆防散風而兼助藥達表瓜蔓沒藥青橘葉皂刺銀花土貝母當歸及酒佐之无非疏肝和血解毒而已加艾隔蒜灸二三十壯於痛處最效切忌刀針傷筋潰脈為害不小錦囊

澄曰更有寡婦並死兒女吃乳而乳房或腫焮痛者此為席風呵奶當同乾奶治法

陳自明曰懷孕患乳曰內吹乃胎氣旺而上冲致陽明乳房作腫宜石膏散清之亦可消散遲則遷延日久將產出膿乳汁亦從膿竅流出其口難完精要

心法曰內吹者懷胎六七月胸滿氣上乳房結腫疼痛若色紅者因熱盛也如色不紅者既因氣鬱且兼胎旺也外吹者乳母肝胃氣濁更兼兜吹乳睡熱鼻孔涼氣襲入乳房與熱乳凝結腫痛令人寒熱煩躁口渴又有內未懷胎外死哺乳而生腫痛者係皮肉為患未傷乳房此肝胃濕熱凝結也

乳癰門主方

鹿角散 治乳癰初起結腫疼痛增寒發熱但未成膿者 鹿角尖三寸用炭火煨稍紅存性研末

每服三錢食後熱酒一茶鍾調服甚者再服必消或以生鹿角尖剉細末生酒沖服三錢立消

又方 馬齒莧一把洗淨同皮硝搗爛敷上即刻止痛如死鮮者可於端午連根採收亦可

灸乳腫妙方 正 治氣惱勞傷或寒熱不調乳內忽生腫痛 用盃一隻內用粗燈草四根十字排

勻盃內燈草頭各露出寸許再用平山粗紙裁成一寸五分闊紙條用水濕貼盃內燈草上紙

與盃口相齊將盃覆於腫乳上留燈草頭在外將艾大圓放盃足底內點火灸之艾盡再添灸至

盃口流出水氣內痛覺方止住甚者次日再灸一次必消

錦囊新定消乳癰神效方 馮氏 金銀花 二兩 蒲公英 一兩 甘草節 三錢 沒藥 二錢 當歸尾 六錢 水酒各三盃

煎一盃食後服渣再煎絞汁服 又方 葛稚川 人牙齒燒存性研極細酥調敷

究原五物湯 外科集驗 乳癰癰疽發背立止疼痛 瓜蔓 一枚 皂角刺 生 沒藥 各五錢 乳香 甘草 各二錢

錢五 酒三盃煎取二盃時時飲之

元壽丹 張涵 乳癰初起即消已潰可保餘癰死恙 龜殼 去牆版不用止用 研細末熱酒調服

二錢儘量飲醉即愈

芙蓉膏 治乳癰發背癰疽拔根止痛斂口 芙蓉花搗如泥若死花取根用竹刀刮去粗皮只用

內嫩白皮搗如泥入蜜少許調勻如未穿即敷四圍中留一孔透氣如已潰即填入瘡口其膿根

自然湧出俟膿盡再上乾膿散

乾膿散 凡毒膿汁久出不已者用此糝之乾膿斂口 海螵蛸 天竺黃 飛血丹 炒紫 輕粉 二錢

麝香

二分五厘 真降香老節

錢三 共乳極細乾摻瘡口不數日膿即乾矣

乳癰初起

生

活鯽魚背脊肉和燕飯搗如泥敷上即散

乳癰

穿山甲

兩炒二青皮三兩

研細末用熱酒調服三錢另飲酒儘量被蓋取汗即消

乳癰初起但未成膿者皆消

用大盃盛醋半盃以白石蛋大一塊燒紅淬醋內二三次以醋熱為

度即將患乳浸入醋內冷則再燒再淬再浸三次即消

乳癰爛見心者

貓腹下毛乾鍋內煨存性為末乾摻或清油調勻入輕粉少許搓之

乳癰潰爛兩三指大者葱汁半酒盃牛皮膠一兩切片隔水頓一伏時以膠老為度乘熱納入潰

處以桑皮紙貼之如內膿未盡自然脫下仍如法乘熱納入倘粘緊不脫即不須又換聽其自落

則肉已長足收口矣寶之

神效瓜蔓散

集外科驗

治乳癰乳疽奶勞

川當歸

酒洗去蘆焙切

生甘草

各五錢

滴乳香

去油另研一錢

苦瓜蔓

子多者一

個去皮焙為末如急用只酒研爛

明沒藥

去油另研二錢五分

死灰酒三升同藥入銀石器中慢火熬取一升清汁分為

三服食後服之如奶勞便服此藥杜絕病根如毒氣已成能化膿為黃水如毒未成即內消甚者

再服以退為度治乳之方甚多獨此一方神驗萬死一生

消乳癰神方

大當歸

一枝洗去泥

生黃耆

三錢或五錢

蒲公英

四兩

金銀花

四兩

甘草節

五錢

酒水同煎三大盃

渣再煎服以一日夜服盡自消應試應驗

乳癰未成即散已成即潰立刻止痛神效死比名橘香散

陳皮

去白淨

麝香

一分

研細酒調服二

錢被蓋出汗

乳癰初起二三日立消天下第一仙方

活鯽魚一尾連頭骨生搗極爛香臘糟一小團再研勻敷

上一日待消小即取下不消再貼如神

乳癰

周蘭仙方

苦底蔓

兩箇每箇入酥炙穿山甲一錢人弱者用五分粉甘草六錢裝入衣內

用好酒二觔水二觔同煎至一大盃

臨臥熱服渣搗爛再用酒水各一觔煎服將渣乘熱數滿乳上用布捆住蓋破出汗无不立愈不

論已破未破只用一服神效無比

驗方

陳原缺

末無反酒調服醉自消以渣敷之自消

澤菱湯

澤蘭葉

兩白菱三錢

水煎沖酒服取汗自消

又方

生半夏一個研細葱白一寸連鬚

搗丸如蓮子大絲綿包裹左乳塞右鼻孔右乳塞左鼻孔睡醒自消

又方

兔耳一枝箭州出徽

煎酒服自消

又方

鮮蒲公英搗汁沖熱酒服取汗渣加酒糟搗敷乳上自消

又方

舊

芭蕉扇燒存性研末酒調自消

又方

生兒角子七粒熱酒吞下即消

又方

王岐

治乳汁

不通閉塞並成乳癰

瓜蔓

一個

穿山甲

炒

歸尾

酒

乳香

沒藥

甘草節

如成乳癰即以渣敷乳上用長布裹之經宿自消

又方

蒲公英

錢五

當歸

王不留行

甘草節

生黃耆

各二錢

金銀花

三防風

川貝母

白芷

天花粉

各一錢

乳香

沒藥

加香橙葉十片水煎沖酒儘醉取汗自消

又方

金銀花

蒲公英

各一錢

酒水同煎服以

渣乘熱敷腫上即思睡睡醒自消並治蛇頭疔神效

又方

用葱一握連鬚搗爛作餅置患乳

上以磁磬口茶盃盛熱灰覆葱餅上覺熱氣入裏汗出自消

又方

兩頭尖

即雄光

七粒或十

三粒研末沖酒服即消

又方

陳皮

去白

甘草

錢一

酒水同煎凡痛極不可忍者服之即止

又方

白芥子

一兩炒

白酒沖服盡量飲自消

又方

海螵蛸細末三錢

酒煎儘量飲出汗

自消

又方

赤小豆

三合用酒研爛去渣溫服留渣敷之自消

又方

生螃蟹脚尖陰陽瓦

焙研三錢酒調儘量飲醉蓋被取汗自消 又方 金銀花 當歸各二錢 蒲公英三錢 乾葛一錢五分

酒水同煎食後服再以酒助取汗自消 又方 蒲公英 金銀花 鹿蔥花根淨洗防風

酒水同煎空心服出汗自消 又方 生半夏 乳香去油各等分 研細左乳吹右鼻孔右乳吹左

鼻孔自消 又方 羊角尖刀刮末每服一錢酒調服自消 又方 黃花菜金銀花各等分酒

煎服自消 又方 青皮天花粉各五錢酒煎服自消 又方 兒茶刺地海蛤粉各等分 研勻

熱酒調服以手揉乳自消此方只治外吹 又方 苦瓜萆一二枚連皮穰子切碎酒煎頻服自

消 又方 鮮蒲公英連根帶葉二兩搗爛酒半斤同煎數沸熱服渣敷腫上蓋睡一時許再用

連鬚蔥白煎湯一茶盃催之得微汗自散此方用之鄉村偏僻無藥之所極妙亦且簡便 又方

山查核研末每服三錢瓦灰酒調服初起不過一二服成餅者四五服自消 又方 蒲公英

三錢 金銀花二兩 酒水同煎熱服取微汗睡醒即消渣敷患上 又方 螃蟹去足燒灰存性研末

每服二錢黃酒調服 又方 半枝蓮柔細草三月間生田埂上近水邊尋之可得開紅花嚴

為捷徑宜多採取 搗汁沖熱酒服渣敷患上神效

乳吹已成 瓜萆一個 明乳香二錢 酒煎服

香附餅 消乳吹並敷一切癰疽 香附一兩麝香二分 研末以蒲公英二兩酒煎濃汁調敷 又方

玉簪花根加鹽少許共搗如泥初起敷上自消已成敷之除膿完口 又方 生白菓八兩一

半用酒研服一半研敷自消

吹乳紅腫 白芷一兩爵金七錢研勻水調敷 又方 醋半盃頓滾入廣膠四錢鎔化加銀硃二

錢調敷

乳硬痛 當歸 甘草 沒藥去油各三錢 水煎沖酒熱服

山居婦人吹乳 桑樹蛀屑飯搗成膏敷之

乳吹結核不能消散腫痛者神效並治乳巖外科集驗 百齒霜即梳齒上油垢 圓如芡寔大黃丹為衣每服一

二圓熱酒吞下如不飲酒白湯吞之不可化開亦不可令病人知極有奇效 又方外科集驗 皂角

刺燒帶生 天南星 生半夏各二兩 白芷 直殭蠶焙 草烏各一兩 研細蔥汁黃蜜調敷

洗乳疼方氏寶 牡蠣煨一兩 五倍子錢五 枯白礬錢五分 水二盃煎洗

乳硬作痛 嫩桑葉左採者研細米飲調攤紙上貼之

吹乳 好醋半盃熬滾入牛皮膏五錢熬化敷上自消

吹乳 瑞香花二十一葉如瓦用葉二十一 同陳竈糖搗敷自消

乳吹 明礬研細一歲一厘用雞蛋一個開一孔將礬裝入蛋內飯上蒸熟去壳將蛋分作小塊瓦

反酒吞下自消

乳吹 鴨蛋一個去壳同燒酒攪勻蒸熟食之自消 又方 韭菜地上蚯蚓糞錢二 蔥子錢一 研細

醋調敷上乾則易之三次未有不愈者 又方 兩頭尖老鼠糞十三粒同蔥白搗爛熱黃酒沖

服蓋煖出汗即消已成膿將破者不效

驗方 小青皮一劬醋浸三次曬燥 磨細末水法為丸每服三錢木衣酒送下自消

驗方 馬桶垢陰陽瓦煨研細末蜜丸桐子大每服一錢木衣酒送下雖多年乳核服半劬亦消

又方 葫蘆巴焙研每服三錢木衣酒調即消 驗方 大樺皮一兩切片瓦焙存性 研細作一服用皂莢子七粒木衣酒煎一盃調服自消

數方 鮮水仙花根不拘多少同馬桶搗爛敷即消

消乳吹 程奇 兒角子七粒微焙研碎沖酒儘量飲醉出汗即消

消內吹乳 鯨魚鱗 係雜貨店賣者其形兩頭尖切去尖 用水煨爛搗化攤青布上貼之

乳瘡腫痛 芝蔴炒焦研細燈盞油調敷 又方 野茄根搗汁沖調服

乳癰 劉涓子 大黃 伏龍肝 各二錢 小鯽魚 一尾連鱗腸搗如泥 醋調敷定痛消腫

患乳立消法 一切乳症初起之時先用連根青菜煎水洗乳再將蒸酥店內饅頭茶鍾大一塊置

盆中隔水燉熟敷於浴過乳上再用糯米一合不用淘鍋內炒黃研細用无灰酒沖入與服被蓋

取汗無論輕重立刻即消 又方 鮑魚肚子瓦上炙脆研細沖无灰酒調服即消 又方 鹿

角尖磨汁敷之乳吹妬乳腫痛極作膿者自消

乳頭陷下門主方

兩乳頭陷頂 黃耆 蜜炙三錢 當歸身 葛根 升麻 黃柏 連翹 各二錢 牛蒡子 研 炙甘草 各一錢 上肉

桂 分五 水二鍾酒半鍾煎一鍾食後服

乳頭破裂門主論

心法曰乳頭屬足厥陰肝經如暴怒或抑鬱肝經怒火不能施洩是以乳頭破裂痛如刀刺或揩之

出血或流粘水或結黃脂治當以加味道遙散主之

乳頭破裂門主方

驗方 取秋後冷露茄子裂開者陰乾燒存性研細水調敷 又方 臘脂蛤粉研細敷之

乳衄門主論

乳頭陷下 乳頭破裂 乳衄 乳流 乳疳

婦女乳房並不堅腫結核唯乳竅常流鮮血此名乳衄乃屬憂思過度肝脾受傷肝不藏血脾不統血肝火亢盛血失統藏所以成衄也治當平肝散鬱養血扶脾為主

澄論

乳汁自流不禁門主論

馮魯瞻曰其有乳汁自出者若胃氣虛而不能斂攝津液者宜補胃氣以斂之若氣血大虛氣不衛外血不榮裡而為妄泄者宜調補榮衛以止之若未產而乳自出者謂之乳泣生子多不育若產婦勞役乳汁湧下此陽氣虛而厥也獨參湯主之

乳汁自流不禁門主方

十全大補湯 人參 於白朮 甘草 白茯苓 當歸 白芍藥 川芎 熟地黃 肉桂 黃

芪炙 姜棗為引煎服

乳疳



乳疳門主論

申斗垣曰有養螟蛉之子為无乳強與吮之久而成瘡經年不愈或腐去半截似破蓮蓬樣苦楚難忍內中敗肉不去好肉不生乃陽明胃中濕熱而成名曰乳疳

啟玄