

小兒科 痘症 麻疹

增輯
足本大字驗方新編

上海啟新書局
印行

驗方新編總目

卷一

頭部

面部

眉部

目部

耳部

鼻部

唇部

口部

舌部

齒部

鬚部

下頰

頸項

咽喉

卷二

肩部

手部

腋部

乳部

胸部

肋部

卷三

心部

肺部

各種氣痛

咳嗽

勞傷吐血

哮喘

卷四

脾胃

痰疾

三消

飲食積滯

噎膈

反胃 嘔吐 附

呃逆

卷五

肚腹

痞疾

蟲疾

鼓脹

脇部

背部

腰部

卷六

前陰

小便

淋症

遺精

卷七

後陰

大便

泄瀉

痢疾

脫肛

痔瘡

卷八

兩股

海底

腿部

足部

卷九

婦人科

調經

崩帶附

種子

胎前

產後

雜治

難產良方

卷十

小兒科

雜治

驚風

痘症

痲症

卷十一

癰毒

癰毒諸症

癰毒雜治

癰毒諸方

陰疽

陰疽治法

陰疽諸症

陰疽諸方

陰疽治驗

內外備用諸方

卷十二

急救

凡吊頸割喉腹破腸出溺水凍死雷擊痰厥氣閉一切急症皆在此內

解救諸毒

誤吞諸物

烟酒醉傷

卷十三

人畜蛇蟲咬傷

湯火傷

跌打損傷

刑杖傷

銅鐵竹木雜物入肉

卷十四

中風

筋骨皮膚病附

傷寒

感冒風寒

卷十五

中暑

痧症

霍亂

瘧疾

黃疸

瘟疫

蠱毒

卷十六

諸血

諸汗

邪怪

奇病

藥物備要

雜治

卷十七

咽喉

咽喉七十二症圖

卷十八

痧症全方

驗方新編卷十目錄

小兒科雜治

初生去毒開口法

保嬰各法

歧真人兒科秘法

夏禹鑄審小兒顏色苗竅法

兒科外治法

指紋切要

稀痘並免驚風

初生面紅啼哭不止

晝啼不止

夜啼不止

曲腰啼哭

遍身奇癢叫啼不止

初生遍身發黃

初生遍身紅赤

初生無皮

週身脫皮

兩腿生瘡脫皮

身如蛇皮鱗甲

初生身如魚泡如水晶

瘡似楊梅破爛有孔

紅絲瘤

顙門腫大

頭縫不合

初生眼目紅赤腫爛

小兒關眼

小兒變蒸

兩腮腫硬

口角生瘡

口流涎水

口腫並生馬牙

口生白點

初生小兒或兩腮腫硬或口内生瘡或生馬牙或重舌木舌蛇舌吐舌及

口不開不食乳等症

重舌

木舌

舌忽脹大腫硬即時氣絕

蛇舌

吐舌

頸軟

痰喘有聲

喉嘶聲啞

小兒病後口不能言

兒不食乳

吐乳

缺乳

斷乳

龜胸

龜背

並治龜胸

腹痛

肚腹脹大亮如水晶

肚皮忽然青黑

腹中鳴如蛙聲

肚臍腫出

臍內膿血不乾

預防臍風

臍風

小兒中惡以及痰閉火閉

氣閉乍然卒死

小兒初發瘧疾

氣喘

吐瀉

暑月水瀉

小兒痢疾

初生陰囊過大

忽然陰腫

陰囊赤腫

陰囊腫墜光亮啼哭

陰縮入腹

陽物腫痛

初生小便不通

小便數日不通遍身腫滿

大小便不通

初生大小便出血

夜睡遺尿在床

初生糞門閉塞

足趾向後

疳疾

胎毒

小兒科驚風

驚風論

慢驚

慢驚治驗

急驚

小兒科痘症

痘症治法

痘有四宜

痘有四忌

發熱

形色

起脹

養漿

收結

痘毒

痘症諸方

治驗

辨痘法

看耳法

避穢氣法

暑月出痘

冬月出痘

出痘兒睡不可驚動

二十四頂方

推拿法

痘疔

舌上痘疔

赤斑核

痘出一半忽然不語昏迷不省人事手足冰冷目

閉面青唇白氣息俱涼

熱症方形虛症又現元氣

本來虛弱而毒氣猛烈以致痘出不快

上身痘已起脹下身痘尚

未出或出而陷下不起

痘不起漿

痘症黑陷不起

兩頭痘

蛇皮痘

空倉痘

茱萸痘

血泡痘

白漿痘

漏痘

蛙痘

瑠璃痘

草尾珠痘

黑痘

頭面頸項諸痘

眼中生痘

免痘入眼

出痘眼目紅腫

出痘症眼有膿血

出痘眼痛

舌與鼻孔有痘

出痘縮舌

舌上有痘

舌上爛痘

出痘口噤不語

出痘腎腫

腎嚢有痘

陰戶有痘

痘症夾斑夾丹夾疹而出

痘出不透腹痛黑陷

出痘中風

雜痘一齊湧出

驗痘出齊法

痘症作癢

痘中生蛆癢不可忍

痘症發熱胡言亂語

痘齊熱退愛睡地上日夜不安

狂熱痘毒麻木致死

皮肉紅腫而痘不腫

痘症潰爛膿水淋漓

痘症泄瀉

痘症小便不通

痘症大便不通

痘症耳目口鼻出膿

痘風餘毒入目致生翳筋膜或成珠目蠅眼

痘後風眼或起翳赤紅

痘風眼邊紅爛作癢

痘後兩目難開

痘後耳內腫痛時流膿血

痘後鼻常流涕作臭

痘後唇不蓋齒

痘後唇口生瘡

痘後齒癢或出血

痘後牙齦口舌破爛出血或成走馬牙疳

痘後口角流涎

痘後咽喉腫痛

痘後昏迷亂語

痘後聲啞

痘後心痛不可忍

痘後肚腹腫脹

痘後浮腫

痘後癰毒初起紅腫

痘毒色白

痘後遍身無皮膿水不絕

痘後蟲蝕疳瘡

痘風瘡逢春即發

孕婦痘症

發熱

見點

灌漿

墮胎

產後出痘

引牛痘說

堅信洋痘說

經驗小兒月內出痘神方歌訣

浴兒免痘

不出天花經驗方

小兒科麻症

麻症論

麻症與傷寒辨

論麻痘輕重

麻症四忌

麻症治法

麻發不起

麻症作癢

新增麻伏變症

三小兒體性怯弱或因吐瀉之後元氣愈虧不能勝毒淫毒如珠四肢厥冷似睡非睡眠中露白此痘與慢驚相似乃危症也急用大附子四錢乾薑四錢

丁香

三錢

陳淡豆豉

三錢

小雄雞一隻

共搗爛

再用鹽酒

炒

溫敷臍上

及

兩足心急換一二次其痘自出若有瀉泄加竈心土三錢

四後生輩或失陽之症方發痘欲出不出狂言亂語此痘毒不出鬱火攻心

既不敢用清涼之藥以解毒又恐驟用補劑以助火此最難措手之症急用

雄雞一隻生剖開腹去腸雜以燒酒噴之敷於臍上其痘自出其語亦止凡

欲補而不敢補其痘不能出者俱用此方此從外托內神妙無比切勿視為

尋常或遍身疼痛乃毒出腎經用黑豆一升煮熟搗敷腰上即止蓋黑豆能

解腎經痘毒也

五少年出痘或當色後悞為發散傳為陰症新生雞蛋三個取蛋白調乳服

再用艾火灸肚臍四圍及臍下寸餘又扯起陽物離囊門各一半灸七焦其

陽自回

六女人天癸已至當出痘之際經水忽行一則懼其穢氣相沖二則慮其血衰

不能化毒此最危險之症急取桃樹上寄生搗爛敷足心三炷香久為

曾得愈六斤扁
小兒科痘症
上海故新書局發行

度經水自回痘亦萬全○又方 月月紅花又名月季花 取花與枝葉煎酒服並煎
濃湯週身洗浴神效 又方老杉樹皮 舊棕 胎髮 共燒灰調酒服立

止

七孕婦出痘激動其胎又不得下或胎死腹中而不能出 此至危之候宜取

路上推車蟲

又名推屎蟲即蟻蟻也

及所推泥丸一並焙乾研為細末加威靈仙同研

用酒調為丸納臍中將膏藥貼住

不論何項膏藥

三炷香久為度其胎即下如經不

通亦可以通

八孕婦出痘腹中作痛乃胎動也若不頂住一經臨產則氣血兩敗痘必不全

急宜內服安胎散

照婦科內安胎方服之

外用蓮蓬壳

益母草

各三錢燒灰存性

艾葉三錢

共為末醋調敷臍中連換三次其胎自安

九少年出痘吐血或鼻血不止此虛火上炎血不歸經 宜取白菓搗水服後

將柏樹上寄生

二兩

山梔根

去根二兩

共搗爛敷臍中連換三次其血即止未止

即照卷一鼻部鼻血各方治之自愈

十痘當起脹之時忽然便血 血既下漏安能起脹最危急也用 地榆 生

大黃 紅花根 共為末燒酒調勻敷尾脊骨三炷香久為度連換三次其

血自止如痘內夾有斑痘或夾丹症

形如斑點皆是

用土硃紫草為末敷之即退

十一肝經出痘大便下血眼紅氣粗丹痧滿面紫黑不起

白頸蚯蚓

七條焙乾

蔓仁

三十粒去油

杏仁

十五粒去皮尖

共研末陳茶調勻作餅貼臍一炷香久為度連換

數次各症俱退

十二肺經出痘滑精夢遺咳嗽失音不省人事

取新生雞蛋一個略開一孔

去黃白只用蛋殼將元參一兩取汁灌於蛋殼之中用紙封固再將熱黑豆

搗爛包裹蛋殼置火中煨一炷香久為度取出冷透火氣將元參汁與服其

音自清而嗽亦止

十三小腸經出痘遍身發斑片紅片紫如雲如霞無痘出見不省人事

急將

雪梨與食又將芙蓉花

川椒

胡椒

共為末紙捲為条蘸麻油用燈蓋

盛之照於被內覆蓋一時其斑自退而痘自出矣

十四胃經出痘咽喉閉塞或致失聲不思飲食上吐蛔蟲下瀉惡蟲

急將萊

豆為末以雞蛋白調之喉閉則敷於頸吐蛔則敷於臍上瀉血則敷臍下

十五命門出痘鎖眉刺心煩悶不安大熱不退

生艾葉

一兩

黑豆

一握

白芥

子三錢

醋煎一滾為度共搗爛作餅敷心前連換數次熱退心安

十六腎經出痘尾脊骨疼痛日夜不安 芙蓉根 馬鞭草 共搗爛炒溫敷
尾脊骨上其痛立止

十七時值瘧疾而復出痘口吐白涎咳嗽失聲 生薑切片 包大附子煨再取

薑汁和當歸生地白芍共搗爛敷臍中二炷香久為度白涎自止

十八痘見脾經甚為美也然防禁不周穢汚相沖痘不起發狂言亂語遍身癢

塌抓破出血聲啞氣急 急用石膏 寒水石 麝香 鬱金 甘草共煮

透去甘草滓又煮乾為末用蜜調敷胸前謔語自止而痘亦起發矣

十九痘出太陽舌心黑口氣臭大小便不利痘色紅紫 青黛 防風 全蝎

石膏 熟大黃 合勻為末作餅敷臍中痘色自活諸症自退

二十痘出太陰夾斑夾疹胡言亂語或失聲不語 雪梨水磨真象牙與服則

安靜聲清斑疹亦退其痘自出矣 又夾斑而出者有紅赤點隨出隨收又

夾丹而出者紅赤成片俱用 玄參 升麻各二分 甘草八分 防風 荆芥

牛蒡子各六分 煎服如夾麻疹而出者照上方加桔梗黃芩酒炒各六分 煎服均極

效驗後尚有外治一方

二十一痘出胸腰疼痛叫喚不安 且豉三兩 胡椒一錢 共搗爛又將生薑四兩

搗汁調勻炒溫敷於胸腰二處其痛立止

二十二痘出腎經腰腹絞痛吐瀉交作手足冰冷大汗如注此陰盛陽衰此最危險急用乳香沒藥 人參各一錢為末作丸納臍中又將艾葉炒熱敷於九上其症自平

二十三痘出不快煩渴悶亂臥睡不安咳嗽失聲 艾葉一碗 胡椒三十粒 搗爛調水取汁熬膏作餅敷臍中諸症自退

二十四痘如麻子一片成羶癢甚此為風毒非真痘也因風寒閉塞皮膚以致真痘不出菱莖子煮水洗浴再用貓爪荔枝燒烟熏之則真痘出而癢自止矣

推拿法

小發熱或為風寒所閉一時無表散之藥須用推拿法以鬆肌表其毒自出又將其兒素性怯弱為風寒所束固不得不發又恐表虛用藥發表有傷元氣亦用推拿之法又或其兒既服表藥依然身無微汗寒邪閉錮其症不退欲復用表散之劑又恐過表以損元神亦須用推拿之法蓋發散之藥多能耗氣推拿之法不過鬆肌發竅運動筋骸而已竅開則氣通筋運則血行氣血通暢而邪自

出勿謂推拿之無益也余常用之其效甚捷故備其法 取溫水一碗先用大
指蘸水於小兒兩鼻孔洗擦而上推者二十四下謂之洗井竈再於印堂用兩
手指分開擦二十四下謂之開天門又於小兒兩手食指擦下三十六下以瀉
三關之火又於中指擦下三十六下以瀉心經與肝之邪又將小指數擺謂之
烏龍擺尾再於脉門擦下三十六下復擦上十二下又於掌上順運八卦週旋
擦一百二十下然後於虎口及手足凡接骨之處其穴有窩於各穴窩間用力
俱捏一下臍下丹田各捏一下背上兩飯匙骨下及背脊每骨節間各捏一下
任其啼叫令汗出而肌鬆痘毒亦從而出矣但推拿後宜令兒睡發汗不可見
風腠理既開恐風邪之復入也

或用前項方將桃樹皮與薑蔥搗爛炒溫敷於臍上一炷香久為度亦取其發表之義也

痘疔

痘中有紫黑乾硬暴脹獨大脚無紅暈或疼或不疼者卽痘疔也痘疔能閉諸
毒未齊有疔則諸症不能出現既齊有疔則諸症不能起脹行漿時有疔則諸
症必致倒陷故初出時見有紫黑獨大之點恐其成疔卽宜以銀針刺破吸盡
黑血然後以拔疔散敷之次日復看若再硬脹仍然刺破以前藥敷之必轉紅
活方可已也若針挑不動手捻有核則成疔矣須用針從四邊剗開以小鉗鉗