

御纂醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑卷五十四

編輯幼科雜病心法要訣目錄

痰證門

痰證總括

燥痰

清氣化痰丸

蘇葶滾痰丸

濕痰

枳桔二陳湯

桂苓甘木湯

疝證門

疝證總括

寒疝

烏頭桂枝湯

金茱丸

濕熱感寒疝

烏頭枳子湯

胎疝

十味蒼蘘散

金鈴散

川棟丸

陰腫

疎風五苓散

加味五苓散

導赤散

加味守效丸

小腸氣

加味香蘇散

加味失笑散

胡盧巴丸

淋證門

淋證總括

寒淋

五苓散

熱淋

十味導赤湯

八正散

石淋

葵子散

八正散

血淋

小薊飲子

五淋散

頭痛門

頭痛總括

風寒頭痛

清空膏

內熱頭痛

加味茶調散

腹痛門

腹痛總括

食痛

小承氣湯

香砂平胃散

寒痛

理中湯

蟲痛

錢氏安蟲散

加減理中湯

內食外寒腹痛

藿香和中湯

黃疸門

黃疸總括

陽黃

茵陳麻黃湯

茵陳蒿湯

茵陳五苓散

陰黃

茵陳理中湯

茵陳四逆湯

水腫門

水腫總括

風水腫

越婢湯

濕水腫

貼臍法

沉香琥珀丸

風濕腫

疏鑿飲

茯苓導水湯

蘇葶丸

舟車神祐丸

陽水

大聖濬川散

舟車神祐丸

陰水

實脾散

金匱腎氣丸

腹脹門

腹脹總括

虛脹

香朴四君子湯

實脹

加味平胃散

小承氣湯

御纂醫宗金鑑卷五十四

編輯幼科雜病心法要訣

痰證門

痰證總括

痰因津液不四布陰盛爲飲陽盛痰稠黏黃色
燥熱清稀色白乃濕寒

註

痰者水穀所化之津液不能四布留於胸
而成者也多因飲食無節或乳食過食厚
脾胃不能運化而生若陰氣素盛則化而

飲陽氣素盛則化而爲痰稠黏黃色澁滯難
出謂之燥痰清稀色白滑而易出謂之濕痰
二者或宜清潤或宜通利治各不同也

燥痰

燥痰肺燥澁難出氣逆喘欬臥不舒面紅口乾小
便赤清氣化痰滾痰孚

註

燥痰者痰因火動也火盛則痰多燥黏氣逆
喘咳夜臥不寧面赤口乾小便黃赤輕者用
清氣化痰丸清之重者用蘇葶滾痰丸下之

清氣化痰丸

膽南星

九轉

半夏

各一兩五錢
薑製

橘紅

枳實

麩炒

杏仁

炒去皮尖

栝蒌仁

去油

黃芩

酒炒

白茯苓

各一兩

右爲細末薑汁爲丸淡薑湯化服

蘇葶滾痰丸

方見食積欬嗽

濕痰

濕痰解濕懶飲食倦怠嗜臥面色黃痰多枳桔

陳劑飲多桂苓甘朮湯

註

濕痰者因小兒過食生冷油膩之物有傷脾胃遂致脾土虛濕不能運化而成濕痰滑而易出脾虛不運故懶食脾主四肢故倦怠嗜臥脾屬土故面色多黃痰多者宜用枳桔二陳湯加蒼朮白朮除濕化痰飲盛者須用桂苓甘朮湯扶陽散飲調治合宜而痰自化矣

枳桔二陳湯

方見覘乳

桂苓甘朮湯