

御纂醫宗金鑑卷二十一

訂正仲景全書金匱要畧註中之一目錄

奔豚氣篇第八

桂枝加桂湯

奔豚湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痺心痛短氣篇第九

栝蒌薤白白酒湯

栝蒌薤白半夏湯

行身醫方全錄 卷二  
烏頭赤石脂圓

薏苡附子散

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生薑湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

桂枝生薑枳實湯

腹滿寒疝宿食篇第十

附子粳米湯

大建中湯

赤丸

厚朴三物湯

大黃附子湯

厚朴七物湯

大柴胡湯

烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

瓜蒂散

五藏風寒積聚篇第十一

麻子仁圓

甘草乾薑茯苓白朮湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血篇第十二

柏葉湯

瀉心湯

黃土湯

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

半夏麻黃圓

御纂醫宗金鑑卷二十

訂正仲景全書金匱要畧註中之

奔豚氣病脈證并治第八

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從驚發得之

按篇中祇有奔豚一證而吐膿驚怖火邪皆簡脫必有缺文

師曰奔豚病從小腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之

註

奔豚者腎病也以其病從少腹上衝咽喉有如豚竄奔突之狀故名之也發作則腎氣上乘於心而欲死作已則氣衰復還於腎而止故其病雖有微甚不同然必皆從驚恐得之蓋驚傷心恐傷腎兩藏交病也水能勝火腎上凌心故治法宜瀉腎而補心也

集註

張從政曰驚者為自不知故也恐者為自知也

周揚俊曰少陰脈循喉嚨因其所繫之經而

上衝殊便也

發汗後燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發  
奔豚氣從少腹上至心灸其核上各一壯與桂枝  
加桂湯主之

註

此條與傷寒論同傷寒論中無發汗後三字  
而有太陽傷寒者加溫鍼必驚也十一字當  
從傷寒論爲是蓋明所以致驚之由非一端  
卽寒侵鍼處亦能爲是病也夫太陽傷寒者  
加溫鍼必驚也謂病傷寒之人卒然加以溫

鍼其心必驚非謂溫鍼之後必生驚病也燒  
鍼卽溫鍼也燒鍼取汗亦汗法也鍼處宜當  
避寒若不知謹外被寒襲火鬱脈中血不流  
行所以有結核腫赤之患也夫溫鍼取汗其  
法亦爲迅烈矣旣鍼而營不奉行作解必其  
人素寒陰盛也故雖有溫鍼之火但發核赤  
又被寒侵故不但不解反召陰邪而加鍼之  
時心旣驚虛所以腎水陰邪得上凌心陽而  
發奔豚也奔豚者腎水陰邪之氣從少腹上

衝於心若豚之奔也先灸核上各一壯者外  
祛其寒邪繼與桂枝加桂湯者內伐其腎邪  
也

集註

周揚俊曰奔豚北方腎邪也燒鍼令汗縱不  
合法與少陰何與而作奔豚蓋太陽相表裏  
也鍼處被寒核起而赤吾知前此之邪未散  
而後此之邪復入惟桂能伐腎邪也所以用  
桂加入桂枝湯中一以外解風邪一以內泄  
陰氣也先灸核上者因寒而腫惟灸消之也

桂枝加桂湯方

桂枝 五兩

芍藥 三兩

甘草 二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

右五味以水七升微火煮取三升去滓溫服

一升

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

註

奔豚氣上衝咽喉發作欲死是奔豚之甚者

也氣上衝胸腹痛往來寒熱是奔豚之微者

也甚者以桂枝加桂湯從腎逐陰降逆也微者以奔豚湯從心調血散逆也

奔豚湯方

甘草

芎藭

當歸

各二兩

半夏

四兩

黃芩

二兩

生葛

五兩

芍藥

二兩

生薑

四兩

甘李根白皮

一升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三

夜一服

集解

沈明宗曰用芎歸白芍甘草調養厥陰少陽

血氣之正而邪自外出以生葛黃芩半夏生

薑佐李根解半表半裏之寒熱而逆可散蓋

奔豚雖屬腎病然兼厥陰少陽之邪而發者

有之仲景用此方明非僅寒邪一端致然也

發汗後臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗

湯主之

註

發汗後心下悸者心陽虛本經自病也臍下

悸者腎邪乘虛上干心病也奔豚者臍下氣動而上衝也欲作奔豚者有似奔豚之狀而將作未作也茯苓桂枝甘草大棗湯所以補火土而伐水邪也上條發明外感寒邪能病奔豚此條更申明內有水氣亦能病奔豚也

集註

徐彬曰仲景論證每合數條以盡其變言奔豚由於驚又言其從少腹衝至咽喉又言其兼腹痛而往來寒熱又言其兼核起而無他病又言汗後臍下悸欲作奔豚而未成者其

淺深瞭然用和解用伐腎用桂不用桂酌治  
微妙奔豚一證病因證治無復剩義苟不會  
仲景立方之意則峻藥畏用平劑寡效豈古  
方不宜於今哉

周揚俊曰汗本心之液發汗而臍下病悸者  
心氣虛而腎氣動也

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓 半觔

桂枝 四兩

甘草 二兩

大棗 十五枚

右四味以甘瀾水一斗先煮茯苓減二升內  
諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服 作  
甘瀾水法取水三升置大盆內以杓揚之數  
千遍水上有珠子五六千顆相逐取用之

集解

程林曰汗後臍下悸者陽氣虛而腎邪上逆  
也臍下爲腎氣發源之地茯苓泄水以伐腎  
邪桂枝行陽以散逆氣甘草大棗甘溫助脾  
土以制腎水煎用甘瀾水者揚之無力全無  
水性取其不助腎邪也

胸痺心痛短氣病脈證并治第九

師曰夫脈當取太過不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者責其極虛也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦故也

註

脈太過則病不及亦病故脈當取太過不及而候病也陽微寸口脈微也陽得陰脈為陽不及上焦陽虛也陰弦尺中脈弦也陰得陰脈為陰太過下焦陰實也凡陰實之邪皆得以上乘陽虛之胸所以病胸痺心痛胸痺之