

溫病條辨中焦篇

汪瑟菴先生叅訂

吳塘鞠通氏著

徵以園先生同參

慈溪葉氏濬吾樓重鐫

朱武曹先生點評

梅橋阮志銳校字

風溫 溫熱 溫疫 溫毒 冬溫

①面目俱赤。語聲重濁。呼吸俱粗。大便閉。小便濇。舌苔老黃。甚則黑。有芒刺。但惡熱。不惡寒。日晡益甚者。傳至中焦。陽明溫病也。脈浮洪躁甚者。白虎湯主之。脈沉數有力。甚則脈體反小而實者。大承

氣湯主之。暑溫濕溫瘡不在此例。

陽明之脉榮於面。傷寒論謂陽明病而緣緣正赤。火盛必克金。故目白睛亦赤也。語聲重濁。金受火刑而音不清也。呼吸俱粗。謂鼻息來去俱粗。其粗也平等。方是實證。若來粗去不粗。去粗來不粗。或竟不粗。則非陽明實證。當細辨之。粗則喘之漸也。大便閉。陽明實也。小便濇。火腑不通。而陰氣不化也。口燥渴。火燥津也。舌苔老黃。肺受胃濁。氣不化津也。

按靈樞論諸臟溫病。獨肺溫病有舌苔之明文。

餘則無有。可見舌苔乃胃中濁氣薰蒸肺臟。肺氣不化而然。甚則黑者。黑水色也。火極而似水也。又水勝火。火凡五行之極盛必兼勝巳之形。芒刺苔久不化。熱極而起堅硬之刺也。倘刺軟者。非實證也。不惡寒。但惡熱者。傳至中焦。已無肺證。陽明者。兩陽合明也。溫邪之熱。與陽明之熱相搏。故但惡熱也。或用白虎。或用承氣者。證同而脉異也。浮洪躁甚。邪氣近表。脉浮者不可下。凡逐邪者。隨其所在。就近而逐之。脉浮則出表爲順。故以白虎之金。以

退煩熱。若沉小有力。病純在裏。則非下奪不可矣。故主以大承氣。按吳又可溫疫論中云。舌苔邊白。但見中微黃者。卽加大黃。甚不可從。雖云傷寒重在誤下。溫病重在誤汗。卽誤下不似傷寒之逆之甚。究竟承氣非可輕嘗之品。故云舌苔老黃甚。則黑有芒刺。脉體沉實的。係燥結痞滿。方可用之。

或問子言溫病以手經主治。力闢用足經藥之非。今亦云陽明證者何。陽明特非足經乎。曰。陽

明如市。胃爲十二經之海。土者萬物之所歸也。諸病未有不遇此者。前人云。傷寒傳足不傳手。誤也。一人不能分爲兩截。總之傷寒由毛竅而谿。谿肉之分理之小者。由谿而谷。谷肉之分理之大者。由谷而孫絡。孫絡絡之至細者。由孫絡而大絡。由大絡而經。此經卽太陽經也。始太陽終厥陰。傷寒以足經爲主。未始不關手經也。溫病由口鼻而入。鼻氣通於肺。口氣通於胃。肺病逆傳則爲心包。上焦病不治則傳中焦。胃與脾

也。中焦病不治，卽傳下焦，肝與腎也。始上焦終下焦。溫病以手經爲主，未始不開足經也。但初受之時，斷不可以辛溫發其陽耳。蓋傷寒傷人身之陽，故喜辛溫；甘溫苦熱以救其陽。溫病傷人身之陰，故喜辛涼；甘寒甘鹹以救其陰。彼此對勘，自可瞭然於心目中矣。

白虎湯

方見上焦篇第十三頁

大承氣湯方

大黃

六錢

芒硝

三錢

厚朴

三錢

枳實 三錢

水八杯。先煮枳朴。後納大黃芒硝。煮取三杯。先服一杯。約二時許。得利。止後服。不知再服一杯。再不知再服。

〔方論〕此苦辛通降。鹹以入陰。法承氣者。承胃氣也。蓋胃之爲腑。體陽而用陰。若在無病時。本係自然下降。今爲邪氣蟠踞於中。阻其下降之氣。胃雖自欲下降。而不能。非藥力助之。不可。故承氣湯通胃結。救胃陰。仍係承胃腑本來下降之

氣非有一毫私智穿鑿於其間也。故湯名承氣。學者若真能透徹此義。則施用承氣。自無弊竇。大黃蕩滌熱結。芒硝入陰軟堅。枳實開幽門之不通。厚朴瀉中宮之實滿。厚朴分量不似傷寒論中重用者。治溫與治寒不同。曰大承氣者。合四藥而觀之。可謂無畏其燥也。堅不破。無微不入。故曰大也。非真正實熱蔽痼。氣血俱結者。不可用也。若去入陰之芒硝。則云小矣。去枳朴之攻氣結。加甘草以和中。則云調胃矣。

③陽明溫病。脉浮而促者。減味竹葉石膏湯主之。
脉促。謂數而時止。如趨者過急。忽一蹶然。其勢
甚急。故以辛涼透表重劑。逐邪外出則愈。

減味竹葉石膏湯方 辛涼合甘寒法

竹葉 五錢

石膏 八錢

麥冬 六錢

甘草 三錢

水八杯。煮取三杯。一時服一杯。約三時令盡。

③陽明溫病。諸證悉有而微。脉不浮者。小承氣湯
微和之。

以陽明溫病發端者。指首條所列陽明證而言也。後凡言陽明溫病者。倣此諸證悉有。以非下不可。微則未至十分亢害。但以小承氣通和胃氣則愈。無庸芒硝之軟堅也。

④陽明溫病。汗多譫語。舌苔老黃而乾者。宜小承氣湯。

汗多。津液散而大便結。苔見乾黃。譫語因結糞而然。故宜承氣。

⑤陽明溫病。無汗小便不利。譫語者。先與牛黃丸。

不大便再與調胃承氣湯

無汗而小便不利則大便未定成鞭。譏語之不因燥屎可知。不因燥屎而譏語者猶係心包絡證也。故先與牛黃丸以開內竅。服牛黃丸內竅開大便當下。蓋牛黃丸亦有下大便之功能。其仍然不下者無汗則外不通大小便俱閉則內不通邪之深結於陰可知。故取芒硝之鹹寒大黃甘草之甘苦寒不取枳朴之辛燥也。傷寒之譏語舍燥屎無他證一則寒邪不兼穢濁二則

由太陽而陽明溫病譏語有因燥屎有因邪陷
心包一則溫多兼穢二則自上焦心肺而來學
者常須察識不可歧路亡羊也

⑥陽明溫病面目俱赤肢厥甚則通體皆厥不瘰
癧但神昏不大便七八日以外小便赤脉沉伏或
並脉亦厥胸腹滿堅甚則拒按喜涼飲者大承氣
湯主之。

此一條須細辨其的是火極似水熱極而厥之
證方可用之全在目赤小便赤腹滿堅喜涼飲

定之。

大承氣湯

方法見前第四頁

⑦陽明溫病。純利稀水無糞者。謂之熱結旁流。調胃承氣湯主之。

熱結旁流。非氣之不通。不用枳朴。獨取芒硝入陰。以解熱結。反以甘草緩芒硝急趨之性。使之留中解結。不然結不下而水獨行。徒使藥性傷人也。吳又可用太承氣湯者。非是。

⑧陽明溫病。實熱壅塞爲噤者。下之連聲噤者中。

此亦作者獨得處

治法例
焦聲斷續時微時甚者屬下焦

金匱謂噦而腹滿視其前後知何部不利利之
卽愈陽明實熱之噦下之裏氣得通則止但其
兼證之輕重難以預料故但云下之而不定方
以俟臨證者自爲採取耳再按中焦實證之噦
噦必連聲緊促者胃氣大實逼迫肺氣不得下
降兩相攻擊而然若或斷或續乃下焦衝虛之
噦其噦之來路也遠故其聲斷續也治屬下焦

⑨陽明溫病下利譫語陽明脉實或滑疾者小承

追邪靈藥
原方分
是斟酌

氣湯主之。脉不實者。牛黃丸主之。紫雪丹亦主之。

下利讖語。柯氏謂腸虛胃實。故取大黃之濡胃。

無庸芒硝之潤腸。本論有脉實。脉滑疾。脉不實。

之辨。恐心包絡之讖語。而誤以承氣下之也。仍。

主芳香開竅法。

小承氣湯方

若芋通法重

大黃 五錢

厚朴 二錢

枳實 一錢

水八杯。煮取三杯。先服一杯。得宿糞止。後服不知。

再服。

調胃承氣湯

熱滯於內治以鹹寒佐以甘苦法

大黃

三錢

芒硝

五錢

生甘草

二錢

牛黃丸

方論並見上焦篇第二十四頁

紫雪丹

方論並見上焦篇第二十五頁

⑩溫病三焦俱急大熱大渴舌燥脉不浮而躁甚舌色金黃痰涎壅甚不可單行承氣者承氣合小陷胸湯主之

三焦俱急謂上焦未清已入中焦陽明大熱大渴脉躁苔焦陽土燥烈煎熬腎水不下則陰液