

四正妻病言

溫毒病論

吳門邵登瀛步青輯

曾孫炳揚本泉述

元孫

景康
景堯謹校

愚按冬溫春溫溫疫濕溫四症盛行之時每夾襍溫毒一症者有諸嘉言謂是病久熱熾成毒爲病中之病然攷金匱則曰七日不可治三十年來親歷是病其斃多在六七日之間其病一起卽劇多在三四日之內可知嘉言病久成毒之說爲非是而仲景所云七日不可治爲的確也嘗細繹之風寒暑濕熱皆天地之常氣人感之入手足經可以汗吐下溫清補常法治之苟治法頭

頭是道無不應手取效若溫毒感天地之厲氣無歲不有但有輕重耳感入手經則病在上如頭面頰頤腫如匏瓜喉痺失音頸項粗大爛喉丹疹之類感入足經則病在中胃中有濁營衛不通血凝不流發斑紫黑陽毒癰膿陰毒面青身如被杖之類若下入於陰則下血如豚肝清便下重臍築湫痛之類感天地之常氣者病有傳變治有候數可以常理測之常法治之若感天地之厲氣者一發暴不可禦寒之散之攻之毫無一效醫者茫不知作何病治束手待斃熱毒閃爍七日內已消滅人之氣津血液不可治矣然則治之奈何曰治溫毒以

逐解爲功、不可以清熱爲能、嘉言云、上焦如霧、升逐解毒、中焦如漚、疏逐解毒、下焦如瀆、挾逐解毒、吳又可云、白虎無破結之能、黃連有閉塞之害、但求清熱、猶揚湯止沸、且徒伐胃氣、反抑邪毒、脈變細小、不治、惟承氣有奪邪之能、當乘人氣血未亂、津液未枯、病人未至危殆、投劑不致掣肘、旨哉二先生之論、合而觀之、溫毒之治、思過半矣、今人遇溫毒病、但知揚湯止沸、迨至服寒涼而愈熱、茫無頭緒、遷延待斃、嗟乎、其亦知寒涼無破結之能、反抑邪毒之理乎、且亦知治溫毒當於七日前下手、乘人氣血未至消亡、驅逐解毒、乘勢追拔之理乎、

述古

金匱云、陽毒之爲病、面赤斑斑如錦紋、咽喉痛、唾膿血、五日可治、七日不可治、陰毒之爲病、面目青、身痛如被杖、咽喉痛、五日可治、七日不可治、

趙以德云、斑皆熱毒、傷於陰陽二經血分、所以不分表裏、俱以升麻解時氣毒、厲療發斑、開咽喉、毒攻與熱毒成膿之症、熱毒在陽、經絡則面赤如錦斑、唾膿血、在陰經絡則面青、身如被杖、其曰五日可治、七日不可治者、五日乃土之生數、熱未極也、七日爲火之成數、熱已極矣、陰陽之氣、津血液皆消滅矣、傷寒七日、經氣已盡、而

此加之以毒至七日不惟消滅其陰且火極亦自滅矣
王安道云仲景所云陰毒非陰寒之病乃感天地惡毒
之氣入於陰經

王叔和云陽脉洪數陰脉實大更感溫濕變爲溫毒周
禹載云春至病溫之人更遇時熱爲未至而至之異氣
變爲溫毒

此論伏溫與時熱交并表裏俱熱溫毒爲病最重也其
脉浮沉俱盛其症心煩悶嘔逆喘咳甚則面赤身體俱
赤色狂亂躁渴咽腫痛狂言下利而發斑最爲危候
溫毒發斑因熱毒內攻不得散蘊於胃府而發出肌表

溫言病證
或失於汗下或汗下不解足冷耳聾胸中煩悶咳嗽嘔
逆躁熱起臥不安者便是發斑之候

溫毒發斑並非因失汗下及汗下不解

斑如錦紋身熱煩躁大便燥結者黃連解毒湯

躁悶狂妄而無汗者三黃石膏湯

自汗煩渴而發斑爲胃熱人參化斑湯

煩熱錯語不得眠白虎合黃連解毒湯

斑不透犀角大青湯已透熱不退本湯去升麻黃芩加

人參生地柴胡

斑色紫者爲危候黃連解毒合犀角地黃湯然須與病

家言過方用此症十中救二三若黑色而下陷者必死也

發斑雖禁下若大便秘躁渴色紫者可微下之

發斑已盡外熱已退內實不大便讞語小劑涼膈或大柴胡微下之

發斑紅赤者爲胃熱紫爲胃傷黑爲胃爛也大抵鮮紅起發者吉雖大不妨稠密成片紫色者半死半生襍色青紫者十死不一生矣

凡斑旣出須得脉洪數有力身溫足暖者易治若脉小足冷元氣虛弱者難治狂言發斑大便自利或短氣燥

結不通而黑斑如果實厲者不治

吳又可云熱留血分裏氣壅閉則邪毒不得外透而爲斑若下之內壅一通則衛氣亦從而疏暢或出表爲斑則邪毒亦從而外解矣若下後斑漸出不可更大下設有下症少與承氣緩緩下之

愚按發斑不可下指傷寒時氣而言內實色紫者可微下正指溫毒而言何也時行發熱內鬱及傷寒失汗失汗下後不解煩躁嘔悶但得出表爲斑則嘔逆止煩悶解熱邪卽從之外泄非如溫毒斑雖見於肌表熱毒甚而內結煩躁愈加嘔悶仍然唇乾齒燥識語昏昧不

大便鼻煤僅以犀地膏連之類解之揚湯止沸其如竈底加薪何惟大黃走而不守從營衛所出之源剷去邪毒之根使裏氣一通表氣亦順則火毒消散炎燭頓爲清涼爾昔滑伯仁治一人身大熱脉沉實而滑四末微清遍體赤斑舌黑芒刺神昏讖語以小柴胡加石膏知母連進三服次用大承氣湯下之而愈呂滄洲治一人神昏脉伏肌膚灼熱營熱發斑先與人參白虎湯化其斑次以桃仁承氣湯下之而愈由此觀之以上諸條所論清解斑毒之法仍不脫治傷寒時氣之窠臼以之治溫毒則否否惟用下三條爲有合於溫毒之治法也

發斑禁下可下辨

沈目南曰經言少陰所至爲瘍疹身熱故疹屬少陰君火隱於皮膚之內少陽所至爲噎嘔瘡瘍故斑屬少陽相火發於皮膚之上二者在春分以後暑令以前君相司令感冒時熱風火內鬱發斑其症頭疼身熱足冷嘔逆喘咳而胸煩滿悶躁熱起臥不安耳鳴耳聾渾渾惺惺昏昧鼻乾呻吟勢甚者發熱一二日卽出六七日乃退勢緩者四五日方出一二日卽退亦有隨出隨退有稀疎幾點者有稠密如麤者然多細如蚊咬色亦鮮紅或間有紫色細點此手經爲病故無下法

少陰疹治法總以透達爲主若少陽斑屬三焦相火其
症與傷寒陽明發斑不同與時令少陰發斑神昏舌絳
者亦異不過風熱內鬱而已治宜涼膈去硝黃加防風
荊芥川芎赤芍桔梗或柴芎香豉飲

傷寒發斑因失汗則表邪不解失下則裏邪不解下早
則邪陷不解下遲則火盛不解或陽症誤陰則熱甚傷
血裏實表虛熱邪乘虛蘊於肌腠而爲斑也輕者色紅
而赤重者紫色而顯輕者細如蚊迹只在四肢重者成
粒成叢乃見胸腹治宜透之解之毒氣外宣火威下抑
中州之禍解免如元氣虛者當扶元氣而兼化斑若下

之則熱毒內陷症反變劇故禁下法溫毒發斑不因失汗失下一起脉浮沉俱盛壯熱煩躁起卧不安外或頭面洪腫咽喉腫痛吐膿血面赤如錦紋身痛如被杖內則煩悶嘔逆腹痛狂亂躁渴或狂言下利如是而發斑者點如豆大而圓色必紫黑而顯胸背腰腹俱稠毒氣瀰漫營衛三焦壅閉燔灼氣血斯時而任白虎之化斑犀角大青之解毒邪毒得降而愈鬱反致不救惟下之內壅一通邪氣因有出路斑毒亦從而外解矣治法當與疫病發斑參看

附溫毒可下症

舌黃胎 黑胎芒刺

得病二三日舌乾焦黃大渴煩躁熱已瘀胃也調胃承氣湯若表裏俱實熱者涼膈散

黑胎芒刺邪毒在胃薰騰於上也或硬黑或軟黑大承氣湯下之黑皮自脫

唇燥裂 唇焦 鼻如烟煤

胃熱多有此症若鼻煤尤熱毒在胃下之無疑

目赤 氣噴如火 狂煩揚手擲足 小便赤黑涓滴

作痛皆熱極下之無疑

心下脹滿 高起如塊 心下拒按

邪傳胸胃內結氣閉小承氣下之客熱一除本氣自然
升降脹滿立消若投陷胸瀉心反致遏抑邪毒

腹痛按之愈痛

邪結氣阻痞滿燥實作痛得大承氣一行邪結並去脹
滿頓除皆藉大黃拔毒逐邪破結導滯所爲一竅通諸
竅皆通也

熱結旁流 下利挾熱

自利純臭水晝夜十數行口燥唇乾舌裂此熱結旁流
也急下以大承氣湯去其宿垢頓止

下利挾熱承氣湯以撤熱利自止

大斑紫黑

熱極胃爛氣血不行大承氣下之僅救二三若以化斑消斑殊謬

頭痛頭面腫大咽喉痛咽噎堵塞牙關口噤

胃家熱瘀氣不下降毒氣攻衝下之裏氣一通毒消氣降而自愈僅投散邪退熱消毒殊謬

口燥舌乾煩渴 口臭

邪熱在胃阻礙正氣氣止火亦止積火成熱投承氣逐去其邪氣行大泄而熱自已若用解毒瀉心專務清熱反致閉塞之害