



R289.349

2

時方歌括目錄

補可扶弱

四君子湯

一

六君子湯

二

香砂六君子湯

三

五味異功散

四

補中益氣湯

五

當歸補血湯

六

保元湯

七

獨參湯

八

四物湯

九

八珍湯

十

十全大補湯

十一

人參養榮湯

十二

天王補心丹 十三

六味地黃丸 十四

桂附地黃丸 十五

還少丹 十六

龜鹿二仙膠 十七

聖愈湯 十八

十味地黃丸 十九

正元丹 二十

歸脾湯 二十一

大補陰丸 二十二

虎潛丸 二十三

加味虎潛丸 二十四

全鹿丸 二十五

重可鎮怯

磁砂丸

二十
六

蘇子降氣湯

三十
七

硃砂安神丸

二十
八

四磨湯

二十
九

黑錫丹

三十

全真益氣湯

三十
一

二加龍骨湯

三十
二

輕可去實

九味羌活湯

三十
三

人參敗毒散

三十
四

香蘇飲

三十
五

升麻葛根湯

三十
六

小續命湯

三十
七

地黃飲子

三十
八

資壽解語湯

三十

藿香正氣散

四十

香薷飲

四十

五積散

四十

小柴胡去參加青皮湯

四十

小柴胡加常山湯

四十

宣可決壅

稀涎湯

四十

通關散

四十

越鞠丸

四十

逍遙散

四十

通可行滯

導赤散

五十

五淋散

五十

通關丸

五十

又名滋腎丸

六一散

五十

泄可去閉

備急丸

五十

三一承氣湯

五十

溫脾湯

五十

防風通聖散

六十

涼膈散

五十

失笑散

五十

獨聖散

五十

滑可去着

芍藥湯 六十

脾約丸 六十

更衣丸 六十

礞石滾痰丸 六十

指迷茯苓丸 六十

潛可固脫

當歸六黃 六十

耆附湯 六十

玉屏風散 六十

威喜丸 六十

濟生烏梅丸 六十

斗門秘傳方 七十

聖濟附子丸 七十

四神丸 七十

金鎖固精丸

七十

封髓丹

七十

真人養臟湯

五十

濕可潤燥

清燥救肺湯

七十

瓊玉膏

七十

生脈散

八十

燥可去濕

神朮湯

七十

平胃散

八十

五皮散

八十

二陳湯

八十

草薺分清飲 八十

腎着湯 八十

一味白朮酒 八十

寒能勝熱

瀉白散 八十

甘露飲 八十

左金丸 八十

香連丸 八十

溫膽湯 九十

金鈴子散 九十

丹參飲 九十

百合湯 九十

滋腎丸 九十

地骨皮散 九十

清暑益氣湯

九十

龍膽瀉肝湯

七十

當歸蘆薈丸

九十

犀角地黄湯

九十

四生丸

一百

熱可制寒

回陽急救湯

一百

益元湯

一百

濟生腎氣丸

一百

三生飲

一百

參附湯

一百

近救白朮湯

一百

附子理中湯

一百

雞鳴散

一百

時方妙用卷之四

閩長樂陳念祖修園著

江右泰和蕭敷

政蒲邨
教敬五

甫校刊

鶴膝風

脛細而膝腫是也。爲風寒濕三氣合痺于膝而
成。初起發熱頭痛。宜五積散。痢後變成者亦宜
之。若久病爲足三陰虛。宜十全大補湯。加附子
牛膝杜仲防風羌活主之。又治初起外法。用陳

年白芥子研末。以薑汁葱汁調塗。一伏時。患處起。泡泡乾。脫皮自愈。

五積散

四十十全大補湯

一十

又按鶴膝風。多是虛寒。脚氣多是濕熱。一攻一補。治法各判。然脚氣有腎虛氣喘。小腹痺者。腎氣丸。必不可緩。鶴膝風有赤熱。炊腫者。二妙散。桂枝芍藥知母湯。亦所必需。此活法也。

脚氣

脚之腫大是也。東垣云。南方卑濕。其濕從外以襲入。北方常食羶乳。又飲酒太過。脾胃有傷。不能運化。其濕從中以流下。初起發熱惡寒。似傷寒證。若上氣喘急。及上少腹不仁。恐致攻心。不救。若患久不治。卽成痼疾。此證名壅疾。不可驟補。

一脚氣腫痛不可忍宜

鷄鳴散

一百零八

一脚氣氣喘。少腹不仁。須防其入心。宜後方。
一脚氣服鷄鳴散。愈後亦宜之用。

桂附地黃丸五十

一兩脛大爲濕脚氣。兩脛不腫。或頑麻。或攣急。
或緩縱。名乾脚氣。宜

四物湯加牛膝、獨活、蒼朮、黃柏、木瓜、澤瀉、肉

桂之類。九

積聚

積者五臟所生。推之不移。屬陰。聚者六腑所成。推之則移。屬陽。當辨其新久虛實而施治。內經云大積大聚不可犯也。衰其大半而止。過則死。此治積聚之法也。

脈宜沉實 忌虛弱

一積聚新病。審其可用疏散者。宜用

五積散

四十

一積聚新病。審其可用消導攻下者。宜用

備急丸。五十

三

平胃散。加入扁蓄瞿麥穗大麥芽川芎。以上
八味。各用五錢。沉香木香各一錢五分。大黃
酒浸二兩。共爲細末。每服三錢。薑湯送下。忌
油膩動氣之物。及房事一月。藥須黃昏服。勿
食晚飯。大小便見惡物爲度。十八

肝之積。在左脇下。名曰肥氣。去蒼朮加柴胡
鱉甲青皮莪朮。肺之積。在右脇下。名曰息

賁。加白豆蔻。桑白皮。鬱金。○心之積。起臍上。上至心下。大如臂。名曰伏梁。去蒼朮。加肉桂。黃連。石菖蒲。莖朮。○脾之積。在胃脘。腹大如盤。名曰痞氣。原方不加減。○腎之積。在臍下。發于小腹。上衝心而痛。名曰奔豚。上方去蒼朮。大黃。陳皮。麥芽。扁蓄。加茯苓。四兩。肉桂。附子。當歸。吳茱萸。各五錢。川練子。李根白皮。各一兩。淡鹽湯送下。或煉蜜爲小丸。吞下四錢。