

劉涓子鬼遺方

五卷

劉涓子遺方

劉涓子鬼遺方卷第一

并序

龔慶宣撰

昔劉涓子晉末於丹陽郊外照射忽見一物高二丈許射而中之如雷電聲若風雨其夜不敢前追詰旦率門徒子弟數人尋蹤至山下見一小兒提罐問何往爲我主被劉涓子所射取水洗瘡而問小兒曰主人是誰人云黃父鬼仍將小兒相隨還來至門聞搗藥之聲比及遙見三人一人開書一人搗藥一人臥爾乃齊唱叫突三人並走遺一卷癰疽方并藥一曰時從宋武北征有

被瘡者以藥塗之卽愈論者云聖人所作天必助之以
此天授武王也於是用方爲治于無一失婦適余從叔
祖涓子寄婦書具敘此事并方一卷方是丹陽白薄紙
本寫今手跡尚存從家世能爲治方我而不傳其孫道
慶與余鄰居情款異常臨終見語家有神方兒子幼稚
苟非其人道不虛行尋卷診候兼辨藥性欲以相傳屬
余旣好方術受而不辭自得此方於今五載所治皆愈
可謂天下神驗劉氏昔寄龔方故草寫多無次第今輒
定其前後族類相從爲此一部流布鄉曲有識之士幸

以自防齊永元元年太歲己卯五月五日撰道慶曰王
祖母劉氏有此鬼方一部道慶祖考相承謹按處治萬
無一失舅祖消子兄弟自寫寫稱云無紙而用丹陽錄
永和十九年資財不薄豈復無紙是以此別之耳

案永和祇

十二年且去宋武
甚遠疑元嘉之訛

黃父曰夫言癰疽何以別之岐伯荅曰榮衛稽留於經
脈之中久則血澀不行血澀不行則衛氣從之不通壅
遏不得行火不止熱勝熱勝則肉腐爲膿然不能陷膚
於骨髓不爲焦枯五藏不爲傷故曰癰 黃父曰何爲

疽岐伯曰熱氣浮盛當其筋骨良肉無餘故曰疽疽上
皮肉以堅上如牛領之皮癰者薄以澤背其候也 黃
父曰及如所說未知癰疽之性名發起處所診候形狀
治與不治死活之期願一一聞之 岐伯曰癰疽圖曰
赤疽發額不寫十餘日死其五日可刺也其膿赤多血
死未有膿可治人年 二十五 三十一 六十
九十五者在額不可見血見血者死

禽疽發如軫者數十數其四日腫合牽核痛其狀若攣
十日可刺其肉發身核寒齒如噤欲痊如是者十五

日死

杼疽發頂若兩耳下不寫十六日死六日可刺其色黑
見膿而癰者死不可治人年十九二十三三
十五三十九五十一五十五六十一八
十七九十九百神在耳下不可見血見血者死
丁疽發兩肩比起有所逐惡結血流內外榮衛不通發
爲丁疽三日身腫痛甚口噤如瘞狀十一日可刺不
治二十日死

蜂疽發髀背起心膈若連肩骨二十日不治死八日可

刺其色赤黑膿見青者死不可治人年 一十八

二十四 三十五 六十七 七十二 九十八者

百神在肩不可見血見血者死

陰疽發髀若陰股始發腰強內不能自止數飲不能多
五日堅痛不治三歲而死

刺疽發起肺腧不寫二十日死其八日可刺發而赤其
上肉如椒子者死不可治人年 十九 二十五

二十九 三十九 五十七 六十 七十三 八

十一 九十七 百神在背不可見血見血者死

脈疽發頸項如痛身隨而熱不欲動悄悄或不能食此有所大畏恐駭而不精上氣噉其發引耳不可以腫二十日可刺不刺八十日死

龍疽發背起胃俞若腎俞二十日不寫死九日可刺不刺其上赤下黑若青膿黑死發血膿者不死

首疽發熱八十日一方云八九日大熱汗頭引血盡如噉身熱同同如沸者皮頗腫淺刺之不刺二十日死榮疽發脅起若兩肘頭二十五日不寫死九日可刺膿多赤白而可治也人年十一歲十六二十六

三十二 四十八 五十八 六十四 八十 九
十六 百神在脅不可見血見血卽死

行疽發如腫或後合相從往來不可要其所在刺之卽
愈

勇疽發股起太陰若伏鼠二十五日不寫死其十日可
刺勇疽發膿青黑者死白者尙可治不可治人年

十一 十五 二十 三十一 三十三 四十六

五十九 六十三 七十五 九十一 百神皆

在尻尾不可見血見血者死

標叔疽發背熱同同耳聾後六十日腫如聚水其狀若
如此者可刺之但出水後及有血出卽除愈也不可

治人年 五十七 六十五 七十三 八十一

九十七者 百神在背不可見血見血者死

癆疽發足趺若足下三十日不寫死其十二日可刺癆

疽者白膿不太多其瘡上痒赤黑者死不可治人年

十三 二十九 三十五 六十一 七十三

九十三 百神在足不可見血見血者死

衝疽發小腸痛而振寒熱四日五日悄悄六日而變刺

之五十日死

敦疽發兩指頭若五指頭七八日不寫死其四日可刺

其發而黑擁者不堪未過指節可治

一方不呼爲敦疽恐是刺寫明

堂引爲敗疽

疥疽發腋下若兩臂兩掌中振寒熱而噤乾者飲多卽

嘔心煩悄悄六十日而漸合者如此可有汗如無汗

者死

一方云床疽明堂亦引爲床疫

筋疽皆發脊兩邊大筋其色蒼八日可刺若有膿在肌

腹中十日死

陳乾疽發兩臂三四日痛不可動五十日身熱而赤六
十日可刺如刺無血三四日病愈

搔疽發手足五指頭起節其色不變十日之內可刺過
時不刺後爲蝕有癰在脈腋三歲死

叔疽發身腫牽核而身熱不可以行不可以屈伸成膿
刺之以除

白疽發脾若肘後痒自痛傷乃身熱多汗五六處有者
死心主癰疽在股脛六日死發膿血六十日死

黑疽發腫居背大骨上八日可刺過時不刺爲骨疽

骨疽膿出不可止壯熱碎骨六十日死脇少陽有癰腫
在頸八日死發膿血者十日死

倉疽發身痒後痛此故傷寒氣入藏篤發爲倉疽九日
可刺之不刺九十日死矣

腰太陽脈有腫交脈屬於陽明在頸十日死發腫七十
日死

尻太陽脈有膿腫癰在足心少陽八日死發膿血六十
日死或八十日死

頭陽明脈有腫癰在尻六日死發膿血六十日死

股太陰有腫癰在足太陽十七日死發膿血百日死
肩太陽脈有腫癰在頸八日死發膿血百日死
足少陽脈有腫癰在脇八日死發膿血六百日死
手陽明脈有腫癰在腋淵一歲死發膿三歲死
黑疽發腋淵死

黑疽發耳中如米大此疽不治死

黑疽發肩死黑疽發缺盆中名曰伏疽不治死

赤疽發於脾半夜可治出歲死

黑疽發肘上下不死可治

髀解除指本黑頭赤死

黑疽發掌中不死可治

赤疽發陰股軟可治堅死

赤疽發肥腸死

黑疽發腠臄軟可治堅不可治

赤疽發掌中不可治

黑疽發趺上堅死

足下久腫癰色赤死

癰高而光者不大熱用薄雍其肉平平無異而紫色者

不須治但以黃耆并淡竹葉湯申其氣耳癰平而痛用
八物黃耆薄大癰七日小癰五日其自有堅強色診寧
生破發背及乳若熱手近不得者令人之熱熟先服
王不留行散外散外摩發背大黃膏若背生破無善在
乳者熟之候手按之若隨手起便是熟針法要膿看以
意消息之胷背不可過一寸針良久不得膿卽以食肉
膏散差舂頭肉癰口中人體熱氣歇服木瓜散五日後
癰欲差者排膿內寒散

凡破癰之後病人便連綿欲死內寒熱腫自有似癰而